

KULLANMA TALİMATI

ADOX 600/200 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 600 mg asetilsistein ve 200 mg doksofilin içerir.

Yardımcı maddeler: Polietilenglikol, polivinilpirolidon, sukraloz (E 955), sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, böğürtlen aroması ve kayısı aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1.ADOX nedir ve ne için kullanılır?**
- 2.ADOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3.ADOX nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. ADOX'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ADOX nedir ve ne için kullanılır?

ADOX, efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak sistein (bir amino asit) türevi bir ilaç olan asetilsistein ve ksantinler denilen bir ilaç grubunun üyesi olan doksofilin içermektedir.

Asetilsistein balgam sökücü, doksofilin bronşları gevşetici özelliğe sahiptir.

ADOX, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletlerdir. 5, 10 ve 20 efervesan tablet strip ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

ADOX astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılır.

2. ADOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Asetilsistein, doksofilin veya ADOX içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
- Kalp krizi geçirdiyseniz
- Tansiyonunuz düşükse
- Bebeğinizi emziriyorsanız

ADOX'u kullanmayınız.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

ADOX'u, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Kalp hastalığı veya kalp yetmezliği varlığında
- Hipoksemi (kanda oksijen seviyesinin düşük olması) varlığında
- Hipertiroid (tiroid bezinin aşırı çalışması) varlığında
- Karaciğer ve böbrek yetmezliği varlığında
- Mide ülseri varlığında
- Eş zamanlı enfeksiyon varlığında
- Sigara kullananlarda
- Yaşlılarda
- Bulantı ve kusmaya eğilimi oluşturabilecek herhangi bir rahatsızlık varlığında
- Astım hastalarında
- Öksürük refleksinin yeterli olmadığı kişilerde

Bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADOX'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

ADOX a veya tok karına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduėunuzdan řüpheleniyorsanız hemen doktorunuza syleyiniz.

Hamilelikte aıka gerekli olmadıka ADOX kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

ADOX'un st veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımı zerine etkisi bilinmemektedir.

ADOX'un ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

Sodyum uyarısı

ADOX her dozunda 26,54 mmol sodyum itiva eder. Bu durum kontroll sodyum diyetinde olanlarda gz nnde bulundurulmalıdır.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

ADOX diėer ksantin trevleri ve efedrinle birlikte kullanılmalıdır.

ADOX'un antisekratuar (vcut salgısı salımını engelleyici) ve antitussif (ksrk giderici) ilalarla beraber kullanılması uygun deėildir.

ADOX ieriėindeki asetilsistein antibiyotik grubu ilalarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmaları gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir sre olmalıdır.

Ařaėıdaki ilalarla birlikte kullanıldığında kandaki doksofilin seviyeleri artabilir, birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır:

- Eritromisin, troleandomisin, linkomisin, klindamisin gibi makrolid ve linkozamid grubundan antibiyotikler

- Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
- Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
- Propranolol (yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılır)
- Grip aşısı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ADOX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ADOX'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinlerde ve 14 yaşın üstündeki çocuklarda önerilen ADOX dozu günde 1 veya 2 efervesan tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

ADOX sadece ağızdan kullanım içindir.

ADOX, bir bardak suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.

ADOX, aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

7-14 yaş arası çocuklarda önerilen ADOX dozu günde bir efervesan tablettir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu yaş grubuna özel kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlar kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

ADOX daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

Eğer ADOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADOX kullandıysanız:

Aşırı doz kullanımı, mide-barsak bölgesinde tahrişe neden olabilir. Mide yanması, mide ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

ADOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADOX'u kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ADOX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. ADOX almayı bırakırsanız, hastalığınız daha kötüye gidebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ADOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ADOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Şiddetli alerjik reaksiyonlar (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte)).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hiperglisemi (yüksek kan şekeri)
- Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
- Takipne (solunumun hızlanması)
- Kalp ritminde bozukluk
- Albüminüri (idrarda albumin bulunması)
- Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında).
- Cilt kızarıklıkları veya iritasyonları.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Baş ağrısı
- Mide ağrısı
- Bulantı
- Kusma
- Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite)
- Ağız iltihabı
- Karın ağrısı
- İshal
- Ateş

Bunlar ADOX'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ADOX'un saklanması

ADOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADOX'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ADOX'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti

Florya asfaltı, Florya İş Merkezi No:88, Blok No:6

Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 79 52

Faks: 0 212 481 79 52

e-mail: info@mentisilac.com.tr

Üretim yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 26.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.