

KULLANMA TALİMATI

ALARİN® 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Loratadin.

Her tablet 10 mg loratadin içermektedir.

- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), mısır nişastası, magnezyum stearat (E572).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ALARİN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ALARİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ALARİN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ALARİN®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ALARİN® nedir ve ne için kullanılır?

ALARİN®, beyaz, küçük, yuvarlak tabletlerdir. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz bulunmaktadır.



ALARİN® etkin madde olarak “antihistaminikler” adı verilen bir ilaç sınıfına üye olan loratadin içermektedir.

ALARİN®, herhangi bir şeye alerjiniz olduğunda vücudunuz tarafından üretilen “histamin” adı verilen bir maddenin etkilerini durdurarak alerji belirtilerinizin azaltılmasına yardımcı olur.

ALARİN® kronik idiyopatik ürtiker, mevsimsel ve kronik (perennial) alerjik rinitin tedavisinde endikedir. ALARİN®, genellikle ürtiker (kurdeşen) olarak bilinen durumun belirtilerini (kaşıntı ve kızarıklık) gidermeye de yardımcı olur.

ALARİN®'in etkisi tüm gün devam eder ve normal günlük aktivitelere ve uyku düzeninize sürdürmenize yardımcı olacaktır.

Kendinizi daha iyi hissetmeyip daha kötü hissederseniz mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız.

2. ALARİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALARİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

- Loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

ALARİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

ALARİN®'i almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşireyle konuşunuz.

-Karaciğer hastalığınız varsa.

-Size alerjiler için herhangi bir deri testi yapılacaksa. ALARİN® tableti bu testlerden önce iki gün süreyle almayınız çünkü test sonuçları etkilenebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.



ALARİN®'in yiyecek, iecek ve alkol ile kullanılması

ALARİN® a ya da tok karına alınabilir.

ALARİN®'in alkollü ieceklerin etkilerini güçlendirdiđi gösterilmemiřtir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedbir amaçlı olarak, hamilelik sırasında loratadin kullanımından kaınılması tercih edilmelidir.

Hamile iseniz, hamile olduđunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Bebeđinizi emziriyorsanız, ALARİN®'i kullanmayınız. Loratadin anne sütüne geçmektedir.

Ara ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, ALARİN®'in sizde uyku hali oluřturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak ok nadir olarak, bazı kiřilerde ara sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluřabilir.

ALARİN®'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALARİN®, laktoz ierir; doktorunuz size bazı řekerlere karřı toleranssızlıđınız olduđunu söylediye, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.



Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Psikomotor performans arařtırmalarında, ALARİN® alkolle birlikte alındığında, alkolün etkilerini güçlendirici bir etkisinin bulunmadığı gösterilmiştir.

Tıbbi bir bitki olan ve hafif-orta şiddetteki depresyonda yardımcı tedavi için kullanılan St. John's wort (Sarı kantaron), loratadin emilim değerlerini deęiřtirebilir.

Ařağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ALARİN® tedavisine başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- Eritromisin (antibiyotik),
- Ketokonazol (mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılır),
- Simetidin (mide asidi üretimini azaltır).

Bu ilaçlar, loratadin düzeylerinde yükselmeye yol açarak istenmeyen olaylarda artışa yol açabilir.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ALARİN® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALARİN®'i her zaman bu kullanma talimatında belirtilen şekilde veya doktorunuzun, eczacınızın veya hemşirenin söylediğı şekilde alınız. Emin deęilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşireye danıřınız.

Tabletin üzerindeki çentik, tableti eşit dozlara bölmek için deęil, yutma kolaylığı için tabletin kırılmasını kolaylařtırmak içindir.



Ne kadar kullanılmalı?

Yaş	Ne kadar almalı?	Ne sıklıkta almalı?
6 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 30 kg dan fazla çocuklar ve yetişkinler	1 tablet	Günde bir kez
Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa, doktorunuz veya eczacınız tavsiye edilen dozu gün aşırı almanızı söyleyebilir. Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzun talimatlarına uyunuz.		

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir. Aç karnına veya besinlerle birlikte kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doğru miktarda ilaç verdiğinizden emin olmak için çocuğunuzun vücut ağırlığını bilmeniz önemlidir. Örneğin, 9 yaşındaki bir çocuğun vücut ağırlığı 30 kg'dır. Emin değilseniz çocuğunuzu tartınız ve ardından tabloda verilen talimatları izleyiniz.

Vücut ağırlığı 30 kg veya daha düşük olan ve 6 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz. 2 yaşından küçük çocuklarda ALARİN®'in güvenliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak yaşlılarda genel olarak karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonlarında azalma sıklığının daha yüksek olması ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavileri nedeniyle doz seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekmez. ALARİN®, şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.



Eğer ALARİN®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALARİN® kullandıysanız:

ALARİN®'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız derhal doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Hiçbir ciddi sorun beklenmez ancak baş ağrısı veya uyku hali yaşayabilirsiniz ya da kalp atışınız hızlanabilir.

ALARİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALARİN®'i kullanmayı unutursanız:

Dozunuzu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder fark etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşireye sorunuz.

ALARİN® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir ancak bunlar herkeste görülmez.

Yetişkin ve ergenlerde, alerjik burun akıntısı (alerjik rinit: AR) ve tekrar eden, nedeni bilinmeyen ürtiker (kronik idiyopatik ürtiker (CIU) endikasyonları için yapılan çalışmalarda en sık bildirilen istenmeyen etkiler; uyku hali, baş ağrısı, iştah artışı, gastrit (mide iltihabı) ve uykusuzluk şeklinde bildirilmiştir.

Pazarlama sonrası dönemde bildirilen istenmeyen reaksiyonlar ařađıda sistem organ sınıfına gre listelenmiřtir. Sıklıklar řu řekilde tanımlanmıřtır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde grlebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla grlebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla grlebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla grlebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az grlebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor.

Ařađıdakilerden biri olursa, ALARİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine bařvurunuz:

- řiddetli ařırı duyarlılık reaksiyonları, dil ve/veya bođazda řiřme, yutma/yutkunma gçlđ, kurdeřen (rtiker), nefes alma gçlđ, yzde alerjik řiřme (Quincke demi/anjiyodem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden bař dnmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALARİN'e karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Loratadinin pazarda bulunduđu dönemde ařađıdaki yan etkiler de grlmřtir:

Çok seyrek:

- Bař dnmesi,
- Nbetler,
- Hızlı veya dzensiz kalp atıřı,
- Çarpıntı,
- Bulantı,
- Ađız kuruluđu,
- Mide rahatsızlıđı,
- Karaciđer sorunları,



- Saç dökülmesi,
- Döküntü,
- Yorgunluk.

Bilinmiyor:

- Kilo artışı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ALARİN®'in saklanması

ALARİN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALARİN®'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Tabletin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz bu ilacı kullanmayınız.

İlaçlar evsel atıklarla veya kanalizasyon yoluyla atılmamalıdır. Artık kullanmadığınız ilacınızı nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALARİN®'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon: 0216 398 10 63
Faks: 0216 398 10 20

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe / İSTANBUL
Telefon: 0216 398 10 63
Faks: 0216 398 10 20

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.