

## KULLANMA TALİMATI

**ANDROCUR® 50 mg tablet**  
Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 50 mg siproteron asetat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon 25, susuz koloidal silika, magnezyum stearat.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ANDROCUR® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ANDROCUR®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ANDROCUR® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ANDROCUR®'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ANDROCUR® nedir ve ne için kullanılır?**

- ANDROCUR®, erkeklerde üretilen ancak daha düşük miktarlarda kadınlarda da bulunan seks hormonlarının etkisini bloke eden bir hormon preparatıdır. ANDROCUR®, kandaki testosteron hormonunun seviyesini azaltarak erkeklerde cinsel dürtülerin azalmasına yol açar. Androjenlerin, prostat kanserinin büyümesine katkıda bulunduğu hastalarda ANDROCUR®, bu etkiyi azaltır.
- Her ambalajda 50 adet ANDROCUR® tablet bulunmaktadır.
- Her bir tablette 50 mg siproteron asetat vardır.
- ANDROCUR® ayrıca 100 mg siproteron asetat içeren, 30 tabletlik ambalajda da sunulmaktadır.
- ANDROCUR® aşağıdaki durumlarda kullanılır:

**Kadınlarda:** Çok ciddi kıllanma artışı, ciddi erkeksi saç dökülmesi, sivilce ya da cilt yağlanmasının ciddi formları gibi ağır androjenizasyon belirtilerinde.

**Erkeklerde:** Seksüel sapmalarda cinsel dürtüleri azaltmak amacıyla. Ameliyat edilemeyen prostat kanserinde antiandrojen tedavisi olarak

## **2. ANDROCUR®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler** **ANDROCUR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Kadınlarda:

Eğer;

- Hamileyseniz,
- Emziriyorsanız,
- Karaciğer hastalığınız varsa,
- Dubin-Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)
- Bir önceki hamileliğinizde sarılık ya da inatçı kaşıntı öykünüz varsa,
- Hamilelikte herpes öykünüz varsa,
- Önceden ya da hala var olan karaciğer tümörünüz varsa,
- İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,
- Zayıflamaya neden olan bir hastalığınız varsa,
- Ciddi kronik depresyonunuz varsa,
- Önceden ya da halihazırda olan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
- Damar değişikliklerine yol açmış ciddi şeker hastalığınız varsa,
- Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık) varsa,
- İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

Erkeklerde cinsel sapkınlık tedavisinde:

Eğer;

- Karaciğer hastalığınız varsa,
- Dubin Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)
- Önceden ya da hala mevcut bir karaciğer tümörünüz varsa,
- İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,
- Zayıflamaya neden olan bir hastalığınız varsa,
- Ciddi kronik depresyonunuz varsa,
- Önceden ya da hala var olan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
- Damar değişikliklerine yol açmış ciddi şeker hastalığınız varsa,
- Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık) varsa,
- İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

### **Erkeklerde ameliyat edilemeyecek prostat kanserinde:**

Eğer;

- Karaciğer hastalığınız varsa,

- Dubin Johnson sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık), Rotor sendromu (sarılığa neden olan genetik bir hastalık)
- Önceden ya da hala mevcut karaciğer tümörünüz varsa,
- İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa veya daha önce olduysa,
- Zayıflamaya neden olan bir hastalığınız varsa,
- Ciddi kronik depresyonunuz varsa,
- Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
- İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

**ANDROCUR®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Eğer;

- Sarılık, hepatit ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,
- Şeker hastalığınız varsa,
- Aneminiz (kansızlık) varsa ,
- Hormon içeren ilaç kullanıyorsanız,
- Alkol kullanıyorsanız,
- Daha önce bacadaki damar tıkanıklığı (derin ven trombozu), akciğerde pıhtı (pulmoner embolizm), kalp krizi (miyokard infarktüsü) ve inme (serebrovasküler olay) gibi arteriyel veya venöz kan pıhtısı sorunuyla karşılaştıysanız,
- Nefes darlığınız varsa.

Prostat kanseri tedavisi görüyorsanız (erkeklerde) ve aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birini geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

- Kan dolaşım bozukluğunuz varsa (erkeklerde),
- Orak hücreli aneminiz (bir tür kansızlık) varsa (erkeklerde),
- Damar değişikliğine neden olan ileri şeker hastalığınız varsa (erkeklerde).

Karaciğer ve böbreküstü bezi fonksiyonları düzenli takip edilmelidir.

ANDROCUR® cinsel uyarımları baskılama amacı ile kullanılıyorsa alkol ANDROCUR®'un bu uyarım-baskılayıcı etkisini azaltabilir.

Eğer doktorunuz, ANDROCUR® ile birlikte kombine tedavi için DIANE-35 gibi hormon içeren bir ilaç da reçetelemiş ise, DIANE-35'in kullanma talimatında yer alan bilgilere de bakınız.

18 yaş ve altındaki çocuklarda (kız ve erkek) ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. ANDROCUR® ergenlik sona ermeden önce verilmemelidir keza boy uzaması ve endokrin fonksiyonu üzerine olumsuz etkileri konusu bilinmemektedir.

İyi huylu beyin tümörünüz (meninjiyom) varsa doktorunuz ANDROCUR® tedavisini durduracaktır.

Kadınlarda tedaviye başlamadan önce tam medikal ve jinekolojik muayene yapılmalı ve hamilelik ihtimali elenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ANDROCUR®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Tabletler, yemeklerden sonra yeterli miktarda su ile alınmalıdır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ANDROCUR® hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ANDROCUR®, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

ANDROCUR®, yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğuna neden olabilir, zindeliği azaltabilir.

### **ANDROCUR®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ANDROCUR®, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker çeşitlerine karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki ilaçları ANDROCUR® ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz:

- Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol,
- Viral bir enfeksiyon olan HIV'nin tedavisinde kullanılan ritonavir,
- Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin,
- Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin,
- Sarı kantaron otu,
- Kolesterol düşürmek amacıyla kullanılan statin grubu ilaçlar.

Yüksek doz ANDROCUR® (100 mg, günde 3 kez), alınan diğer ilacın etki göstermesini sağlayan bazı karaciğer enzimlerinin etkisini yavaşlatabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ANDROCUR® nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Kadınlarda:

Çocuk doğurma yaşındaki kadınlar:

Hamileyseniz ANDROCUR® kullanmamanız gereklidir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızı saptanması gereklidir.

Tedaviye adet döneminin ilk gününde başlanmalıdır (kanamanın birinci günü). Yalnızca adet kanaması gerçekleşmeyen kadınlar (amenore) ANDROCUR® tedavisine hemen başlayabilir. Bu durumda tedavinin ilk günü adetin birinci günü olarak kabul edilecek ve tablet kullanım tavsiyelerine normal şekilde uyulacaktır.

Adetin ilk gününden 10. gününe kadar (toplam 10 gün) günde 2 tablet ANDROCUR® kullanılır. Buna ek olarak, adet döngüsünü stabilize etmek ve gebelikten korunmak amacı ile 1.- 21. günlerde (21 gün) günde 1 tablet DIANE- 35 alınır. Bir süre sonra doz doktorunuz tarafından günde yarım ya da 1 tablete düşürülebilir.

Periyodik kombine tedavi uygulanıyorsa, tabletleri her gün aynı saatte almalısınız.

DIANE- 35 tabletlerinin 21 günlük kullanımını takiben 7 günlük tablet alınmayan dönem bulunmaktadır ve bu zaman aralığında kanama meydana gelir.

İlk adet döngüsü tedavisinin başlangıcından tam 4 hafta (28 gün) sonra, haftanın tam olarak aynı gününde, kanamanın durmuş olup olmamasına bakılmaksızın, bir sonraki kombine tedavi periyoduna başlanır.

Doktorunuz DIANE- 35 ile uygulanan kombine tedavi sırasında klinik gelişme elde edildiğini fark ederse, ANDROCUR'un günlük dozajını kombine tedavinin ilk 10 günü boyunca 1 veya 1/2 tablete düşürebilir. DIANE- 35 tek başına da yeterli olabilir.

#### **Kanamamanın gerçekleşmemesi**

Ender durumlarda, kanama gerçekleşmediği takdirde, tablet alımı geçici bir süre için bırakılır ve tablet alımına yeniden başlamadan önce hamilelik bulunup bulunmadığının ortaya konulması için doktora danışılmalıdır.

#### **Menopoz sonrası dönemde bulunan veya histerektomi geçirmiş hastalar**

Menopoz sonrası dönemde bulunan veya histerektomi geçirmiş hastalarda ANDROCUR tek başına alınmalıdır. Şikayetlerin ciddiyetine bağlı olarak, ortalama ANDROCUR dozajı 21 gün boyunca günde bir kere 1 ila ½ tablet olmalı, bunu 7 günlük tablet alınmayan ara dönem izlemelidir.

Erkeklerde:

Seksüel sapmalarda cinsel dürtüleri azaltmak amacıyla:

Doktorunuz, kişiye uygun dozu belirleyecektir.

1. Tedaviye genelde günde iki kere 1 tablet ANDROCUR alınarak başlanır.
2. Doktorunuz dozu günde iki kere 2 tablet veya hatta kısa bir dönem için günde üç kere 2 tablet olarak artırabilir.
3. Tatminkar bir sonuca ulaşıldığında, doktorunuz etkinin sürdürülmesi için gerekli olan en düşük dozu almanızı sağlayacaktır. Genellikle günde iki kere ½ tablet yeterli olmaktadır.

4. Devam dozu ayarlanırken veya preparat kullanımına ara verilirken, doktorunuz dozajı dereceli olarak azaltacaktır. En sonunda, doktorunuz günlük dozu birkaç haftada bir ara verilerek, günde 1 tablet veya ½ tablet oranına düşürebilir.

Terapötik etkinin stabilize edilmesi için, ANDROCUR 'un uzun süreli kullanılması gereklidir. Doktorunuz bu süre içerisinde sizi, psikoterapi görmemiz için yönlendirebilir.

Ameliyat edilemeyen prostat kanserlerinde antiandrojen tedavi:

Günlük doz günde iki veya üç kere 2 tablet ANDROCUR'dur (=günde 200 – 300 mg).

Bir iyileşme hissettiğinizde doktorunuzun yazdığı tedavi veya dozajı değiştirmeyin veya kullanıma ara vermeyin.

- GnRH-agonistleri ile kombine tedavide, başlangıçta yükselen androjen düzeylerine karşı:
  1. Başlangıçta, günlük doz 5 – 7 gün boyunca, yalnızca günde iki kere 2 tablet ANDROCUR'dur (= günde 200 mg).
  2. Bunu takiben 3 – 4 hafta boyunca, günde iki kere 2 tablet ANDROCUR (= günde 200 mg) ile birlikte önerilen dozajda GnRH agonisti verilir (GnRH agonistin reçete bilgilerine bakınız).
- Testisleri cerrahi olarak çıkartılmış ve GnRH grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda sıcak basmalarını tedavi etmek için:
  1. Günlük doz günde 1-3 tablet ANDROCUR'dur (=günde 50-150 mg).
  2. Gerekli olduğunda doz günde üç kere 2 tablete kadar yükseltilebilir (günde 300 mg).

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

ANDROCUR® yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** Güvenlilik ve etkililiğine dair yeterli veri bulunmadığı için, erkek çocuklarda ve 18 yaş altındaki kız ve erkeklerde kullanımı önerilmez. ANDROCUR® ergenlik sona ermeden önce verilmemelidir keza boy uzaması ve endokrin fonksiyonu üzerine olumsuz etkileri konusu bilinmemektedir.

ANDROCUR® 50, kadın adolesanlarda yalnızca ergenlik çağından sonra kullanılabilir. Doz ayarlaması gerektiğini destekleyen veri bulunmamaktadır.

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlılarda, doz ayarlaması gerektiğini destekleyen veri bulunmamaktadır.

#### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:** Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek olduğunu destekleyen veri bulunmamaktadır.

**Karaciğer yetmezliği:** ANDROCUR® karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe kullanılmamalıdır.

*Eğer ANDROCUR®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDROCUR® kullandıysanız:**

ANDROCUR®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

**ANDROCUR®'u kullanmayı unutursanız**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kadınlarda:

Tabletleri normal zamanında hormon içeren ilaç (progestagen-estrogen) ile birlikte almaya devam edin. DIANE- 35 gibi hormon içeren bir ilaç ile birlikte periyodik kombine tedavi alıyorsanız, hormon içeren tableti günün belirli bir saatinde almayı sürdürmeniz gereklidir (ANDROCUR ile birlikte).

Doğum kontrol haplarını normal zamanında almayı unutursanız, en geç takip eden 12 saat içerisinde almanız gereklidir. Doğum kontrol tabletinizi almanızın üzerinden 12 saatten fazla bir süre geçtiyse, o adet döngüsü için doğum kontrol haplarının korumasında azalma meydana gelmiş olabilir. Doğum kontrol haplarının güvenilirlik konusundaki özel notlara ve doğum kontrol hapları için ürün bilgilerindeki ihmal edilen ilaçlara yönelik önerilere dikkat edin. Bu adet dönemi sonrasında kanama meydana gelmezse, tablet alımına yeniden başlanmadan önce hamilelik durumu bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.

Erkeklerde:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız ve tabletlerinizi normal zamanında almaya devam ediniz.

**ANDROCUR® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun size ANDROCUR® reçetelemesini gerektiren başlangıç şikayetleri kötüleşebilir. Doktorunuz söylemediği sürece, tabletleri kullanmaya devam ediniz. ANDROCUR® 'u sonlandırmak istiyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ANDROCUR®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ANDROCUR®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonlar,
- Döküntü
- Karın içi kanama

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANDROCUR®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kemik erimesi,
- Beyin tümörleri (meninjiyom)
- İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri
- Pıhtılaşmaya eğilim artışı
- Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Kilo artışı
- Kilo azalması
- Cinsel istek azalması
- Sertleşme bozukluğu
- Depresif durum
- Huzursuzluk
- Cinsel istek artışı
- Yumurtlama olmaması
- Sperm oluşmaması
- Meme hassasiyeti
- Meme büyümesi
- Yorgunluk
- Sıcak basması
- Nefes darlığı
- Anemi
- Terleme
- Lekelenme kanamaları

Bunlar ANDROCUR<sup>®</sup>'un hafif yan etkileridir.

Olası yan etkiler, görülme sıklıklarına göre de aşağıda yer almaktadır.

Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı Çok yaygın ( $\geq 1/10$ ); yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ ); yaygın olmayan ( $\geq 1/1000$  ila  $< 1/100$ ); seyrek ( $\geq 1/10.000$  ila  $< 1/1000$ ); çok seyrek ( $< 1/10.000$ ), klinik çalışmalarda elde edilen verilere dayanmaktadır.

Kadınlarda

### **İyi ve kötü huylu tümörler**

Bilinmiyor: İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri, beyinde iyi huylu tümörler (meninjiyom)



**Baęışıklık sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor : Aşırı duyarlılık reaksiyonu

**Metabolizma ve beslenme hastalıkları**

Bilinmiyor : Kiloda artış veya azalma

**Psikiyatrik rahatsızlıklar**

Bilinmiyor: Depresif duygu durumu, huzursuzluk (geçici), cinsel istek azalması, cinsel istek artışı

**Deri ve derialtı doku hastalıkları**

Bilinmiyor: Döküntü

**Gastrointestinal hastalıklar**

Bilinmiyor: İntraabdominal (karın boşluğu) kanama

**Üreme sistemi ve meme hastalıkları**

Bilinmiyor: Yumurtlamanın baskılanması, memede hassasiyet, lekelenme kanamaları

**Genel-bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar**

Bilinmiyor: Bitkinlik

**Hepato-bilier hastalıklar**

Bilinmiyor: Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki

**Vasküler hastalıklar**

Bilinmiyor: Pıhtılaşmaya eğilim artışı

**Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar**

Bilinmiyor: Nefes darlığı

Erkeklerde

**İyi, kötü huylu ve belirlenmemiş tümörler**

Çok seyrek: İyi ve kötü huylu karaciğer tümörleri

Bilinmiyor: Beyinde tümörler (meninjiyom)

**Kan ve lenf sistemi hastalıkları**

Bilinmiyor: Anemi (kansızlık)

**Baęışıklık sistemi hastalıkları**

Seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonu

**Metabolizma ve beslenme hastalıkları**

Yaygın: Kilo artışı ya da kilo azalması

**Psikiyatrik hastalıklar**

Çok yaygın: Cinsel istek azalması, sertleşme bozuklukları

Yaygın: Depresif duygu durum, huzursuzluk (geçici)

**Vasküler hastalıklar**

Bilinmiyor: Pıhtılaşmaya eğilim artışı

**Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar**

Yaygın: Nefes darlığı

**Gastrointestinal hastalıklar**

Bilinmiyor: Karın içi kanama

**Hepato-bilier hastalıklar**

Yaygın: Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki

**Deri ve derialtı doku hastalıkları**

Yaygın olmayan: Döküntü

**Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları**

Bilinmiyor: Kemik erimesi

**Üreme sistemi ve meme hastalıkları**

Çok yaygın: Sperm üretiminin geri dönüşümlü inhibisyonu

Yaygın: Erkeklerde memelerde büyüme

**Genel-bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar**

Yaygın: Bitkinlik, ateş basması, terleme

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. ANDROCUR®'un saklanması**

*ANDROCUR®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANDROCUR®'u kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ANDROCUR®'u kullanmayınız.*

***Ruhsat sahibi:***

Bayer Schering Pharma AG Almanya lisansı ile;  
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53  
34770 Ümraniye – İstanbul

***Üretim yeri:***

Dellpharm Lille S.A.S, Lys-Lez-Lannoy/ Fransa

Bu kullanma talimatı 30/11/2010 tarihinde onaylanmıştır.