

KULLANMA TALİMATI

BUTAFLY %1 losyon
Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 ml losyon, butenafin hidroklorür 9.8 mg içerir.

Yardımcı maddeler: Etanol (% 96' lık), gliserin, propilen glikol, deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. .*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında

- 1. BUTAFLY nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. BUTAFLY'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. BUTAFLY nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. BUTAFLY'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTAFLY nedir ve ne için kullanılır?

- BUTAFLY; 10 ml'lik şişelerde pazarlanan, butenafin hidroklorür içeren ve sadece haricen kullanılan bir losyondur.
- BUTAFLY, ciltte bir çeşit mantar sebebi ile oluşan sarımsı kahve veya kahverengi döküntülerin (tinea versicolor) topikal tedavisinde kullanılır.

2. BUTAFLY'I kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAFLY'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Butenafin hidroklorüre ve BUTAFLY'ın bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa,
- Eş zamanlı bir başka topikal krem/losyon kullanıyorsanız,
- 12 yaşın altındaki çocuklarda.

BUTAFLY'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- BUTAFLY'ın göz, burun, ađız ya da mukoz membranlarla temasından kaçınınız.
- Ciltte tahriř olursa kullanıma ara veriniz.
- Allilamin grubu antifungal ajanlara (örn: terbinafin) hassasiyetiniz varsa BUTAFLY'ı dikkatli kullanınız.
- Hamilelik durumunda doktora danıřmadan kullanmayınız.
- Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

BUTAFLY'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamilelik döneminde sadece gerekli olduđu durumlarda ve doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BUTAFLY süte geebileceđi iin emzirme döneminde doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımına bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

BUTAFLY'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İeriđinde bulunan yardımcı maddeler nedeniyle, gecikmiř alerjik reaksiyonlar, lokal deri reaksiyonları olabilir. Propilen glikol iermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

BUTAFLY'ın diđer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılıđıyla bilinen ya da beklenen bir etkileřimi yoktur.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTAFLY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar

Doktor tarafından bařka řekilde tavsiye edilmediđi durumlarda BUTAFLY'ı günde 1 kez uygulayınız. Tedavi süresi 14 gündür.

Uygulama yolu ve metodu

BUTAFLY sadece haricen kullanım içindir.

Etkilenen bölge ve yakın çevresini kaplayacak deri üstüne sürünüz. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda Kullanım

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanım

BUTAFLY'nın yaşlı hastalardaki kullanımını yetişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

Eğer BUTAFLY'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla BUTAFLY kullandıysanız

BUTAFLY'ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız endişelenmeyiniz, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUTAFLY, sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur.

BUTAFLY'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

BUTAFLY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUTAFLY'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın	:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:		100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:	1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

- Kaşıntı
- Deride kızarıklık, tahriş
- Yanma/batma
- Cilt ülseri (kontakt dermatit)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BUTAFLY’ın saklanması

BUTAFLY’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce BUTAFLY’ı kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTAFLY’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad.No:4
34467 Maslak -Sarıyer/ İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Cad. No.3
Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı 08/05/2014 tarihinde onaylanmıştır.