

## KULLANMA TALİMATI

### CAMPRAL 333 mg 84 enterik tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 333 mg Akamprosata içerir.
- **Yardımcı maddeler :** Krosppovidon, Mikrokristalize selüloz, Magnezyum silikat, Sodyum nişasta glikolat, Kolloidal silika, Magnezyum stearat, Akrilik asit etil ester ve metakrilik asidin anyonik kopolimeri (EUDRAGIT L 30 D), Talk, Propilen glikol.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **CAMPRAL nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **CAMPRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ?**
3. **CAMPRAL nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
5. **CAMPRAL’in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. CAMPRAL nedir ve ne için kullanılır?**

CAMPRAL 333mg Enterik Tablet , barsaklarda çözünen ve alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

CAMPRAL, alkol bağımlısı hastalarda abstinans (alkolden uzak durma) durumunun sürdürülmesine yardımcı olur .

#### **2. CAMPRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eğer;

- Akamprosata allerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
- Böbrek yetmezliğiniz varsa.

- ocuksanız (18 yař altı)
- Yařlı iseniz (65 yař üzeri)
- Emziriyorsanız

### **CAMPRAL’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Karacięer hastalıęınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **CAMPRAL’in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yemeklerle birlikte alındıęında ilacın emilimi azalabilir, bu nedenle mmknse a karnına alınmalıdır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Doktorunuzun tavsiyesi haricinde, gebelik dneminde CAMPRAL kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

Emziren kadınlarda CAMPRAL kullanılmamalıdır.

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makine kullanımı**

İlacın araba ve makine kullanımı zerinde hi bir etkisi yoktur.

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

Alkol ve CAMPRAL’in birlikte kullanımı, her ikisinin de vcuttaki aktivitesini etkilemez.

Dislfirmam, akamprosatin yapısını etkilemez ve akamprosatin ve dislfirmamın birlikte kullanımı iyi tolere edilir ve alkolszlk toleransını ykseltir.

Akamprosatin; alkol baęımlılıęı tedavisinde yaygın olarak kullanılan depresyon tedavisi ve anksiyete tedavisi ilaları ile (diazepam, oksazepam, tetrabamat, meproamat ve imipramin) etkileřmemektedir.

Dislfirmam ile birlikte alınmasının akamprosatin vcuttaki aktivitesi zerinde etkisi yoktur.

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. CAMPRAL 333 mg Enterik Tablet nasıl kullanılır ?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar**

60 kg stndeki kiřiler iin gnde 6 tablet

60 kg altındaki kiřiler iin ise gnde 4 tablet

### **Uygulama yolu ve metodu:**

- Tabletleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.
- Tabletleri ięnemeyiniz.

- Kaç tablet alacağınızı ve bunları hangi sıklıkta alacağınız konusunda her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Dozaj, sabah, öğle ve akşam şeklinde üçe bölünerek veya doktorunuzun önerdiği şekilde alınır.

6 tablet : sabah iki, öğle iki ve akşam iki tablet

4 tablet : sabah iki, öğle bir ve akşam bir tablet

Eğer sindirim sisteminizde engel bir durum yoksa ilacı aç karnına alınız.

Tedavinin süresi:

Ortalama tedavi süresi 1 yıldır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

CAMPRAL'in çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

65 yaş üstündeki hastalarda CAMPRAL kullanılması önerilmemektedir.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu konuda yeterli veri olmadığından CAMPRAL kullanımı ile ilgili hekiminizin tavsiyesine uyunuz.

##### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliğiniz varsa CAMPRAL kullanılması önerilmemektedir.

*Eğer CAMPRAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla CAMPRAL kullandıysanız:**

*CAMPRAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **CAMPRAL' i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

##### **CAMPRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki yoktur.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CAMPRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, CAMPRAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Allerjik reaksiyonlar:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri,
- Döküntü.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CAMPRAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Çok yaygın yan etkiler :**

İshal

**Yaygın yan etkiler :**

Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, gaz şikayeti, kaşıntı, ciltte kızarıklık veya kabarcık, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık

**Yaygın olmayan yan etkiler :**

Cinsel istekte artış

**Sıklığı bilinmeyen yan etkiler :**

Aşırı hassasiyet reaksiyonları

*Eğer bu yan etkilerden biri ciddi hal alırsa veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**4. CAMPRAL'ın saklanması**

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Etiketindeki son kullanma tarihinden sonra Campral'ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

30° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

*Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Campral'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olacaktır.*

**Ruhsat Sahibi** :Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.  
Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok.  
No:16/18 Kavacık Ticaret Merkezi K:4-5-6  
34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL  
Tel : 0216 578 66 00  
Faks : 0216 578 66 99  
e-mail : [bilgi@merckgroup.com](mailto:bilgi@merckgroup.com)

**Üretim yeri** : **MERCK SANTE S.A.S.**  
2, rue du Pressoir rue du Pressoir Vert  
45400 Semoy / Fransa

*Bu Kullanma Talimatı*

*tarihinde onaylanmıştır.*