

## KULLANMA TALİMATI

### CEFNOT 250 mg Efervesan Tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir efervesan tablet 250 mg sefprozil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000, sukraloz (E 955), P.V.P.K-30, sodyum klorür, böğürtlen aroması

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **CEFNOT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CEFNOT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CEFNOT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CEFNOT'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. CEFNOT nedir ve ne için kullanılır?**

CEFNOT'un etkin maddesi sefprozil, ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

CEFNOT, krem renkli, yuvarlak, bir yz entikli efervesan tabletlerdir. 20 efervesan tablet ieren plastik tp silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

CEFNOT, yetiřkinlerde boēaz, bademcik veya sins iltihabı gibi st solunum yolu enfeksiyonlarının, bronř iltihabı ve zatrre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuřak doku enfeksiyonlarının ve kısa sreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

ocuklarda ise boēaz, bademcik, orta kulak veya sins iltihabı gibi st solunum yolu enfeksiyonlarının ve komplike olmayan deri ve yumuřak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

## **2. CEFNOT'u kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler**

### **CEFNOT'u ařaēıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eēer;

- Sefprozil'e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEFNOT'un diēer bileřenlerine karřı ařırı duyarlı (alerjik) iseniz.

### **CEFNOT'u ařaēıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Eēer;

- Penisiline karřı ařırı duyarlı (alerjik) iseniz,
- Tedavi sırasında ishal olursanız,
- Ciddi bbrek yetmezliēiniz varsa (bu durumda dozun deēiřtirilmesi gerekebilir),
- Gl idrar sktrc ilalar (diretikler) ile tedavi oluyorsanız.

CEFNOT'un uzun sre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların geliřimine (sperenfeksiyona) neden olabilir. Eēer tedavi sırasında sperenfeksiyon oluřursa, uygun nlemlerin alınması gerekir.

CEFNOT, zellikle kalın barsak iltihabı olan ve mide-barsak ile ilgili hastalık gemiři olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri grlebilir.

CEFNOT'un 6 aydan kk bebeklerde kullanılması nerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **CEFNOT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

CEFNOT'un yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur. Yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

CEFNOT kesinlikle gerekli olmadıka hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında CEFNOT kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız CEFNOT kullanırken dikkatli olunuz ünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (% 0.3'ünden daha az) anne sütüne geçer.

### **Ara ve makine kullanımı**

CEFNOT'un ara ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

### **CEFNOT'un ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

CEFNOT ieriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağı olumsuz bir etki beklenmez.

CEFNOT her dozunda 271,13 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

Eğer;

- Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
- Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

- Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (CEFNOTOR dahil) dikkatli uygulanmalıdır.

CEFNOTOR bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

*Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CEFNOTOR nasıl kullanılır?**

CEFNOTOR'u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediđi şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- CEFNOTOR tabletler duyarlı bakterilerin neden olduđu enfeksiyonlarda 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 500 ila 1000 mg dozlarda, 12 yaşından küçük çocuklarda ise günde 15-30 mg/kg dozlarda kullanılır.
- Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
- En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.
- Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Betahemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, CEFNOTOR 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
- İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
- CEFNOTOR tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

#### **Deđişik yaş grupları**

##### **6 aydan küçük bebeklerde kullanımı:**

Yeterli çalışma olmadığından, CEFNOTOR'un 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

##### **Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:**

CEFNOTOR 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez.

## **Özel kullanım durumları**

**Böbrek yetmezliği:** Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda CEFNOR dozunun ayarlanması gerekebilir.

*Eğer CEFNOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

## **Kullanmanız gerekenden fazla CEFNOR kullandıysanız:**

*CEFNOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **CEFNOR'u kullanmayı unutursanız:**

CEFNOR'u kullanmayı unutursanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **CEFNOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuz CEFNOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CEFNOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa CEFNOR'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kaşıntı,
- Ciltte kızarıklık,
- Döküntü,
- Yüz ve boğazda ödem,
- Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
- Sarılık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFNOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lököpeni),
- Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklarının azalması (trombositopeni),
- Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
- Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme,
- Pişik,
- İlaça duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
- Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
- Ateş,
- Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan alerji tepkisi),
- Stevens Johnson sendromu,
- Kalın bağırsak iltihabı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- İshal,
- Bulantı,
- Kusma,
- Karın ağrısı,
- Baş dönmesi,
- Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,
- Baş ağrısı,
- Sinirlilik,
- Uykusuzluk,

- Zihin karışıklığı,
- Uyuklama,
- Dişlerde renk değişmesi.

Bunlar CEFNOR'un hafif yan etkileridir.

bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla

#### **5. CEFNOR'un Saklanması**

*CEFNOR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

CEFNOR'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNOR'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFNOR'u kullanmayınız

#### **Ruhsat Sahibi:**

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3

Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0 850 201 23 23

Faks: 0 212 482 24 78

e-mail: bilgi@neutec.com.tr

**Üretim Yeri:**

Neotec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı ( ) tarihinde onaylanmıştır.*