

## KULLANMA TALİMATI

### CEFNOT 500 mg efervesan tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir efervesan tablet 500 mg sefprozil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000, sukraloz (E 955), P.V.P.K-30, sodyum klorür, böğürtlen aroması

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **CEFNOT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CEFNOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CEFNOT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CEFNOT'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. CEFNOT nedir ve ne için kullanılır?**

CEFNOT'un etkin maddesi sefprozil, ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

CEFNOT, krem rengi, yuvarlak, bir yuzu çentikli efervesan tabletlerdir. 20 efervesan tablet içeren plastik tûp silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

CEFNOT, ařağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

- Yutak iltihabı ve bademcik iltihabı,
- Orta kulak iltihabı,
- Sinüzit (Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)
- Bronş iltihabı,
- Zatüre,
- Deri iltihapları
- İdrar yolu iltihapları.

## **2. CEFNOT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**CEFNOT'u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eđer, sefprozile ya da ilacın içindeki diđer maddelerden her hangi birine karřı bir alerjik reaksiyonunuz varsa CEFNOT'u kullanmamalısınız.

**CEFNOT'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

- Penisiline karřı aşırı duyarlılığınız varsa,
- Kalın bağırsak iltihabınız varsa,
- Hamileyseniz veya bebeđinizi emziriyorsanız
- Böbrek bozukluđunuz veya hastalığınız varsa,
- Küçük çocuklarda
- Yařlılarda

CEFNOT'u dikkatli kullanınız

“Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.”

## **CEFNOT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Sefprozil yiyeceklerle iliřkili bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelik döneminde CEFNOR kullanımını hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

CEFNOR, emzirme döneminde dikkatli kullanılmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

CEFNOR'un araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

### **CEFNOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

CEFNOR içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

CEFNOR her dozunda 241,04 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

- Probenesid
- Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)
- Doğum kontrol hapları
- Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar)
- Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CEFNOR nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkinler (12 yaş ve üzeri):

Yutak ve bademcik iltihabında: Günde bir defa 500 mg efervesan tablet.

Sinüzit (Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı): 12 saatte bir 250-500 mg efervesan tablet

Zatüre ve bronş iltihabında: 12 saatte bir 500 mg efervesan tablet

Komplike olmayan idrar yolu iltihaplarında: Günde bir defa 500 mg efervesan tablet

Deri iltihaplarında: 12 saatte bir 250 mg veya 24 saatte bir 500 mg efervesan tablet

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

CEFNOT, ağız yoluyla, bir bardak suda (150 ml) eritilerek alınır. Aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda (6 ay -12 yaş) tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Orta kulak iltihabında: 12 saatte bir 15 mg/kg

Yutak ve bademcik iltihabında: Günde bir defa 20 mg/kg veya 12 saatte bir 7.5 mg/kg

Sinüzitte (Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı): 12 saatte bir 7.5 mg/kg-15mg/kg

Deri iltihabında: Günde bir defa 20 mg/kg

Maksimum günlük çocuk dozu, yetişkinler için önerilen günlük maksimum dozu geçmemelidir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde, CEFNOT 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

6 aydan küçük bebeklerde orta kulak iltihabı veya sinüzit tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği; ayrıca 2 yaşın altındakilerde ise yutak ve bademcik iltihabı veya deri iltihabı tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek probleminiz varsa doktorunuz bazı testler uygulayacak ve gerekirse CEFNOR'un dozunu düşürecektir.

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer CEFNOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden fazla CEFNOR kullandıysanız**

*CEFNOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefprozil'i vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

#### **CEFNOR'u kullanmayı unutursanız**

İlacınızı almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildirin.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **CEFNOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Eğer CEFNOR kullanımını konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak CEFNOR kullanımını sonlandırabilirsiniz.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CEFNOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, CEFNOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFNOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Karaciğer enzimlerinde artma, sarılık
- Eozinofili (kanda eozinofil denenen kan hücrelerinin sayısının artması), lökopeni (kanda akyuvar sayısında azalma)
- Kan üre azotunda ve serum kreatininde artış (böbrek bozukluklarını işaret eder)
- Kanlı, sulu ishale seyreden barsak iltihabı (psödomembranoz kolit)

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- Diyare, bulantı, kusma ve karın ağrısı
- Döküntü, kurdeşen
- Baş dönmesi
- Aşırı hareketlilik,
- Baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı ve uyku hali
- Pişik,
- Cinsel organlarda kaşıntı ve vajina iltihabı

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. CEFNOR'un Saklanması**

*CEFNOE'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNOR'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFNOR'u kullanmayınız

***Ruhsat Sahibi:*** Novitas İlaç San. Tic. Ltd. Şti.  
General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi  
Bağımsız Bölüm No:8  
Güngören/İSTANBUL  
Telefon: 0 212 481 76 41  
Faks: 0 212 481 76 41  
e-mail: [info@novitasilac.com.tr](mailto:info@novitasilac.com.tr)

***Üretim Yeri:*** Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 07.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.*