

## KULLANMA TALİMATI

### DESİUS 2.5 mg/5 ml Şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin Madde:** Her 1 ml'de 0.5 mg desloratadin içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Sorbitol, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sodyum benzoat, disodyum edetat, sukroz, muz aroması, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DESİUS nedir ve ne için kullanılır?**
  2. **DESİUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  3. **DESİUS nasıl kullanılır?**
  4. **Olası yan etkileri nelerdir?**
  5. **DESİUS'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. DESİUS nedir ve ne için kullanılır?**

DESİUS, çocuk korumalı kapaklı 150 ml'lik şişelerde ambalajlanmıştır.

DESİUS, uyku hali oluşturmeyen antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

DESİUS alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.

DESİUS ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelere devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

## **2. DESİUS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **DESİUS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eğer,

- Desloratadin, loratadin veya DESİUS'un yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

DESİUS 6 ay ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinlerde kullanılır.

### **DESİUS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Eğer,

- Böbrek fonksiyonlarınız zayıfsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

**DESİUS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

DESİUS besinlerle ya da ayrı alınabilir.

**Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer hamileyseniz DESİUS kullanmayınız.

**Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız DESİUS kullanmayınız.

**Araç ve makine kullanımı**

Önerilen dozlarda, DESİUS'un sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DESİUS, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

**DESİUS'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DESİUS şurup sukroz ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; buna bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

DESİUS'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DESİUS nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

6 aydan 11 aya kadar olan çocuklar: Günde bir kez 2 ml şurup alınız.

1 yaştan 5 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kez 2,5 ml şurup alınız.

6 yaştan 11 yaşa kadar olan çocuklar: Günde bir kez 5 ml şurup alınız.

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kere 10 ml şurup alınız.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESİUS almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. DESİUS'u besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz

#### **Değişik yaş grupları**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

DESİUS şurup 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

DESİUS'un etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Karaciğer yetmezliğinde kullanım**

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

#### **Böbrek yetmezliğinde kullanım**

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, DESİUS dikkatle kullanılmalıdır.

*Eğer DESİUS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DESİUS kullandıysanız**

DESİUS'u yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

*DESİUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **DESİUS'u kullanmayı unuttuysanız**

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **DESİUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DESİUS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık

gözlemlenen yan etkilerdir.

İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

Farklı organ sistemlerinde;

Çok yaygın ( $\geq 1/10$ ), yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ ), yaygın olmayan ( $\geq 1/1,000$  ila  $< 1/100$ ), seyrek ( $\geq 1/10.000$  ila  $< 1/1.000$ ), çok seyrek ( $< 1/10.000$ ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

*Yaygın:* Bitkinlik.

*Yaygın olmayan:* Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

*Çok seyrek:* Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz

##### **5. DESİUS'un saklanması**

*Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.*

*25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DESİUS'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DESİUS'u kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4  
34349-Esentepe-İSTANBUL  
Tel: 0 212 376 65 00  
Faks: 0 212 213 53 24

**Üretici:** Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.  
Adil Mah. Beykoz Cad. Bahar Sok. No:1  
Sultanbeyli/ İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 23/09/2011 tarihinde onaylanmıştır.*