

## KULLANMA TALİMATI

### DESYREL® 50 mg film tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her DESYREL® 50 mg'da, 50 mg trazodon HCl bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** DESYREL® 50 mg'da laktoz monohidrat (inek sütü), kalsiyum fosfat dibazik, mısır nişastası, gün batımı sarısı lak (E110), polivinil pirolidon, mikrokristalin selüloz, sodyum karboksimetil nişasta ve magnezyum stearat bulunur. Kaplama içeriğinde ise etil selüloz, hint yağı, balık nefsi ve talk bulunur.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DESYREL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DESYREL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DESYREL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DESYREL®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DESYREL® nedir ve ne için kullanılır?**

- DESYREL, etkin madde olarak trazodon hidroklorür içerir. Bu ilaç, "antidepresanlar" adı verilen ilaç grubuna aittir.
- DESYREL, anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil yetişkinlerde depresyon tedavisinde kullanılır.
- DESYREL, turuncu sarı renkli, bikonveks, bir yüzü çentikli film tablet olup, 30 tablet içeren blister ambalajda karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır. Tabletler iki eşit parçaya bölünebilir.

#### **2. DESYREL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **DESYREL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine bilinen aşırı duyarlılık.
- Çok alkol alıyorsanız
- Uyumanıza yardımcı olacak ilaçları (hipnotikler) yoğun bir şekilde kullanıyorsanız
- Yakınlarda kalp krizi geçirdiyseniz,



## **DESYREL®'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

DESYREL'i almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

- Siz veya bakıcınız, davranıřlarınızda veya depresyon durumunuzda bir deęiřlik veya kötüleřme fark ederseniz veya kendinizi öldürmeyi düşünürseniz. Böyle bir durumda derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.
- Sara hastasıysanız (epilepsi), özellikle dozajda ani artıř ve azalmalardan kaçınınız,
- Eđer karaciđer rahatsızlıđınız varsa (karaciđer yetmezliđi), özellikle de řiddetliyse,
- Eđer böbrek rahatsızlıđınız varsa (böbrek yetmezliđi), özellikle de řiddetliyse,
- Angina pectoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göđüs ağrısı), kalpte ileti veya ritim bozukluklarınız varsa veya yakın zamanda kalp krizi geçirdiyse,
- Hipertiroidizm (vücutta tiroid hormonunun geređinden fazla üretilmesi),
- Prostat büyümesi gibi idrar yapma bozuklukları,
- Akut dar açılı glokom gibi yükselmiř göz içi basıncı,
- Eđer řizofreni veya diđer zihinsel bozukluklarınız varsa bu durum DESYREL kullanımına bađlı olarak bu gibi rahatsızlıkları daha da kötüleřtirebilir. Örneđin; artan paranoid düşünceler (bir řeyin gerçek olduđuna veya olmadıđı halde dođru olduđuna inanmak). Bakınız; bölüm "4. Olası yan etkiler nelerdir?"
- Bođaz ağrınız ve ateřiniz varsa. Bu durumda, bunlar bir kan bozukluđunun (agranülositoz) belirtileri olabileceđinden, doktorunuz size kan testi yaptırmanızı önerebilir.
- Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya bayılıyorsanız (özellikle yataktan kalktıđınızda veya oturur pozisyondan ayađa kalktıđınızda), çünkü bu düşük kan basıncının bir iřareti olabilir.
- Erkekseviz ve uzun süreli ve ađrılı bir ereksiyon yařıyorsunuz. Bu durum meydana gelirse, tedaviyi derhal durdurun ve doktorunuza danıřın.

### *Eđer yařlıysanız*

Yařlıysanız, ayađa kalktıđınızda kan basıncında düşüř (ortostatik hipotansiyon) veya uyku hali gibi yan etkilere yakalanma olasılıđınız daha yüksek olabileceđinden bu ilacı dikkatli kullanınız. Siz veya bakıcınız bu yan etkileri fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Özellikle tedavinin bařlangıcında ve doz artıřları öncesinde ve doz artıřı sırasında sizi yakından takip edecektir. Herhangi bir hastalıđınız varsa veya bařka ilaçlar kullanıyorsanız ("**Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı**") bölümüne bakınız), yan etkilerin artmasını önlemek için gerekli önlemleri alacađından mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

### *İdrar testleri ile etkileřim*

DESYREL'i alırken, ilaç taraması için özel teknikler (immünoanalizler) kullanan bir idrar testinden geçerseniz, amfetaminler için yanlış bir pozitif sonuç alabilirsiniz. Bu olursa, doktorunuzla konuşun ve diđer teknikleri temel alan bir idrar testi isteyiniz.

## **ÇOCUKLAR VE ERGENLER**

18 YAŐINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA VEYA ERGENLERE DESYREL VERMEYİNİZ.

### **DESYREL®'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Trazodon alkolün yatıřtırıcı etkilerini řiddetlendirmektedir. Trazodon ile tedavi sırasında alkol kullanmayınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*



Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

İlaç anne sütüne az oranda geçmektedir. Emzirme sırasında ilacı, ancak doktorunuz risk-yarar oranını değerlendirdikten sonra kullanabilirsiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

DESYREL araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde küçük veya orta derecede bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, araç veya makine kullanmanız gerektiğinde dikkatli olunuz. Uyuşukluk, sedasyon, baş dönmesi, konfüzyon durumları veya bulanık görme gibi belirtiler olmadığından emin olana kadar araç ve makine kullanmayınız.

### **DESYREL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

-Laktöz: DESYREL®, laktöz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

-Hint yağı: Mide rahatsızlığına ve ishale neden olabilir.

-Sodyum: Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum içerir; yani esasında "sodyum içermez".Gün batımı sarısı (E110): alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer, özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

#### ***DESYREL'in olası yan etkilerini arttıracak ilaçlar***

- karaciğerin çalışma şeklini değiştiren ilaçlar;
  - eritromisin (bir antibiyotik)
  - ketokonazol, itrakonazol (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar)
  - ritonavir, indinavir (HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar)
  - nefazodon (depresyonun çeşitli formlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar).

DESYREL'i bu ilaçlarla birlikte kullanmaktan kaçının. Gerekirse doktorunuz DESYREL dozunu azaltacaktır;

- trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar). Bu ilaçları trazodon ile aynı anda almaktan kaçının.
- fluoksetin (anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç)
- nöroleptikler (şizofreni gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- klorpromazin, flufenazin, levomepromazin, perfenazin gibi fenotiyazin (şizofreni gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- QT aralığını uzatan ilaçlar, yani elektrokardiyogramda değişikliğe neden olan ilaçlar
- Hypericum perforatum (St. John's Wort, antidepresan olarak kullanılan bir bitki) içeren ilaçlar.

#### ***DESYREL'in etkisini azaltan ilaçlar***

- oral kontraseptifler (doğum kontrol hapı)
- fenitoin (sara hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç)



- karbamazepin (sara hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç). Doktorunuz DESYREL dozunun artırılması gerekip gerekmediğini belirlemek için sizi izleyecektir.
- barbitüratlar (yatıştırıcı, anestetik, epilepsi önleyici, hipnotik olarak kullanılan ilaçlar).

### ***DESYREL'in etkisini artıran ilaçlar***

- simetidin (mide ülserleri için kullanılan ilaç).

### ***DESYREL ile etkileşime giren diğer ilaçlar***

- antipsikotikler yatıştırıcı etkileri artabileceğinden, (bazı akıl hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar), hipnotikler (uyku ilaçları), sedatifler (sakinleştiriciler), anksiyolitikler (anksiyete ilaçları) ve antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar). Bu durumda doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltabilir. MAOI'ler, monoamin oksidaz inhibitörleri (anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar). MAOI'lerle birlikte veya MAOI tedavisinin kesilmesini takip eden iki hafta içinde trazodon almayınız. Aynı şekilde, trazodon tedavisinin kesilmesini takip eden hafta MAOI'leri kullanmayınız.
- anestezikler. Uçucu anesteziklerin kullanımını gerektiren bir ameliyat olmanız gerekiyorsa, anestezi uzmanınıza DESYREL kullandığınızı söyleyin. DESYREL anestezinin etkisini artırabilir.
- kas gevşeticiler (kas gevşemesine neden olan ilaçlar). Kas gevşetici kullanımını gerektiren bir ameliyat olmanız gerekiyorsa, anestezi uzmanınıza DESYREL kullandığınızı söyleyiniz. DESYREL bu ilaçların etkisini artırabilir.
- levodopa (Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç) çünkü trazodone levodopanin etkisini azaltabilir.
- klonidin (yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaç) çünkü trazodon klonidinin etkisini azaltabilir.
- antikoagülan ve/veya antiplatelet ajanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak için): Kanama riskiyle kan pıhtılaşmasında değişiklikler olabilir.
- antihipertansifler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), gerekirse doktor antihipertansif dozunu azaltabilir.
- digoksin (kalp problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaç).

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DESYREL® nasıl kullanılır?**

#### **• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Bu ilacın kullanımı erişkinlerle sınırlandırılmıştır. Tabletler, hastalığınızın şiddetine bağlı olarak kademeli doz artışına olanak sağlamak üzere çentiklidir.

**Erişkinlerde kullanımı:** Günlük başlangıç dozu, bölünmüş dozlar halinde yemeklerden sonra veya tek doz halinde akşam yatma vaktinden önce alınan 75-150 mg'dır.

Doz, tek doz veya bölünmüş dozlar halinde uygulanmak üzere günde 300 mg'a kadar artırılabilir. Bölünmüş dozun büyük kısmını yatma vakti alınız.

Hastaneye yatırılan hastalarda doz, bölünmüş dozlar halinde günde 600 mg'a kadar artırılabilir.

Doktorunuz DESYREL® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

#### **• Uygulama yolu ve metodu:**

Mümkünse tabletleri tok karına alınız. DESYREL'i yemeklerden sonra almak yan etki olasılığını azaltır. Yatmadan önce gece dozunu alınız. Tablet eşit parçalara bölünebilir. Bu



durum, dozları doktorunuz tarafından reçete edildiği gibi gün boyunca yaymanıza olanak tanımaktadır.

- **Değişik yaş grupları**

- **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda ve 18 yaşından küçük genç erişkinlerde kullanmayınız.

- **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlıysanız, doktorunuz dozu genel sağlığınıza ve ilaca toleransınıza göre ayarlayacaktır. Çok yaşlı ve zayıf hastalarda önerilen günlük başlangıç dozu, bölünmüş dozlar halinde veya tek doz halinde yatma vaktinde uygulanan 100 mg'dır. Bu doz, tolerans ve etkinliğe bağlı olarak, gözetim altında, "Erişkinlerde kullanımı" başlığı altında açıklandığı şekilde aşamalı olarak artırılabilir. Yaşlıysanız 100 mg üzerindeki tek dozlardan kaçınmalısınız. Dozların günde 300 mg'ın üzerine çıkılması olası değildir.

- **Özel kullanım durumları**

- **Böbrek yetmezliği:**

Eğer böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, özellikle de şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda, DESYREL® ile tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

- **Karaciğer yetmezliği:**

Eğer karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa, özellikle de ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu durumunda, DESYREL® ile tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.

*Eğer DESYREL®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

- **Kullanmanız gerekenden daha fazla DESYREL® kullandıysanız**

Aşırı bir DESYREL® dozunun kazara yutulması/alınması durumunda, derhal doktorunuzla temasa geçiniz ya da en yakındaki hastaneye gidiniz. Bu "Kullanma Talimatı"nı yanınıza alınız.

*DESYREL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Bu ilacı aşırı dozda alırsanız, aşağıdaki belirtiler görülebilir:

- Uyuşukluk
- Baş dönmesi
- Mide bulantısı
- Kusma

En şiddetli vakalarda, aşağıdakiler meydana gelebilir:

- Koma
- Taşikardi (dakikada artan kalp atış sayısı)
- Hipotansiyon (düşük kan basıncı)
- Hiponatremi (kanda genel bir halsizlik durumuna neden olan sodyum azalması)
- Konvülsiyonlar
- Şiddetli nefes alma zorluğu
- Bradikardi (düşük kalp hızı, yani dakikadaki kalp atış sayısı), aritmi (kalp ritmi sorunları) dahil olmak üzere kalp rahatsızlıkları. Bu semptomlar 24 saat veya daha uzun süre içinde ortaya çıkabilir.

Doktorunuz, belirtilerinizin şiddetine göre en uygun tedaviyi size verecektir.



Semptomlar doz aşımından sonra 24 saat veya daha uzun süre içinde ortaya çıkabilir.

### **DESYREL®'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **DESYREL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Özellikle uzun süreli tedavide DESYREL®'i aniden kesmeyiniz. Mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk semptomlarının başlamasını en aza indirmek için bu ilaçla tedavi kademeli olarak ve tıbbi gözetim altında kesilmelidir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DESYREL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Trazodon tedavisi sırasında veya tedavi kesildikten sonraki erken dönemde intihar düşüncesi ve intihar davranışları olguları bildirilmiştir.

### **Aşağıdakilerden biri olursa, DESYREL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- Sarılık (cildin sararması ve gözlerin beyazlaşması)
- Manik davranışlarla (takıntılı davranış ve/veya fikirler) karakterize edilen depresyonun kötüleşmesi
- Priapizm (anormal ve kalıcı ereksiyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- Kendinize zarar verme veya intihar düşünceleri veya davranışlarda başka herhangi bir değişiklik olursa. Bu etkiler hem tedavi sırasında hem de tedavinin kesilmesinden sonraki erken aşamalarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle doktorunuz sizi izleyecektir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Bilinmiyor:**

- Agranülositoz/lökopeni (azalmış beyaz kan hücresi sayısı)
- Eozinofili (artan beyaz kan hücresi sayısı)



- Trombositopeni (düşük kan trombosit sayısı)
- Anemi (hemogloblin proteinin normal seviyenin altına düşmesi, alyuvarların sayısının azalması, kansızlık)
- Alerjik reaksiyonlar
- Uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu (düşük kan sodyum seviyeleri ile karakterize edilen hastalık)
- Azaltılmış kan sodyum seviyeleri
- Kilo kaybı, ciddi kilo kaybıyla birlikte iştah kaybı, iştah artışı
- Kafa karışıklığı, uykusuzluk, oryantasyon bozukluğu, endişe, sinirlilik ve ajitasyon
- Deliryum, saldırganlık, halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görme), kabuslar
- Azalmış cinsel istek
- Yoksunluk sendromu (mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlarla yoksunluk semptomlarının başlangıcı)
- Serotonin sendromu (baş ağrısı, ajitasyon, zihinsel karışıklık, halüsinasyonlar ve koma gibi bir dizi etkiye neden olan “serotonin” adı verilen bir maddenin etkisinin aşırı artması ile karakterize edilen hastalık)
- Konvülsiyonlar
- Malign nöroleptik sendrom (şiddetli sinir sistemi hastalığı)
- Baş dönmesi, vertigo, baş ağrısı
- Uyuşukluk, huzursuzluk, azalmış uyanıklık
- Titreme (tremor)
- Bulanık görme
- Hafıza bozukluğu
- Kas seğirmesi (miyoklonus)
- Dil bozukluğu (ifade afazisi)
- Değişen hassasiyet (parestezi)
- Kasılma bozuklukları (distoni)
- Tat alma bozuklukları
- Kardiyak aritmiler (kalp ritmi sorunları), bradikardi (dakikada azalan kalp atış sayısı), taşikardi (dakikada artan kalp atış sayısı), elektrokardiyogram değişiklikleri
- Hipotansiyon (düşük kan basıncı), ortostatik hipotansiyon (ayakta dururken kan basıncında ciddi düşüş) dahil
- Senkop (bayılma)
- Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
- Burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), dispne (nefes almada güçlük)
- Mide bulantısı, kusma, ağız kuruluğu, kabızlık, ishal, sindirim sorunları, mide ağrısı, gastroenterit (mideyi ve bağırsağın ilk kısmını tutan iltihaplanma), tükürük salgısında artış, bağırsak düğümlenmesi (paralitik ileus)
- Değişmiş karaciğer fonksiyonu (karaciğer hasarı ve kolestaz dahil)
- Döküntü, kaşıntı, aşırı terleme (hiperhidroz)
- Bacaklarda ve kollarda ağrı, sırt ağrısı, kas ağrısı (miyalji), eklem ağrısı (artralji)
- İdrar kaçırma (idrar inkontinansı) veya idrar yapamama (idrar retansiyonu) gibi idrara çıkma bozuklukları.
- Halsizlik, ödem (sıvı birikmesi nedeniyle şişlik), grip benzeri semptomlar, yorgunluk, göğüs ağrısı, ateş
- Karaciğer enzimlerinde artış (karaciğerde bulunan ve arttığında karaciğer hasarının varlığını gösteren maddeler).



### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. DESYREL®’in saklanması**

*DESYREL®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra DESYREL®’i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat Sahibi:** Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş., Beşiktaş/İstanbul

**Üretim Yeri:** Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş., Dilovası/Kocaeli

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*

