

KULLANMA TALİMATI

DİSPARİ 3 g SAŞE

Ağızdan yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir saşe etkin madde olarak 3 g fosfomisine eşdeğer 5.631 mg fosfomisin trometamol
- **Yardımcı madde(ler):** Şeker, sakkarin, çilek aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **DİSPARİ nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DİSPARİ'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DİSPARİ nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DİSPARİ'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. DİSPARİ nedir ve ne için kullanılır?

DİSPARİ'nin etkin maddesi, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan fosfomisin trometamoldür. DİSPARİ, PE/Alüminyum/PE ambalajda 1 saşe karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

DİSPARİ idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi için tek doz olarak kullanılır.

2. DİSPARİ'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİSPARİ'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Fosfomisine ya da DİSPARİ'nin içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Nefrit, pyelonefrit gibi üst idrar sistem enfeksiyonunuz varsa.

DİSPARİ'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:

- İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelirse, ishal önleyici ilaçlar almayınız ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

DİSPARİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİSPARİ'yi aç karnına alınız (yemeklerden 2-3 saat sonra).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİSPARİ gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİSPARİ'yi emzirme sırasında kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

DİSPARİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİSPARİ'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DİSPARİ ile birlikte mide bağırsak kanal hareketliğini artıran ilaçlar kullanıldığında sindirim hızlanır, DİSPARİ'nin etkinliği düşer.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DİSPARİ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve dozu/uygulama sıklığı için talimatlar:

18 yaş ve üstü kadınlarda, idrar yolu enfeksiyonlarında günde 1 kez 1 saşe uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Bir bardağın içine saşe boşaltılır ve yarısına kadar su ile doldurulur. Sıcak su kullanılmaz. Karıştırılarak çözülür. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

DİSPARİ'yi kullandıktan sonra idrara en az 3 saat kadar çıkmayınız. Bu yüzden geceleri yatmadan idrara son kez çıkıldıktan sonra DİSPARİ'yi kullanınız.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

12 yaş ve altındaki çocuklarda fosfomisin'in etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışma bulunmadığından kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinler için belirtilmiş olan doz uygulanır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği:**

DİSPARİ böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer DİSPARİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİSPARİ kullandıysanız:

DİSPARİ'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fazladan doz alımı tedaviyi hızlandırmaz, yan etkileri artırır.

DİSPARİ'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİSPARİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

DİSPARİ tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİSPARİ'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DİSPARİ'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Alerjik belirtiler oluşması ve aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüze ait şişme, düşük tansiyon, nefes darlığı, deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok yaygın görülen yan etkiler

- Adet düzensizliği
- Vajina iltihabı
- Ateş
- İshal

Yaygın görülen yan etkiler

- Migren
- Enfeksiyon
- İşitme bozuklukları
- Kanlı idrar ve ağrılı idrar yapma

Seyrek görülen yan etkiler

- Astım
- Sarılık
- Karaciğer harabiyeti

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülen yan etkiler

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Burun akıntısı
- Mide bulantısı
- Karın ağrısı
- Hazımsızlık
- Yutak iltihabı
- Sırt ağrısı
- Ağrı
- Bitkinlik

Yaygın görülen yan etkiler

- Kusma
- Kabızlık
- Gaz
- Adet bozuklukları
- İştahın azalması ya da kaybolması
- Ağız kuruluğu
- Uyuklama
- Uykusuzluk
- Sinirlilik
- Dokunma, ağrı veya titreşim uyarılarının algılanmasında bozukluk
- Cilt bozuklukları
- Kaşıntı
- Döküntü
- Kas ağrısı

Bunlar DİSPARİ'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DİSPARİ'nin saklanması

DİSPARİ'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİSPARİ'yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİSPARİ'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Aymed İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ehlibeyt Mah. 5.Cad. No:36 Aykon Plaza Kat:2 Daire 14 Balgat /ANKARA

Üretim yeri: Merkez Laboratuvarı İlaç San ve Tic. A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Taşdelen -Çekmeköy- İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 02 / 08 /2011 tarihinde onaylanmıştır.