

## KULLANMA TALİMATI

### DYNABAC 250 mg enterik kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir enterik kaplı tablette 250 mg diritromisin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum karbonat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, metil hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, propilen glikol, metaakrilik asit kopolimeri, renk karışımı beyaz T3166-WE, trietil asetat

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında :**

1. ***DYNABAC nedir ve ne için kullanılır ?***
2. ***DYNABAC'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***DYNABAC nasıl kullanılır ?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir ?***
5. ***DYNABAC'ın saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DYNABAC nedir ve ne için kullanılır ?**

DYNABAC, 10 ve 14 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulan makrolid grubu bir antibiyotiktir.

DYNABAC etkin madde olarak diritromisin içerir.

Diritromisin, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

DYNABAC'ın mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı bakterilerin protein sentezini baskılamak yoluyla olduğu düşünülmektedir.

Diritromisin, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Haemophilus influenzae*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella catarrhalis*, *Mycoplasma pneumoniae* gibi mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlik gösterir.

DYNABAC yukarıda belirtilen bakteriler tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

- Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları
  - Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
  - Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
  - Toplumda edinilmiş pnömoniler
  - Yutak ve bademcik iltihap olgularında
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

## **2. DYNABAC'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **DYNABAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Diritromisin, eritromisin veya diğer makrolid antibiyotiklere karşı alerjisi olan kişilerde,
- Ergot alkaloidleriyle ve özellikle ergotamin ve dihidroergotaminle (migren tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) birlikte kullanımda,
- Sisaprid (mideden yemek borusuna mide içeriğinin kaçması (reflü) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımda.

### **DYNABAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Hamileliğinizin ilk 3 ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Psödomembranöz kolit adı verilen ve kanlı-mukuslu ishal ile kendini belli eden hastalık, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebilir. Bu nedenle uzun süredir antibiyotik kullanıyorsanız ve ishaliniz varsa, psödomembranöz kolit gelişme olasılığını unutmayınız. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle, ilacın bırakılması ile düzelerken, orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı akılda tutulmalıdır. Tedaviniz sırasında hastalığınız şiddetlenmesi gelişebilir.

DYNABAC kullanırken doğrudan uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın. Zira DYNABAC derinizin güneş ışığına karşı duyarlılığını arttırabilir. Gerekirse korunma tedbirlerini arttırınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **DYNABAC'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Günde 2-3 L su ve içecek tüketilmelidir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

DYNABAC'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

## **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur.

## **DYNABAC'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir..

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Ergot alkaloidleri (migren tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), sisaprid (mideden yemek borusuna mide içeriğinin kaçması (reflü) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve pimozid (şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanmayınız.

Bromokriptin (parkinson tedavisinde kullanılır), dofetilid (Kalp ritm bozukluğunda kullanılır), siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç), fentanil (merkezi etkili ağrı kesici), digoksin (kalp ritm bozuklukları ve kalp yetmezliğinde kullanılır) ile birlikte Dynabac'ın kullanılması önerilmez.

Ağızdan alınan pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar ile birlikte kullanımda dikkatli olunuz.

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. DYNABAC nasıl kullanılır?**

### **• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde 1 defa 500 mg (250 mg'lık 2 tablet) şeklinde kullanılır.

Çeşitli enfeksiyonlarda kullanım dozu, sıklığı ve kullanım süresi aşağıda tablo halinde verilmiştir.


<b>Enfeksiyon</b>	<b>Doz</b>	<b>Veriliş sıklığı</b>	<b>Veriliş süresi</b>
Kronik bronşitin akut alevlenmeleri	500mg	Günde 1 kez	5-7 gün
Akut bronşitte sekonder enfeksiyon	500mg	Günde 1 kez	7 gün
Toplumda edinilmiş pnömoni	500mg	Günde 1 kez	14 gün
Yutak ve bademcik iltihabı	500mg	Günde 1 kez	10 gün
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları	500mg	Günde 1 kez	5-7 gün

- **Uygulama yolu ve metodu:**


DYNABAC sadece ağızdan kullanım içindir.

DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak yutulmalıdır.

2 tablet aynı anda, 1 bardak su ile alınır.



***İki tablet aynı blister ambalaj içerisinde yer almaktadır.***



***Her defasında iki tableti birden yutunuz.***

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

12 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

Doz günde 1 kez alınan 2 tablet şeklindedir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalarda DYNABAC dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**

- **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Hafif-orta derecedeki böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer DYNABAC'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla DYNABAC kullandıysanız**

*DYNABAC'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DYNABAC'ı kullanmayı unutursanız**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

**DYNABAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DYNABAC'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerde biri olursa, DYNABAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen )

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DYNABAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kanlı-mukuslu ishal
- Deride geniş bir alana yayılan döküntüler
- Vajinada mantar enfeksiyonu
- Deri ve gözlerde sararma, bulantı, karın ağrısı, aşırı yorgunluk gibi karaciğer hasar belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Karın ağrısı
- İshal
- Bulantı-Kusma
- Hazımsızlık
- Gaz şikayetleri
- İştahsızlık
- Yorgunluk
- Deride hafif döküntü ve kaşıntı
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Uykusuzluk

Bunlar DYNABAC'ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. DYNABAC'ın saklanması**

*DYNABAC'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DYNABAC'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DYNABAC'ı kullanmayınız.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467  
Maslak/Sarıyer/İstanbul

#### ***Üretim yeri:***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sanayi Mah. Tunç Cad. No :3  
Esenyurt/İstanbul

*Bu kullanma talimatı 06.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.*