

## KULLANMA TALİMATI

**EYESTİL tek doz göz damlası**  
**Göze uygulanır.**

• **Etkin madde :**

Sodyum hiyalüronat  
100 ml’de, 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir.

• **Yardımcı maddeler :**

Disodyum fosfat dodekahidrat, monobazik sodyum fosfat, sodyum klorür, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

**Bu Kullanma Talimatında :**

1. **EYESTİL nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **EYESTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **EYESTİL nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir ?**
5. **EYESTİL’in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

**1. EYESTİL nedir ve ne için kullanılır ?**

• EYESTİL, her birinde 0.3 ml’lik göz damlası içeren, 20 adet düşük yoğunluklu polietilen tek dozluk kaplarda, 5’er adet halinde polyester/polietilen çift katlı poşetler içinde karton kutuda kullanıma hazır göz damlasıdır.

EYESTİL, kuru göz hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılır.

**2. EYESTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**EYESTİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer :

- İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa EYESTİL’i kullanmayınız.

## **EYESTİL'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren dięer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **EYESTİL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .*

Hamilelik sürecinde EYESTİL'i , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

EYESTİL'in emzirme dönemindeki etkisi bilinmemektedir.

### **Ara ve makine kullanımı**

EYESTİL'in ara ve makine kullanımını engelleyecek hiçbir etkisi yoktur.

### **EYESTİL'in ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

EYESTİL'in, ieriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere baęlı olumsuz bir etki beklenmez.İerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbirini için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

### **Dięer ilaçlarla birlikte kullanımı**

Sodyum hiyalüronat, kuaterner amonyum tuzları mevcudiyetinde çökebilir. Bu bileşikleri ieren çözeltilerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

*Eęer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. EYESTİL nasıl kullanılır ?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :**

EYESTİL'i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıtı baęlı olarak EYESTİL ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin EYESTİL'den tam yarar görmeyizi saęlar.

#### **Uygulama yolu ve metodu :**

- Yalnız oftalmik kullanım iindir.
- Göze uygulanır.
- İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

- Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz.
- Tek dozlu kabı bandından çekerek çıkarın, üst kısmı çekmeden çevirerek açınız.
- Tek dozluk kabı açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrasında arta kalan çözeltiyi atınız.
- İlacı uygularken göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.

### **Değişik yaş grupları :**

#### **Çocuklarda kullanımı :**

Pediyatrik yaş grubunda, EYESTIL gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanımı :**

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

#### **Özel kullanım durumları :**

##### **Böbrek / Karaciğer yetmezliği :**

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

*Eğer EYESTIL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla EYESTIL kullandıysanız**

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

*EYESTIL'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **EYESTIL'i kullanmayı unutursanız**

Eğer EYESTIL'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

##### **EYESTIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuz reçete ettiği sürece EYESTIL kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir ?**

Tüm ilaçlar gibi, EYESTIL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

##### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :**

- Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu
- Kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeysel alerjik reaksiyonlar, keratit
- Kaşıntı, yanma

Bunlar EYESTIL'in hafif yan etkileridir. Hafif yan etkiler seyrek görülür.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. EYESTIL'in Saklanması**

*EYESTIL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EYESTIL'i kullanmayınız.*

Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EYESTIL'i kullanmayınız.

### ***Ruhsat sahibi :***

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş  
Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300  
Mecidiyeköy-İSTANBUL  
Tel: 0212- 274 51 24  
Fax : 0212- 272 15 68

### ***Üretim yeri :***

SIFI S.P.A.  
'36,Via Ercole Patti 95020  
Lavinaio- Aci S.Antonio  
Katanya-İTALYA  
Tel: 0039 095 792 21 11

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*