

## KULLANMA TALİMATI

### FUCİTEC %1 viskoz göz damlası Göze uygulanır.

#### *Etkin madde:*

Her bir gram viskoz göz damlası etkin madde olarak 10 mg fusidik asit içerir.

#### *Yardımcı maddeler:*

Benzalkonyum klorür, polisorbat 80, disodyum EDTA, mannitol (E 421), karbomer 974 P, sodyum hidroksit ve saf su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu kullanma talimatında:**

1. *FUCİTEC nedir ve ne için kullanılır?*
2. *FUCİTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *FUCİTEC nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *FUCİTEC' in saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. FUCİTEC nedir ve ne için kullanılır?**

FUCİTEC, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır.

FUCİTEC, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

5 g'lık HDPE burgulu kapaklı, laklı alüminyum tüplerde sunulur.

#### **2. FUCİTEC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **FUCİTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.

- Gözde lens takılı olduđu zaman kullanılmamalıdır.

### **FUCİTEC’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Açıldıktan sonra **28 (yirmi sekiz)** gün içinde kullanılmalıdır.
- FUCİTEC çok sık kullanıldıđı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **FUCİTEC’in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

FUCİTEC, göze uygulandıđından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından deđerlendirilmek kořulu ile uygulanmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından deđerlendirilmek kořulu ile uygulanmalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

FUCİTEC uygulamasının hemen ardından görüř bulanıklıđına neden olabilir. Ara veya makine kullanımından önce görüřünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.

Ara ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiřtir.

### **FUCİTEC’in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İeriđinde bulunan benzalkonyum klorür (koruyucu), gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuřak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi ıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuřak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduđu bilinmektedir.

Bu tıbbi ürün her mg’da 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Herhangi bir geimsizlik bildirilmemiřtir.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. FUCİTEC nasıl kullanılır?

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUCİTEC, her bir göze günde iki defa 1'er damla damlatılır.

Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

#### Uygulama yolu ve metodu:

Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.



1. Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
2. Alt göz kapaklarınızı küçük bir cep oluşturacak şekilde yavaşça çekin
3. Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulaması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Mikroplarla buluşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçınınız. Kullanım sonrasında kapağı kapatınız.

*Eğer FUCİTEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİTEC kullandıysanız**

*FUCİTEC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **FUCİTEC'i kullanmayı unutursanız**

İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katına çıkarmayınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **FUCİTEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUCİTEC'de tüm kullanıcılarda olmasa bile yan etkilere yol açabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİTEC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTEC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.  
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Yaygın:**

- Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kızgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması.
- Tedavi olan gözde bulanık görme.

**Yaygın olmayan:**

- Uygulama esnasında gözlerde sulanma

**Bilinmiyor:**

- Kaşıntı
- Döküntü
- Göz infeksiyonunda kötüleşme

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. FUCİTEC'in saklanması**

*FUCİTEC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİTEC'i kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUCİTEC'i kullanmayınız.

***Ruhsat sahibi:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah.  
Zincirlikuyu Cad. No:184  
34440 Beyoğlu-İSTANBUL  
Tel: +90 (212) 365 15 00  
Faks: +90 (212) 276 29 19

***Üretim yeri:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
GOSB 1900 Sokak No: 1904  
41480 Gebze-KOCAELİ

*Bu kullanma talimatı 26.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.*