

## KULLANMA TALİMATI

### FUMAST şurup

#### Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir ölçek (5 ml) şurup 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Şeker, etil alkol, metil para hidroksi benzoat, propil para hidroksi benzoat, sorbitol(%70), sitrik asit, Di-sodyum hidrojen fosfat dihidrat , ahududu esansı, deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu*
- *ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında*
- *yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### Bu Kullanma Talimatında:

1. **FUMAST nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FUMAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FUMAST nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FUMAST'ın saklanması**

#### Başlıkları yer almaktadır.

##### 1. FUMAST nedir ve ne için kullanılır?

- Her bir ölçek (5 ml) şurup, 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.
- FUMAST, vidali emniyet halkalı HDPE kapaklı, 125 ml'lik bal renkli cam şişede takdim edilmektedir.
- FUMAST, Alerjik rinit [alerjik nezle] ve konjonktivit [göz iltihabı] gibi alerjik durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

## **2. FUMAST'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen talimata dikkatle uyunuz.

### **FUMAST'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- ketotifene ya da FUMAST'ın içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
- epilepsiniz (sara/bayılma nöbeti) varsa ya da daha önce nöbet yaşadıysanız kullanmayınız.

Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

### **FUMAST'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Diyabetikseniz (şeker hastalığınız varsa),

FUMAST'ı kullanmadan önce ya da FUMAST'ı kullanmayı bırakmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (bkz. Bölüm 3 FUMAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **FUMAST'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

FUMAST, yemekler ile birlikte alınmalıdır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

FUMAST'ın hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili çok az deneyim bulunmaktadır.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size FUMAST'ın hamilelik sırasında kullanımına ilişkin olası risklerini anlatacaktır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

FUMAST kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

## **Araç ve makine kullanımı**

FUMAST tedavisinin ilk birkaç gününde tepkileriniz zayıflayabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

## **FUMAST'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

FUMAST şurup, az miktarda –her 5 ml dozda 100 mg dan daha az- etanol (alkol) içerir.

FUMAST şurup, sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

FUMAST şurup sukroz içerir. Dişlere zararlı olabilir.

FUMAST şurup, Propil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzun ya da eczacınızın bunu bilmesi özellikle önemlidir:

- Diyabetin (şeker hastalığı) tedavisi için ağızdan alınarak kullanılan bazı ilaçlar (örneğin, metformin),
- Başka astım ilaçları,
- Uyku ilaçları ya da uyku haline neden olan ilaçlar,
- Güçlü ağrı kesiciler,
- Alkol,
- Alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (antihistaminikler).

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. FUMAST nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuzun verdiği talimata dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yanıtı göre daha yüksek ya da düşük bir doz önerebilir.

**Yetiřkinlerde:**

FUMAST'ın tablet formu kullanılır.

**6 ay ve 3 yař arası çocuklarda:**

Günde iki kez (sabah ve akřam) kilogram vücut ağırlığı başına 0.25 ml FUMAST řurup (0.05mg). [ Örnek: 10 kg ağırlığındaki bir bebeęe sabah ve akřam 2.5 mL (½ tatlı kařığı) řurup verilebilir.]

**3 yař ve 17 yař arası çocuklarda:**

Günde iki kez (kahvaltı ve akřam yemeęiyle birlikte) 5 ml (1 tatlı kařığı) FUMAST řurup kullanır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

FUMAST, sadece ağızdan kullanım içindir.

**Deęişik yař grupları:****Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı (6 ay – 17 yař arası):**

FUMAST řurup, 6 aylık ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir. En iyi sonuçları almak için çocuklar yetiřkinler ile benzer doza gereksinim duyabilirler. Doktorunuz, çocuęunuz için doęru dozu belirleyecektir.

**Yařlılarda kullanımı (65 yař ve üzeri):**

Yařlı hastalarla ilgili özel önlemlere gereksinim yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz hastalığınızla baęlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

*Eęer FUMAST'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla FUMAST kullandıysanız:**

*FUMAST'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

Eęer yanlıřlıkla çok fazla FUMAST almıř iseniz **derhal doktorunuz ile konuřunuz**. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

## **FUMAST'ı kullanmayı unutursanız:**

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise (4 saatten kısa bir süre kaldıysa), unuttuğunuz dozu atlayınız. Bu durumda, bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **FUMAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

FUMAST tedavisini kesmeniz gerekiyorsa, doktorunuzla konuşunuz. Tedavi 2-4 haftalık bir dönem boyunca kademeli bir şekilde azaltılarak kesilmelidir. Astım belirtileri tekrarlayabilir.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, FUMAST'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

FUMAST'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

**Çok seyrek görülen bazı etkiler ciddi olabilir:** (10.000 hastada 1'den az)

- Ateş, nezle, ürperme, baş ağrısı, öksürük ve vücut ağrılarıyla birlikte deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar,
- Deride ve gözlerde sararma, dışkı renginin açılması, idrar renginin koyulaşması (sarılık, karaciğer hastalığı, karaciğer iltihabı belirtileri).

Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, derhal doktorunuza söyleyiniz.

**Yaygın** (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

- Huzursuzluk,
- Uyarılara aşırı tepki,
- Uykusuzluk,
- Sinirlilik.

**Yaygın olmayan** (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

- Baş dönmesi
- İdrar yaparken yanma hissi ve sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı (sistit-mesane iltihabı)
- Ağız kuruluğu

**Seyrek** (1.000 hastanın birinden az görülebilir.):

- Uykü hali
- Kilo artışı

**Ayrıca ařađıda belirtilen yan etkiler de bildirilmiřtir (Etkilenen hastaların sayısı mevcut verilerden hesaplanamamaktadır):**

- Havale (nbet, konvlsiyon)
- Bař ađrısı
- Uykü hali
- Kusma
- Mide bulantısı
- Kařıntılı dknt de dahil olmak zere dknt
- İshal

Bu etkilerin herhangi biri sizde řiddetli olarak grlrse, doktorunuza bildiriniz.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .*

## **5. FUMAST'ın saklanması**

*FUMAST'ı ocukların gremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

FUMAST, 25° C'nin altındaki oda sıcaklıđında saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*řiře veya ambalajın zerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FUMAST'ı kullanmayınız.*

Eđer rnde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUMAST'ı kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** Rasyonel İla San. ve Tic. A.ř.  
Kavacık Mah. zgr Cad. Farma Plaza No: 20 Kat: 3  
Kavacık - Beykoz / İSTANBUL

**retim yeri:** Atabay İla Fabrikası A.ř.,  
34718 Acıbadem Kftnc Sokak No: 1, Kadıky İstanbul

*Bu kullanma talimatı (gn, ay, yıl) tarihinde onaylanmıřtır.*