

## KULLANMA TALİMATI

### GYNO-LOMEXIN® %2 Vajinal Krem

Vajinaya sürülerek uygulanır.

**Etkin madde:** 1 g vajinal krem 20 mg fentikonazol nitrat içerir.

**Yardımcı maddeler:** Propilen glikol (E1520), lanolin, badem yağı, yağ asitlerinin poliglikolik esteri, setil alkol, gliseril monostearat, sodyum edetat, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **GYNO-LOMEXIN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **GYNO-LOMEXIN® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **GYNO-LOMEXIN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **GYNO-LOMEXIN®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. GYNO-LOMEXIN® nedir ve ne için kullanılır?

GYNO-LOMEXIN®, antifungal bir ajan olan fentikonazol nitrat aktif maddesini içerir.

GYNO-LOMEXIN® belirli cins mantarların büyümesini engeller. Genital candidiasis (Genital pamukçuk) ve gram pozitif bakterilerin oluşturduğu vulvovajinit (dış genital organ ve vajinanın iltihabı) ve servisit (rahimin boyun kısmındaki bölgenin iltihabı) tedavisinde etkilidir.

## 2. GYNO-LOMEXIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### GYNO-LOMEXIN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

- Fentikonazol nitrat ya da imidazoller (örn. klotrimazol) olarak bilinen diğer benzer ilaçlara ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

GYNO-LOMEXIN® kullanmayınız.

### GYNO-LOMEXIN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

- Kontrasepsiyon için kondom ya da diyafram gibi bir bariyer yöntemi kullandığınız sırada,

GYNO-LOMEXIN®'i kullanmayınız.

- GYNO-LOMEXIN®'i uyguladığınızda, hafif bir yanma hissedebilirsiniz ancak bu genellikle kısa sürede yok olur.
- GYNO-LOMEXIN®'i uzun süre kullanırsanız, ona karşı alerjik olabilirsiniz, bu durumda GYNO-LOMEXIN®'i kullanmayı kesiniz.
- Gebe iseniz doktorunuza danışmadan GYNO-LOMEXIN®'i kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### GYNO-LOMEXIN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GYNO-LOMEXIN®'in, uygulama yolu itibarıyla, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelik döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilaç kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilacı kullanmamanız önerilir. Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

## **Araç ve makine kullanımı**

GYNO-LOMEXIN®'in araç ve makine kullanımı üzerinde bildirilen bir etkisi yoktur.

## **GYNO-LOMEXIN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu üründeki yardımcı maddelerden

- Propilen glikol (E1520) ciltte tahrişe
- Lanolin ve setil alkol bölgesel cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Kremin diğer ilaçlarla etkileşimi muhtemel değildir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. GYNO-LOMEXIN® nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

GYNO-LOMEXIN®, gece yatmadan önce (gerekiyorsa sabahları da olmak üzere) vajinaya 3 gün süreyle uygulanır. Semptomlarınız hızlıca kaybolabilir, ancak kremi 3 gün boyunca kullanmaya devam ediniz.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Enfeksiyonun tekrarlanmasını önlenmesi amacı ile GYNO-LOMEXIN® Krem'in penise (prepisium ve glans penis) lokal olarak uygulanarak, partnerin de aynı zamanda tedavi görmesi önerilir.

Bu işlemden sonra her zaman ellerinizi sabun ve sıcak suyla yıkayınız. GYNO-LOMEXIN® yağlı değildir, leke yapmaz ve suyla kolayca temizlenir.

Eğer iyileşme gözlenmez ya da durum daha kötüleşirse, doktorunuza danışınız.

Eğer ürünün kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

GYNO-LOMEXIN®'in çocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Özel kullanımı yoktur.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer GYNO-LOMEXIN®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla GYNO-LOMEXIN® kullandıysanız:**

Eğer siz ya da bir başkası yanlışlıkla bir miktar GYNO-LOMEXIN® yutarsanız hemen bir doktora başvurunuz.

*GYNO-LOMEXIN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**GYNO-LOMEXIN® kullanmayı unutursanız:**

Eğer ilacınızı kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz uygulayınız ve sonra dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

**GYNO-LOMEXIN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, GYNO-LOMEXIN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Uygulama bölgesinde hafif ve geçici kızarıklık ya da genellikle hızlıca kaybolan yanma hissi görülebilir.

Uzun süre GYNO-LOMEXIN® kullanırsanız, buna karşı alerji geliştirebilirsiniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. GYNO-LOMEXIN®'in saklanması**

*GYNO-LOMEXIN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra GYNO-LOMEXIN®'i kullanmayınız.*

*İlaçlar atık su ya da evdeki atıklar yoluyla imha edilmemelidir. Artık ihtiyaç duymadığınız ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GYNO-LOMEXIN®'i kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat Sahibi:***

*Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.  
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL*

#### ***Üretici:***

*Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA  
Via Matteo Civitali  
1-20148 Milano  
İtalya*

*Bu kullanma talimatı . . . tarihinde onaylanmıştır.*