

## KULLANMA TALİMATI

### LACRYVISC® Steril Oftalmik Jel, 10 g

#### Göze uygulanır.

- *Etkin madde:* 10 g'da 30 mg Karbomer
- *Yardımcı maddeler:* Mannitol, tiyomersal, sodyum hidroksit, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?*
2. *LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *LACRYVISC nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *LACRYVISC'in saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?**

LACRYVISC, göz kuruluğu vakalarında göz yüzeyinin eksik veya bozuk yapıda ıslatılmasından kaynaklanan durumlarda gözyaşının yerine geçer.

LACRYVISC, suni gözyaşları olarak adlandırılan bir grup ilaçtan biridir.

LACRYVISC, 10 g'lık lamine bir tüpte sunulan, hafif şeffaf viskoz bir jeldir.

#### **2. LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
- Kontakt lens gözünüzde iken

## **LACRYVISC'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Ürünün ieriđinde bulunan tiyomersal isimli madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- Bařka ilalar da kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız

### **LACRYVISC'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

LACRYVISC gze srlerek kullanılır. Ürn bařka bir yolla kullanmayınız. Ürn önerildiđi řekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve ieceklerle bir iliřkisi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadannce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadannce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makine kullanımı**

LACRYVISC kullandıktan hemen sonra jel gznzn yzeyinde tamamen yayılana kadar grřnzde bulanıklařma oluřabilir. Bu bulanıklık geinceye kadar ara ya da makine kullanmayınız.

### **LACRYVISC'in ieriđinde bulunan bir yardımcı madde hakkındanemli bilgi**

LACRYVISC'in ieriđindeki bir madde (tiyomersal) alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Eđer ilave gz ilacı kullanacaksanız, uygulamalar arasında 10 ila 15 dakikalık bir ara olmalıdır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. LACRYVISC nasıl kullanılır?**



### **▪ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

LACRYVISC'i her zaman yalnızca doktorunuzun sylediđi gibi kullanınız. Emin deđilseniz doktorunuza ve eczacınıza danıřınız.

Genellikle gnde drt kez veya doktorunnerdiđi kadar bir miktar jel, hasta gz(ler)e uygulanır.

LACRYVISC'i yalnızca gzlerinize kullanınız.

▪ **Uygulama yolu ve metodu:**



1. LACRYVISC tüpünü ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Tüpün kapağını açınız.
4. Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.
5. Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir “kese” oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Pomad buraya sürülecektir.
6. Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.
7. Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Pomada mikrop bulaşabilir.
8. Pomad şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız.
9. LACRYVISC’i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve pomadın gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu LACRYVISC’in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.
10. Eğer pomadı iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Eğer jeli gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

▪ **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

▪ **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer LACRYVISC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla LACRYVISC kullandıysanız:**

LACRYVISC, ihtiyaç oldukça sıkça kullanılabilir, bu nedenle gözlere uygulandığı sürece doz aşımı mümkün değildir. Tüm tüpün yutulması durumunda bile herhangi bir istenmeyen etki görülmecektir.

*LACRYVISC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**LACRYVISC'i kullanmayı unutursanız:**

LACRYVISC ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Kullanabildiğiniz kadar kullanınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, LACRYVISC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan LACRYVISC kullanımını kesmeyiniz.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Alerjik reaksiyonlar

Bunlar LACRYVISC'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. LACRYVISC'in saklanması**

*LACRYVISC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.** Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACRYVISC'i kullanmayınız. Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.

Açıldığı tarih:

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

**Tüp ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.**

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

**Ruhsat Sahibi:** Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805

Beykoz / İSTANBUL

**Üretici:** s.a. ALCON Couvreur n.v.

Rijksweg 14 2870 Puurs, Belçika

*Bu kullanma talimatı 22.02.2011 tarihinde onaylanmıştır.*

