

KULLANMA TALİMATI

LACTOSOFT 2.5 mg yumuşak kapsül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Sodyum pikosülfat.
Her bir LACTOSOFT 2.5 mg yumuşak kapsül, 2.5 miligram sodyum pikosülfat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Propilen glikol, polietilen glikol 400, jelatin (sığır kaynaklı), gliserol, sorbitol/sorbitan anidrisorb 85/70/00.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LACTOSOFT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LACTOSOFT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LACTOSOFT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LACTOSOFT 'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LACTOSOFT nedir ve ne için kullanılır?

- LACTOSOFT, berrak, renksiz çözelti içeren açık sarı renkli, şeffaf yuvarlak yumuşak kapsüllerdir.

- LACTOSOFT 2.5 mg yumuřak kapsüller çocuk emniyet kilitli beyaz plastik kapaklı, 16 ml, řeffaf, renksiz plastik řiře iine ambalajlanır. Her karton kutu kullanma talimatı ile birlikte 50 adet yumuřak kapsül ierir.
- LACTOSOFT'un etkin maddesi olan sodyum pikosulfat, triarilmetan adındaki bir ila grubuna aittir.

Sodyum pikosulfat lokal etkili, yumuřatıcı özellik tařıyan bir maddedir; etkisini sadece baėırsaklarda gosterir. Belirgin bir emilimi yoktur. Baėırsak hareketlerini artırır, baėırsak iinde su ve elektrolit toplanmasını artırır. Sonuta dıřkı yumuřar, baėırsaklardan geiř zamanı kısalır ve dıřkılama uyarısı gerekleřir.

- LACTOSOFT kabızlıėın kısa sureli tedavisinde ve herhangi bir nedene baėlı kabızlıėın giderilmesinde kullanılmak iindir.
- Diėer laksatiflerde olduėu gibi, gnlk olarak veya uzun sure kabızlıėın sebebini bulmak iin tam bir tanısals deėerlendirme yapılmaksızın LACTOSOFT kullanılmamalıdır.
- LACTOSOFT kilo vermeye yardımcı olmaz.

2. LACTOSOFT'u kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

LACTOSOFT'u ařaėıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eėer;

- Sodyum pikosulfata, triarilmetan grubu ile iliřkili etkin maddelere veya LACTOSOFT iindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karřı alerjik (ařırı duyarlı) iseniz;
- Baėırsak dėmlenmesi (ileus) varsa;
- Baėırsaklarda tıkanıklık varsa;
- Bulantı ve kusmanın eřlik ettiėi, ateřli veya ateřsiz řiddetli, aniden oluřan karın aėrısı (rneėin apandisit) varsa;
- Aniden geliřen iltihabi mide-baėırsak hastalıėınız varsa;
- Vucudunuzda ařırı su kaybetme durumu varsa;
- Hasta 4 yařından kk bir ocuk ise.

Kabızlık karın aėrısı, kusma ve ateř gibi diėer belirtilerle birlikte ciddi bir hastalıėın iřareti (baėırsak tıkanması ya da aniden geliřen karın iltihabı gibi) olabilir. řayet bu belirtilerden herhangi birisi varsa, LACTOSOFT ya da bařka ilalar almamalı ve acilen tıbbi destek almalısınız.

Su ve mineral dengenizi bozan bir durumunuz varsa (rneėin, aėır bbrek iřlev yetmezliėiniz varsa) LACTOSOFT'u sadece tıbbi gzetim altında kullanmalısınız.

LACTOSOFT'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

LACTOSOFT S kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Belirteleriniz kendiliđinden artıyorsa, bir süredir inatçıysa ve/veya bunlara dıřkıda kan veya ateř belirtileri eşlik ediyorsa, doktorunuza danıřmalısınız ve LACTOSOFT ile tedaviye bařlamadan önce muayene olmalısınız. Çünkü bađırsak hareketlerinizdeki herhangi bir rahatsızlık ya da deđişiklikler ciddi bir hastalıđın belirtisi olabilir.

LACTOSOFT tıbbi muayeneden önce günlük olarak sürekli veya uzun süre alınmamalıdır.

LACTOSOFT'un kesilmesi belirtilerin geri dönmesine neden olabilir. Eđer LACTOSOFT kronik (uzun süreli) kabızlık için uzun süre kullanılırsa belirtiler kabızlıđın kötüleşmesi ile iliřkili olabilir.

Uzun süreli ya da aşırı kullanım, sıvı ve elektrolit dengesizliđine ve kanda potasyum eksikliđine yol açabilir.

LACTOSOFT alan hastalarda bař dönmesi ve/veya bayılma bildirilmiştir. Bu olgulara iliřkin bilgiler, bayılma olaylarının dıřkılama işleme, ıkınma veya karın ağrısına karřı oluřan dolařım tepkilerine bađlı olabileceđini düşündürmektedir (dıřkılama sırasındaki ıkınmaya bađlı veya kabızlıđın yol açtıđı ağrıya bađlı bayılma, diđer bir adıyla dıřkılama baygınlıđı).

Çocuklar

LACTOSOFT, 4 yařın altındaki çocuklara verilmemelidir. LACTOSOFT, 4 yařından 10 yařına kadar (10 yařındakiler dahil) çocuklarda sadece doktor kontrolü ile kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

LACTOSOFT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması:

LACTOSOFT yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Eđer hamileyseniz veya emziriyorsanız ya da hamile olabileceđinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız. Hamile kadınlarda yeterli klinik alıřma yoktur. LACTOSOFT mümkünse gebelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LACTOSOFT 'un anne sütüne geçmediği gösterilmiştir. LACTOSOFT'un emzirme döneminde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Normalde, önerilen dozlarda LACTOSOFT'un araç ve makine kullanma becerileri üzerine olumsuz etkilerinin olması beklenmez.

Ancak, eğer sizde baş dönmesi ya da bilinç kaybı (bayılma) ya da karında kramplar gibi durumlar ortaya çıkarsa, araba kullanma ve makine işletme yeteneği azalabilir.

LACTOSOFT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LACTOSOFT sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Antibiyotikler (bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, LACTOSOFT'un dışkı yumuşatıcı etkisi azalabilir.

LACTOSOFT'un aşırı dozlarda alınması kanda potasyum ve diğer tuzların dengelerinin bozulması ile sonuçlanabilir. Böyle bir dengesizlik riski aynı anda alınan idrar söktürücü ilaçlar (furosemid gibi) veya kortikosteroidler olarak adlandırılan ilaçlar (prednisolon gibi) ile artabilir. Bu durum kalp fonksiyonu bozukluklarına ve kas zayıflığına neden olabilir ve kardiyak glikozitlerine (kalp işlevini iyileştirmek için kullanılan bir ilaç sınıfı) karşı hassasiyeti artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LACTOSOFT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LACTOSOFT'u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Doktor tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, aşağıdaki dozlar önerilir:

Yetişkinler:

Normal tek doz: 2 - 4 kapsül

(5 - 10 mg sodyum pikosülfata eşdeğer)

Günlük en yüksek doz: 4 kapsüldür.

Çocuklar:

4 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

4 yaş ve üzerindeki çocuklar: 1 - 2 kapsül (2,5 - 5 mg sodyum pikosülfata eşdeğer).

4 yaşından 10 yaşına kadar (10 yaşındakiler dahil) çocuklarda sadece bir doktor tarafından reçetelenmesi halinde kullanılmalıdır.

Günlük en yüksek doz: 2 kapsüldür.

En düşük doz ile başlanması önerilir. Dışkının düzenli olarak çıkmasını sağlayabilmek için önerilen en yüksek doza kademeli olarak ayarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

LACTOSOFT yeterli miktarda sıvı ile akşamları alınmalıdır. Normalde LACTOSOFT aldıktan yaklaşık 10-12 saat sonra bağırsak hareketi görülür. Kapsüllerin etkisini göstermesi için yeterli zaman veriniz, bağırsak hareketi başlatmak için kendinizi zorlamayınız.

LACTOSOFT gün boyunca devamlı olarak veya uzun dönem doktor gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.

Değişik yaş gurupları:

Çocuklarda kullanımı: Dört yaşından küçük olan çocuklarda kullanılmaz. 4 yaşından 10 yaşına kadar (10 yaşındakiler dahil) çocuklarda sadece doktor tavsiyesi ile kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı: LACTOSOFT yaşlılarda kullanımına ilişkin ek veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

LACTOSOFT'un böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde özel kullanım durumu yoktur.

Eğer LACTOSOFT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACTOSOFT kullandıysanız:

LACTOSOFT yüksek dozlarda alındığında ishal ve karınla ilgili belirtiler oluşabilir. Tedavi belirtilere bağlıdır. İlacın yutulmasından sonra kısa zamanda kusturarak ya da mide yıkaması ile ilacın etkileri azaltılabilir. Ciddi su ve mineral kaybı doktor tarafından düzeltilmez. Spazm (ani şiddetli ağrı, kramp) giderici ilaçların uygulanması yardımcı olabilir.

Kabızlık tedavisi için önerilenden çok yüksek dozlarda sodyum pikosülfat (LACTOSOFT) alınması ile ilişkilendirilmiş kalın bağırsakta iç zarlarda kan akımında azalma veya kesilme olan vakalar bildirilmiştir.

Not:

Diğer yumuşatıcı ilaçlarla olduğu gibi LACTOSOFT da, sürekli olarak aşırı dozlarda alındığında süreğen (kronik) ishal, karın ağrısı, kan potasyum düzeylerinde azalma, aldosteron üretiminde artış ve böbrek taşlarına yol açabilir. Yumuşatıcı ilaçların uzun süreli kötüye kullanımıyla (suistimaliyle) ilişkili olarak böbreklerde harabiyet, kanda bazik maddelerin artışı ve potasyum azlığına bağlı kas zayıflığı da bildirilmiştir.

LACTOSOFT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LACTOSOFT kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, o günü atlayınız ve bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

LACTOSOFT ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

Gerek görüldüğünde tedaviye ara verilebilir veya sonlandırılabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LACTOSOFT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler ilacı kullanan herkeste görülmeyebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LACTOSOFT kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri reaksiyonları (döküntü, kaşıntı)
- Bayılma

- Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjionörotik ödem) ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin LACTOSOFT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

İstenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıralanmıştır:

- Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'ini etkileyebilir.
- Yaygın : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazlasını etkileyebilir.
- Yaygın olmayan : 10 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazlasını etkileyebilir.
- Seyrek : 10 hastanın 1'inden az, fakat 10000 hastanın 1'inden fazlasını etkileyebilir.
- Çok seyrek : 10000 hastanın 1'inden azını etkileyebilir.
- Bilinmiyor : sıklık eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

- İshal

Yaygın:

- Karın rahatsızlığı, karın ağrısı, karın krampları

Yaygın olmayan:

- Bulantı, kusma, baş dönmesi**

Bilinmiyor:

- Aşırı duyarlılık (alerji tepkileri)*, bilinç kaybı (bayılma)**, deri ve/veya mukoz membranlarda, örneğin yüz ve boğazda şişme gibi cilt reaksiyonları (anjioödem), nefes darlığı, ilaca bağlı döküntü (ilacın tetiklediği isilik, deri döküntüsü), kızarıklık ve ciltte kaşıntı
- *Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjionörotik ödem) ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık).

****Bu olaylar karın ağrılarına veya dışkılamaya karşı kan dolaşımının verdiği tepkilerle oluşabilir.**

(Bkz. Bölüm 2- LACTOSOFT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ).

LACTOSOFT'un uzun süreli ve aşırı kullanımı su, potasyum ve diğer elektrolitlerin kaybına sebep olabilir. Bunu kalp işlevinde bozukluklar ve kas zayıflığı izleyebilir. Bu bilhassa idrar söktürücüler veya kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığında olabilir.

Herhangi bir yan etki yaşarsanız LACTOSOFT'un kullanımını durdurmalı ve tıbbi yardım almalısınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LACTOSOFT'un saklanması

LACTOSOFT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Şişeyi kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACTOSOFT'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LACTOSOFT'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri:

World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı 29.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.