

## KULLANMA TALİMATI

### LYSOBACT 20 mg / 10 mg pastil

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** 20 mg Lizozim Hidroklorür ve 10 mg Piridoksin Hidroklorür (B6 vitamini) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, tragakant, magnezyum stearat, sakarin sodyum, vanilin, saf su.

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de LYSOBACT'ten en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### Bu Kullanma Talimatında:

1. LYSOBACT nedir ve ne için kullanılır?
2. LYSOBACT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LYSOBACT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LYSOBACT'ın saklanması

**Başlıkları yer almaktadır.**

### 1. LYSOBACT nedir ve ne için kullanılır?

LYSOBACT, etkin madde olarak lizozim hidroklorür ve piridoksin hidroklorür içerir.

LYSOBACT, 30 adet blister içeren ambalajlarda orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır. Solunum yolu üzerinde etkide bulunan ilaç grubuna dahildir ve lokal antiseptik etki gösterir. Bu ilaç erişkinlerde ve 6 yaş üzerindeki çocuklarda ateşin eşlik etmediği hafif boğaz ağrısı, ağız ülserleri ve ağızdaki küçük yaraların tedavisi için kullanılır.

### 2. LYSOBACT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

Başka ilaç kullanıyorsanız, kronik hastalığınız varsa, bazı metabolik hastalıklarınız varsa, ilaçlara aşırı duyarlı iseniz ya da bazı ilaçlara karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa doktorunuzu uyarın.

## **LYSOBACT'ı ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer;

- ocuđunuz 6 yařından kck ise;
- Lizozim hidroklorr ya da piridoksin hidroklorr veya diđer bileřenlerden birine karřı ařırı duyarlılıđınız varsa;
- Alerji sonucu yzde ve dudakta řiřme (anjiodem) olabileceđi iin, Piridoksin hidroklorr, lizozim hidroklorr veya yardımcı maddelerden herhangi birine karřı alerjiniz varsa.

## **LYSOBACT'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Yksek piridoksin (B<sub>6</sub> vitamini) dozlarının uzun sre kullanımı (aylar ve hatta yıllarca) sonrasında karıncalanma hissi, denge bozukluđu, el ve ayaklarda titreme ve hareketlerin koordinasyonunda glk gibi sorunlar ortaya ıkabilir. İla bırakıldıđında bu etkiler genellikle ortadan kalkar.
- Bu ilacı 5 gnden uzun sre kullanmamalısınız; aksi takdirde ađızdaki mikro-florada ortaya ıkan dengesizliđe bađlı olarak bakteriyel ya da fungal enfeksiyonun yayılması riski geliřir.
- Bařka semptomların ortaya ıkması (ateř, prlan balgam, yutma glđ) veya ktleřmesi durumunda ya da 5 gnlk tedaviye rađmen iyileřme olmaması halinde doktorunuza danıřınız.
- Lezyonlar yaygınlařırsa, sreleri uzarsa ya da ateř geliřirse hemen doktorunuza danıřınız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

## **LYSOBACT'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve iecekler LYSOBACT baskılı pastillerin etkisini deđiřtirmez.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza ve eczacınıza danıřınız.*

LYSOBACT, hamilelik sırasında kullanılması nerilmez.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza ve eczacınıza danıřınız.*

Lizozimin anne stne geiřiyle ilgili bilgiler az olduđundan ve piridoksinin byk blm anne stne getiđinden, emzirme sırasında bu ilacın kullanımından kaınılmalıdır.

## **Ara ve makine kullanımı**

LYSOBACT pastil hastaların ara ve makine kullanma becerisini etkilemez.

## **LYSOBACT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

LYSOBACT baskılı pastil laktoz içerir. Bu nedenle bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu biliyorsanız LYSOBACT almadan önce doktorunuza danışınız.

### **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

Reçetesiz olanlar ve bitkisel olanlar dahil ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız bunu doktorunuza söyleyin. LYSOBACT diğer ilaçların etkilerinde değişikliğe yol açabileceği gibi başka ilaçlar da LYSOBACT'ın etkilerini değiştirebilir.

Antiseptik ajan içeren birden fazla ilacı aynı anda kullanmayın.

Bu ilaçta lizozim hidroklorür ve piridoksin hidroklorür bulunmaktadır.

Başka ilaçlarda da bu maddeler bulunabilir. Önerilen maksimum dozun üzerine çıkmamak için bu ilaçları bir arada kullanmayın.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. LYSOBACT nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yalnızca erişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılır.

Gün içerisinde düzenli aralıklarla 6 ila 8 pastil alınır.

Dozlar arasında en az 1 saat süre bırakılmalıdır.

Tedavi süresi 5 gündür. Belirtilerin 5 günden uzun sürmesi ve/veya ateş olması durumunda bir doktora başvurulmalıdır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

Baskılı pastiller dil altında yavaşça eritilmelidir. Çiğnenmemeli ya da yutulmamalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

6 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

## **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

*Eğer LYSOBACT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

## **Kullanmanız gerekenden fazla LYSOBACT kullandıysanız**

*LYSOBACT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Yüksek ilaç dozlarının uzun süreler (aylar ve hatta yıllar) boyunca kullanımı periferik nöropatiye (karıncalanma hissi, el ve ayaklarda titreme, kas güçsüzlüğü) yol açabilir; ilaç kesildiğinde bu etki genellikle ortadan kalkar.

Doz aşımı durumunda hemen doktorunuza başvurun. Böylelikle doktorunuz size tıbbi yardımda bulunabilir.

## **LYSOBACT'ı kullanmayı unutursanız**

Bu ilacı almayı unuttuğunuzda çift doz almayın ve normal doz saatine uyararak ilaç almayı sürdürün.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **LYSOBACT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Bu ilacı aniden kestiğinizde üzerinizde zararlı bir etkiye yol açması beklenmez.

LYSOBACT pastil kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi LYSOBACT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, LYSOBACT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

### **Seyrek yan etkiler (1000 hastada 1'den az)**

- Deride döküntü, şiddetli kaşıntı, derinin güneş ışığına karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite)
- Ağır alerjik reaksiyon (anafilaktik şok), yüz ve boyunda ani bir şişme (Quincke ödemi).

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

## Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. LYSOBACT’ın Saklanması**

*LYSOBACT’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

30 pastil içeren (3 blisterde 10 pastil) PVC/Al blister ambalajlarda, orijinal karton kutuda ambalajlanmaktadır.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LYSOBACT’ı kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

### ***Ruhsat Sahibi:***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Maslak / İstanbul

### ***Üretim Yeri:***

Bosnalijek D.D.  
Jukićeva 53 Sarajevo,  
Bosna Hersek

*Bu kullanma talimatı 04/04/2023 tarihinde onaylanmıştır.*