

## KULLANMA TALİMATI

### MAFLOR PLUS Kapsül

**Ağızdan alınır.**

**Etkin madde:**Her bir kapsül 93,40 mg Probiyotik Ferment Karışımı (*Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium animalis ssp lactis B94*) aktif probiyotik içerir.

**Yardımcı maddeler:**İnulin, Maltodekstrin, Hidroksipropil metil selüloz, Magnezyum stearat, Askorbik asit.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MAFLOR PLUS'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- Bu kullanma talimatını saklayınız .Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkasına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

### **Bu Kullanma Talimatında**

- 1. MAFLOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. MAFLOR PLUS' ı kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?**
- 3. MAFLOR PLUS nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkileri nedir?**
- 5. MAFLOR PLUS' ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. MAFLOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?

MAFLOR PLUS'ın etkin maddeleri olan *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium animalis ssp lactis B94*, biyolojik kaynaklı bir ishal kesicidir.

MAFLOR PLUS bağırsak florasında bulunan bakterilerin sayısını artırır ve zararlı bakterilerin sayılarının azalmasına yardımcı olarak ishal oluşumunu engeller.

MAFLOR PLUS'ın desikant içeren HDPE kapak ile kapatılmış HDPE şişe ambalaj içinde 15 ve 30 adet kapsül içeren kutularda pazarlanmaktadır.

MAFLOR PLUS'ın mikrobik (enfeksiyöz) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde, kullanılan Vankomisin/metranidazole isimli ilaçlara ek olarak *Clostridium difficile* isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığın tekrarının ve seyahate bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

## 2. MAFLOR PLUS' ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### MAFLOR PLUS' ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- MAFLOR PLUS' ın içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa
- Santral venöz kateteriniz varsa
- Akut pankreas iltihabınız varsa kullanmayınız.

### MAFLOR PLUS' ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir ise
- Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse,

bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### MAFLOR PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

MAFLOR PLUS 'ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.

### **MAFLOR PLUS 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçindeki maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

### **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:**

MAFLOR PLUS bakteriyel yapıda olduğu için bakteri önleyici ilaçlara karşı duyarlıdır.

Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. MAFLOR PLUS nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 kapsül alınır.

Çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

MAFLOR PLUS çok sıcak, gazlı veya alkollü içeceklerle veya yiyeceklerle alınmamalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklar kapsül alamayacağı için saşe kullanılmalıdır.

### **Yaşlılarda Kullanımı:**

Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Özel kullanım durumu yoktur.

*Eğer MAFLOR PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden fazla MAFLOR PLUS kullandıysanız**

*MAFLOR PLUS'ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **MAFLOR PLUS' ı kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **MAFLOR PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi MAFLOR PLUS' ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın : 10 hastadan en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden biri olursa, MAFLOR PLUS' ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Anafilaktik şok (yüz, boğaz, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu nefes alma ve yutkunma zorluğuna yol açabilir. Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi)
- Deri döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık

## **Seyrek**

- Barsaklarda gaz/midede rahatsızlık hissi

## **Çok seyrek**

- Ateş,

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **Yan Etkilerin Raporlanması :**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan " İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)' ne bildiriniz.Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. MAFLOR PLUS' ın saklanması**

*MAFLOR PLUS' ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında nemden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MAFLOR PLUS' ı kullanmayınız.*

''Son Kullanma Tarihi'' ambalajda yazılı ayın son günüdür.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız MAFLOR PLUS'ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

## **Ruhsat sahibi:**

Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş

Mahir İz Caddesi No: 43 Altunizade

Üsküdar, İstanbul

**Üretim yeri:**

Laboratories Ineldea Fransa adına

Lallemand Health Solutions Inc.

8480 boul Saint-Laurent

Montreal, Quebec, H2P 2M6

KANADA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.