

KULLANMA TALİMATI

MEBUCAIN naneli pastil

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir pastil 2 mg setilpiridinyum klorür ve 1 mg lidokain hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Nane yağı, levomentol, asesulfam potasyum, mısır nişastası, sitrik asit monohidrat, makrogol, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, sorbitol (E420), saf su

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MEBUCAIN'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımını sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MEBUCAIN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MEBUCAIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MEBUCAIN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MEBUCAIN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. **MEBUCAIN nedir ve ne için kullanılır?**

- MEBUCAIN etkin madde olarak setilpiridinyum ve lidokain HCl içeren, pastil formunda bir üründür.
- MEBUCAIN boğaz preparatları olarak adlandırılan ilaç grubunun antiseptikler sınıfına dahil bir üründür.
- MEBUCAIN 20 adet pastil içeren blister ambalajlarda, orijinal karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
- MEBUCAIN,
 - Lokal antiseptik ve ağrı kesici etkisiyle, boğaz ağrısında, ve ağız ve boğazın minör enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak, ağrı ve tahrişin giderilmesinde kullanılır.

2. **MEBUCAIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

MEBUCAIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Setilpiridinyum klorür veya lidokain hidroklorüre ya da MEBUCAIN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise

MEBUCAIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Birkaç gün süren boğaz ağrınız ve ateşiniz varsa, MEBUCAIN kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
- MEBUCAIN kullanımınızla şikayetleriniz devam eder veya belirtilere yüksek ateş, baş dönmesi veya kusma eşlik ederse ilacı kesiniz ve doktorunuza danışınız.
- MEBUCAIN’i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEBUCAIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MEBUCAIN’i yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen önce kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- MEBUCAIN'i kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- MEBUCAIN'i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

- MEBUCAIN'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

MEBUCAIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MEBUCAIN sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MEBUCAIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:

Şiddetli rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca göre 1-2 saatte 1 pastil

Hafif rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca göre 2-3 saatte 1 pastil

Günlük 6 pastili aşmamalıdır.

6-12 yaşındaki çocuklar

İhtiyaca göre 3-4 saatte bir 1 pastil

Günlük doz 3 pastili aşmamalıdır.

MEBUCAIN'i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

MEBUCAIN'i ağız yoluyla alınız.

MEBUCAIN pastili ağızınızda yavaşça eritiniz. Çiğnemeyiniz ya da yutmayınız.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanım:**

MEBUCAIN'in 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

MEBUCAIN'in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer MEBUCAIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEBUCAIN kullandıysanız:

MEBUCAIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEBUCAIN'i kullanmayı unutursanız

Eğer MEBUCAIN'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacınızı alınız ve ardından gerektiği takdirde dört saat içinde tedaviye devam ediniz.

Umutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

MEBUCAIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

MEBUCAIN ardarda en fazla 5 gün kullanım içindir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MEBUCAIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Bulantı
- Hafif bölgesel geçici ağız ve boğaz tahrişi

Bunlar MEBUCAIN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MEBUCAIN'in saklanması

MEBUCAIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MEBUCAIN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MEBUCAIN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretim Yeri : Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.