

## KULLANMA TALİMATI

### MECO-JEL %0.5

Topikal olarak haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** 5 mg Piroksikam
- **Yardımcı maddeler:** Carbopol 940 (Karboksivinil Polimer), Propilen glikol, Etil alkol, Benzil alkol, Diizopropanol amin, Hidroksietil selüloz, Saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **MECO-JEL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MECO-JEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MECO-JEL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MECO-JEL'in saklanması**

#### **1. MECO-JEL nedir ve ne için kullanılır?**

MECO-JEL berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır. Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. MECO-JEL 50 g'lık tüplerde sunulur. MECO-JEL'in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAI) ilaç gurubuna dahildir. MECO-JEL etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur. MECO-JEL, romatizma, burkulma, incinme ve eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

#### **2. MECO-JEL' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **MECO-JEL' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer geçmişte MECO-JEL' e, piroksikamın herhangi başka bir formuna, aspirine ya da ağrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma güçlüğü, astım, burunda polip gelişimi (normal yüzeyden dışa fırlayan, yarım küre, küre veya düzensiz şekilli bir doku kitlesi), burun akıntısı, kurdeşen veya baş ve boyunda şişme olduysa.
- Eğer lokal tahriş gelişirse MECO-JEL kullanımını bırakınız.
- Göze, mukozaya, açık yaraya ve uygulama yerinde deri hastalığı varsa kullanmayınız.

## **MECO-JEL' i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

İlaçlar her zaman herkes için uygun deđildir. Doktorunuz MECO-JEL kullanmadan önce geçmiřte ya da řimdi ařađıdakilerin sizde olup olmadığını bilmelidir:

- Eđer karaciđer rahatsızlıđınız varsa,
- Eđer böbrek rahatsızlıđınız varsa.

MECO-JEL' in 12 yařın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **MECO-JEL' in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

MECO-JEL' in herhangi bir yiyecek/iecek ile etkileřime girdiđi bilinmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

MECO-JEL' in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

MECO-JEL' in emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmez.

### **Ara ve makine kullanımı**

MECO-JEL' in ara ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

### **MECO-JEL' in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

MECO-JEL propilen glikol ierir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

### **Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

MECO-JEL' in diđer ilaçlarla bilinen bir etkileřimi yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. MECO-JEL nasıl kullanılır?**


### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıđı için talimatlar:**

- MECO-JEL' i her zaman, aynen doktorunuz söylediđi gibi kullanınız. Emin deđilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danıřınız. MECO-JEL deride kalmayana kadar ovarak sđrđnölz. Bunu günde 3-4 kez yapınız. Belirtilerinizde iyileřme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.
- Doktorunuz ya da eczacınıza danıřmadan MECO-JEL' i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.

- MECO-JEL' i zarar görmüş deriye; mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz.
- MECO-JEL' i gözün yakınlarına, buruna, ağıza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulayınız.
- MECO-JEL uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- MECO-JEL sadece haricen, deriye uygulanır.
- Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız. Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.  
Skala:



- MECO-JEL' i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:** Kullanılmamasına ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

#### **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:** Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda etkinlik ve güvenliliği incelenmediğinden dikkatli kullanılmalıdır.

*Eğer MECO-JEL' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla MECO-JEL kullandıysanız ya da yanlışlıkla MECO-JEL yuttuysanız:**

Eğer yanlışlıkla çok fazla MECO-JEL kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir. Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

*MECO-JEL' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **MECO-JEL' i kullanmayı unutursanız:**

MECO-JEL' i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **MECO-JEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

MECO-JEL kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir. İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, MECO-JEL' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

**Aşağıdakilerden biri olursa, MECO-JEL' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aniden güçlkle ve gürültülü bir şekilde solumak
- Nefes almada güçlük
- Ateş
- Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme
- Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MECO-JEL' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- MECO-JEL' in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn. Egzama, temas iltihabı)
- Güneşe karşı deri hassasiyeti

**Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.**

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- Bulantı (hastalık hissi)
- Hazımsızlık
- Midede rahatsızlık
- Akciğerdeki hava yollarında daralma
- Nefes darlığı

Bu yan etkiler, MECO-JEL' i kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolmalıdır. Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. MECO-JEL' in saklanması**

*MECO-JEL' i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MECO-JEL' i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.  
No:4, 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL  
**Üretici:** Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mahallesi Tunç Caddesi No.:3  
Esenyurt-İstanbul

*Bu kullanma talimatı GG/AA/YY tarihinde onaylanmıştır.*