

KULLANMA TALİMATI

MERPURİN 50 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 50 mg merkaptopürin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, mısır nişastası, çözülebilir nişasta, stearik asit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MERPURİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MERPURİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MERPURİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MERPURİN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MERPURİN nedir ve ne için kullanılır?

MERPURİN, merkaptopürin içeren, açık sarı, yuvarlak, bir yüzü ortadan çentikli bikonveks tabletlerdir. 25 tablet içeren polipropilen çocuk emniyet kapaklı amber renkli cam şişelerde piyasaya sunulmuştur. Bu grup ilaçlara sitotoksikler adı verilir. MERPURİN lösemi tedavisinde kullanılmaktadır. MERPURİN vücudunuzun üretmiş olduğu yeni kan hücrelerinin sayısını azaltarak çalışır.

MERPURİN, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- **Akut miyeloid lösemi (AML)** - Hızla büyüyen hastalık; kemik iliği tarafından üretilen beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırmaktadır. Bu durumda enfeksiyonlara ve kanamalara neden olabilir.
- **Akut lenfoblastik lösemi (ALL)** - Hızla büyüyen hastalık; olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin sayısını artırır. Bu olgunlaşmamış beyaz kan hücreleri büyüyemez ve düzgün

çalışamayacak durumda olurlar, bu yüzden enfeksiyonlarla savaşılamazlar ve kanamaya sebebiyet verirler.

- **Kronik granülositik lösemi (KGL)** – Hastalık; beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırmaktadır. Bu durumda enfeksiyonlara ve kanamalara neden olabilir.

2. MERPURİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MERPURİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- MERPURİN'e veya MERPURİN'in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise almayın. Eğer emin değilseniz, MERPURİN almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

MERPURİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Eğer bir karaciğer sorunuz varsa, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarını izlemelidir.
- Eğer vücudunuzun üretmiş olduğu Tiyapürin metiltransferaz (TPMT) çok az seviyede bulunuyor ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MERPURİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aç veya tok karına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

Eğer bir bebek sahibi olmayı planlıyorsanız MERPURİN almayın. Bu hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir. MERPURİN sperm veya yumurtaya zarar verebilir. Siz ya da eşiniz bu tabletleri alıyor iken gebeliği önlemek için güvenilir kontraseptif önlemler alınması gerekebilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERPURİN alırken emzirmeyin.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım yeteneği üzerindeki etkisi hakkında ilgili veri yoktur.

MERPURİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MERPURİN tabletler laktoz içermektedir. Eğer bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu doktor tarafından söylenmişse; MERPURİN tablet almadan önce doktorunuza başvurun.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız MERPURİN kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

- Diğer sitotoksik ilaçlar (kemoterapi) - MERPURİN ile kullanıldığında yan etkileri daha büyük olabilmektedir, solunum problemleri gibi.
- Allopurinol – (gut hastalığı tedavi etmek için kullanılan)
- Varfarin – (kanı inceltmek için kullanılan)
- Olsalazine veya mesalazin – (ülseratif kolit denilen bir bağırsak sorunu için kullanılan)
- Sülfasalazin – (romatoid artrit veya ülseratif kolit için kullanılan)

MERPURİN alırken aşı olunması;

Aşı olmanızı gerektirecek herhangi bir durum öncesinde doktorunuz veya hemşireniz ile konuşmanız gerekmektedir. Çünkü bazı aşılar (çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık), MERPURİN alımı sırasında enfeksiyona sebep olabilmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MERPURİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MERPURİN sadece kan hastalıkları tedavisinde deneyimli bir uzman doktor tarafından verilmelidir.

MERPURİN'i daima doktorunuzun size belirtmiş olduğu zamanlarda alınız, MERPURİN'in doğru zamanlarda alınması çok önemlidir. Paketin üzerindeki etikette kaç tablet ve ne sıklıkta almanız gerektiği size belirtilmiştir. Eğer ki belirtilmediyse veya emin değilseniz; doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- Tabletler bir bardak su ile yutulmalıdır.
- Eğer tableti yarıya kırmak gerekiyorsa, herhangi bir şekilde tablet tozu solunmamalıdır. Hemen sonrasında eller yıkanmalıdır.
- MERPURİN'i almaya başladığınız zaman doktorunuzun düzenli kan testlerini yapması gerekmektedir. Yapılan testler kan hücrelerinin sayısını ve türünü kontrol etmek bununla beraber karaciğerin düzgün çalıştığından emin olmak içindir.
- Doktorunuz ayrıca ürik asit düzeylerini izlemek için başka kan ve idrar testleri isteyebilir.
- MERPURİN'i kullanırken vücudun doğal kimyasalı olan ürik asit seviyelerinde yükselme gözlemlenebilir.
- Doktorunuz bazen bu testler sonucunda MERPURİN dozunu değiştirebilir.

Size verilecek olan MERPURİN dozu doktorunuz tarafından yapılacak olan çalışmaya dayanarak belirlenir:

- Vücut ölçünüz (yüzey alanı)
- Kan testlerinizin sonuçlarına

- Yetişkinlerde alışılmış başlangıç dozu günlük 2.5 mg/kg vücut ağırlığı oranına göre belirlenir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda alışılmış başlangıç dozu günlük 2.5 mg/kg vücut ağırlığı oranına göre belirlenir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda yapılacak olan böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinden sonra eğer gerekli görülürse doz ayarlaması yapılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek/karaciğer fonksiyon yetmezliği bulunan hastalarda verilen MERPURİN dozunun azaltılması düşünülmelidir.

Eğer MERPURİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MERPURİN kullandıysanız :

MERPURİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MERPURİN'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuza danışınız.

MERPURİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MERPURİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MERPURİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MERPURİN'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

- Alerjik reaksiyon, aşağıdaki belirtileri içerebilir:
 - Deri döküntüleri
 - Yüksek ateş
 - Eklem ağrısı
 - Yüz şişmesi
- Ateş veya enfeksiyon belirtileri (boğaz ağrısı, ağız yarası veya idrar sorunları)

- Beklenmedik morarma veya kanamalar
- Eğer aniden kendinizi kötü hissederseniz (normal sıcaklıkta dahi)
- Herhangi bir göz veya cilt sararması (sarılık)
- Eğer ishal varsa
- Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız (bulantı) veya hasta olduysanız (kusma)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilere sahiptir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MERPURİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Çok yaygın: (10 hastadan 1'inde görülebilir)

- Beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısında bir düşüş

Yaygın: (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

- Karaciğer zehirlenmesi
- Bulantı veya kusma

Yaygın olmayan: (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

- Kansızlık
- İştah kaybı

Seyrek: (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

- Eklem ağrısı
- Ağız ülseri
- Pankreas iltihabı
- Saç dökülmesi

Çok seyrek: (10000 hastanın birinden az görülebilir)

- Lösemi
- Bağırsaklarda ülser
- Düşük sperm sayısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. MERPURİN'in saklanması

MERPURİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Orijinal ambalajında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şışedeki son kullanma tarihinden sonra MERPURİN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MERPURİN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40

Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 09/01/2013 tarihinde onaylanmıştır.