

KULLANMA TALİMATI

MIKOSTATIN oral süspansiyon

Ağız yoluyla alınır.

- *Etkin madde:* 1 ml süspansiyonda 100.000 ünite nistatin.
- *Yardımcı maddeler:* Sinnamealdehit, kiraz esansı, gliserin, metilparaben, nane yağı, propilparaben, sukroz, karboksimetil selüloz sodyum, sodyum fosfat dibazik susuz, etanol %1, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *MIKOSTATIN nedir ve ne için kullanılır?*
2. *MIKOSTATIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *MIKOSTATIN nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *MIKOSTATIN' in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. MIKOSTATIN nedir ve ne için kullanılır?

MIKOSTATIN'in her 1 ml'si 100.000 ünite nistatin içerir.

MIKOSTATIN 48 dozluk cam şişelerde, damlalıklı kapak ile birlikte kullanıma sunulan hafif, krem sarısı, homojen (tekdüze), vişne/nane aromalı opak (saydam olmayan) süspansiyondur (katı-sıvı karışım).

MIKOSTATIN antienfektifler (enfeksiyon gidericiler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

MIKOSTATIN, ağız boşluğu (pamukçuk) ve boğazda kandida adı verilen bir mantar türünün sebep olduğu enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların) tedavisinde kullanılır.

2. MIKOSTATIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIKOSTATIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Nistatine veya MIKOSTATIN'in diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise.

MIKOSTATIN'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer, MIKOSTATIN tedavisi sırasında duyarlılık veya tahriř geliřirse derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse MIKOSTATIN'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her ml'de 500 mg sukroz içerir. Bu durum řeker hastalıđı (diyabet) olan hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Her ml'de 8.07 mg alkol (etanol) içerir. Alkol bađımlılıđı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciđer hastalıđı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

MIKOSTATIN'i önerilen kullanımı dışında bařka enfeksiyonların (iltihap oluřturan mikrobik hastalıkların) tedavisi için kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

MIKOSTATIN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek ve iecekler ilacın ađız ya da bođaz ile temas süresini azaltacaktır.

MIKOSTATIN ile alkol arasında bilinen bir etkileřim yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

MIKOSTATIN'in vücut tarafından emilimi çok azdır. Hamile iseniz; ancak doktorunuz gerekli olduđuna karar verirse MIKOSTATIN kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Eđer emziriyorsanız MIKOSTATIN kullanırken dikkatli olunuz.

Ara ve makine kullanımı

MIKOSTATIN tedavisi bulantı ve kusma riskinde artışa ve mide-barsak sisteminde rahatsızlıđa yol açabilir. İla uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, ara ve makine kullanmayınız.

MIKOSTATIN'in içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MIKOSTATIN az miktarda alkol (etanol) (her ml'sinde 8.07 mg) ve sukroz (her ml'sinde 500 mg) içerir.

MIKOSTATIN, bazı hastalarda yüksek dozda bař ağrısı, mide rahatsızlıđı ve ishale yol açabilecek gliserin içerir. Bununla birlikte, MIKOSTATIN'in içindeki miktarın bu sorunlara yol açması beklenemez.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı:

MIKOSTATIN genellikle diđer ilalarla etkileřime girmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MIKOSTATIN nasıl kullanılır?

MIKOSTATIN'i her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yeni Doğan Bebekler:

Günde dört defa 1 ya da 2 ml kullanılır.

Erken doğan (prematüre) ve düşük kilolu yeni doğan bebeklerde günde dört defa 1 ml kullanılması yeterlidir.

Çocuklar ve Yetişkinler:

Günde dört defa 1 ila 6 ml dozlarda kullanılır.

MIKOSTATIN uygulamasına, belirtiler ortadan kaybolduktan sonra en az 48 saat devam ediniz. Eğer 14 gün tedaviden sonra belirtiler daha kötüye gider ya da devam ederse doktorunuza danışınız.

Tedavinin ilk bir kaç gününde belirtilere yönelik bir rahatlama hissetseniz bile, sizin için reçete edilen tedavi kürü tamamlanmadan ilaca ara vermeyiniz ya da tedaviyi kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Bu ilacı ağız ya da boğazınızdaki bir enfeksiyon için alıyorsanız, çözeltiliyi yutmadan önce ağzınızda mümkün olduğu kadar uzun süre (örneğin bir kaç dakika) tutunuz. İlacın enfeksiyon yeri ile daha uzun temas etmesi iyidir.

Yeni doğan bebeklere ve küçük çocuklara ağzın her iki tarafına dozun yarısını uygulayınız. Tedaviniz sırasında takma dişlerin uygun bakımı dahil, ağız içi hijyeninize özen gösteriniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

MIKOSTATIN yeni doğan bebekler ve çocuklarda kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanım:

MIKOSTATIN' in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer MIKOSTATIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MIKOSTATIN kullandıysanız:

MIKOSTATIN'in vücut tarafından emilimi çok az olduğundan, gerekenden fazla alınmasının ciddi etkilere yol açmaması beklenir. Ancak çocuklarda bu durumu hastane veya doktorunuz ile paylaşınız.

MIKOSTATIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MIKOSTATIN'i kullanmayı unutursanız:

Eğer bir sonraki dozu almanıza yakın bir zaman değilse, hatırladığınız anda ilacınızı alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MIKOSTATIN ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz MIKOSTATIN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetmeniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MIKOSTATIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MIKOSTATIN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
- Aşırı duyarlılık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

-Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, MIKOSTATIN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerek olabilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- İshal, mide-barsak sisteminde rahatsızlık, bulantı, kusma, ağızda iritasyon ya da duyarlılık
- Kurdeşen (ürtiker) dahil döküntü

Bunlar MIKOSTATIN'in hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

5. MIKOSTATIN'in saklanması

*MIKOSTATIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
15-30°C arasında oda sıcaklıklarında saklayınız.*

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MIKOSTATIN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MIKOSTATIN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi

Maslak, 34398 İstanbul

Üretici: FAKO İlaçları A.Ş. Levent - İstanbul

Bu kullanma talimatı 18/11/2009 tarihinde onaylanmıştır.