

KULLANMA TALİMATI

MUCOFİX 1200/400 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 1200 mg asetilsistein ve 400 mg doksofilin içerir.

Yardımcı maddeler: Polietilenglikol, polivinilpirolidon, sukraloz (E 955), sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, böğürtlen aroması ve kayısı aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1.MUCOFİX nedir ve ne için kullanılır?**
- 2.MUCOFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3.MUCOFİX nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. MUCOFİX'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOFİX nedir ve ne için kullanılır?

MUCOFİX, efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak sistein (bir amino asit) türevi bir ilaç olan asetilsistein ve ksantinler denilen bir ilaç grubunun üyesi olan doksofilin içermektedir.

Asetilsistein balgam sökücü, doksofilin bronşları gevşetici özelliğe sahiptir.

MUCOFİX, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletlerdir. 5, 10 ve 20 efervesan tablet strip ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

MUCOFİX astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılır.

2. MUCOFİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOFİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Asetilsistein, doksofilin veya MUCOFİX içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
- Kalp krizi geçirdiyse
- Tansiyonunuz düşükse
- Bebeğinizi emziriyorsanız

MUCOFİX'i kullanmayınız.

Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

MUCOFİX'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Kalp hastalığı veya kalp yetmezliği varlığında
- Hipoksemi (kanda oksijen seviyesinin düşük olması) varlığında
- Hipertiroid (tiroid bezinin aşırı çalışması) varlığında
- Karaciğer ve böbrek yetmezliği varlığında
- Mide ülseri varlığında
- Eş zamanlı enfeksiyon varlığında
- Sigara kullananlarda
- Yaşlılarda
- Bulantı ve kusmaya eğilimi oluşturabilecek herhangi bir rahatsızlık varlığında
- Astım hastalarında
- Öksürük refleksinin yeterli olmadığı kişilerde

Bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOFİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOFİX aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelikte açıkça gerekli olmadıkça MUCOFİX kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOFİX'in süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımını üzerine etkisi bilinmemektedir.

MUCOFİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı

MUCOFİX her dozunda 21,42 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MUCOFİX diğer ksantin türevleri ve efedrinle birlikte kullanılmalıdır.

MUCOFİX'in antisekratuar (vücut salgısı salımını engelleyici) ve antitussif (öksürük giderici) ilaçlarla beraber kullanılması uygun değildir.

MUCOFİX içeriğindeki asetilsistein antibiyotik grubu ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmaları gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında kandaki doksofilin seviyeleri artabilir, birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır:

- Eritromisin, troleandomisin, linkomisin, klindamisin gibi makrolid ve linkozamid grubundan antibiyotikler
- Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
- Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
- Propranolol (yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılır)
- Grip aşısı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUCOFİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

MUCOFİX'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinlerde ve 14 yaşın üstündeki çocuklarda önerilen MUCOFİX dozu günde 1 efervesan tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

MUCOFİX sadece ağızdan kullanım içindir.

MUCOFİX, bir bardak suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.

MUCOFİX, aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

7-14 yaş arası çocuklarda MUCOFİX'in bu yaş grubuna uygun dozunun (600/200 mg) kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu yaş grubuna özel kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlar kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

MUCOFİX daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasıdan kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.

Eğer MUCOFİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOFİX kullandıysanız:

Aşırı doz kullanımı, mide-barsak bölgesinde tahrişe neden olabilir. Mide yanması, mide ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

MUCOFİX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUCOFİX'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOFİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. MUCOFİX almayı bırakırsanız, hastalığınız daha kötüye gidebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUCOFİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUCOFİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Şiddetli alerjik reaksiyonlar (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte)).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Hiperglisemi (yüksek kan şekeri)
- Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
- Takipne (solunumun hızlanması)
- Kalp ritminde bozukluk

- Albüminüri (idrarda albumin bulunması)
- Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında).
- Cilt kızarıklıkları veya iritasyonları.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Baş ağrısı
- Mide ağrısı
- Bulantı
- Kusma
- Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite)
- Ağız iltihabı
- Karın ağrısı
- İshal
- Ateş

Bunlar MUCOFİX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MUCOFİX'in saklanması

MUCOFİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUCOFİX'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, MUCOFİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mentis İlaç San. Tic Ltd Şti.

Florya Asfaltı Florya İş merkezi No: 88 Blok: No:6

Bakırköy / İstanbul

Telefon: 0 212 481 79 52

Faks: 0 212 481 79 52

Üretim yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 26.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.