

## KULLANMA TALİMATI

### NEUPRO 6 mg transdermal flaster

Deriye yapıştırılarak kullanılır.

- **Etkin madde:** Her bir flaster (30 cm<sup>2</sup>) 13.5 mg rotigotin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Poli(dimetilsiloksan, trimetilsilil silikat)-kopolimerizat, povidon K90, E171, E223, E304, E307, floropolimer, poliester, silikon, alüminyum, pigmentler (kırmızı 144, siyah 7, sarı 95 ve kırmızı 166)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız .*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **NEUPRO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NEUPRO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NEUPRO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NEUPRO'nun saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. NEUPRO nedir ve ne için kullanılır?**

Rotigotin, NEUPRO'nun etkin maddesidir. NEUPRO, beyinde dopamin reseptörlerine bağlanarak belirli tipteki hücreleri uyaran, dopamin agonistleri olarak adlandırılan bir ilaç grubundadır.

NEUPRO transdermal bir flasterdir. Her bir flasterden 24 saat boyunca toplam 6 mg rotigotin salınır.

NEUPRO transdermal flaster incedir ve 3 tabakadan oluşur. Kenarları yuvarlatılmış kare şeklindedir. Sırt tabakanın dışı sarımsı kahve rengindedir ve NEUPRO 6 mg/24 saat basılıdır. NEUPRO tek dozluk paketlerde ambalajlanmış 28 flaster içeren karton kutulardadır.

NEUPRO, hastalığın ilk döneminde tek başına veya hastalığın ileri döneminde levodopa olarak bilinen bir ilaç ile birlikte Parkinson hastalığının bulgu ve belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

## **2. NEUPRO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **NEUPRO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Rotigotin veya NEUPRO'nun diğer bileşenlerine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
- Size manyetik rezonans görüntüleme (MR, vücudunuzdaki iç organların ve dokuların görüntülenmesi yöntemi) veya kardiyoversiyon (anormal kalp ritimlerinin tedavisi) yapılması gerekiyorsa bu işlemden önce NEUPRO'yu çıkartmalısınız. İşlem bittikten sonra yeni bir flaster yapıştırabilirsiniz.

### **NEUPRO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Bu ilaç kan basıncını etkileyebilir. Bu nedenle özellikle tedavinin başında kan basıncınız düzenli olarak ölçülmelidir.
- NEUPRO kullanılırken düzenli aralıklarla göz muayenesi önerilir. Bununla beraber, eğer, muayeneler arası görme durumunuzda bir problem fark ederseniz derhal doktorunuza danışınız.
- Eğer ciddi karaciğer sorunuz varsa daha düşük doz almanız gerekebilir. Eğer karaciğer probleminiz kötüleşirse lütfen doktorunuza danışınız.
- Eğer kendinizde uyuşukluk hissediyorsanız veya aniden uykuya dalıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız (Ayrıca 'Araç ve makine kullanma' bölümüne bakınız).
- Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, NEUPRO hastalarda aşırı kumar, seks ve yeme dürtüsünde artışa neden olabilir. Eğer böyle etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.

- NEUPRO, halüsinasyonlara (gerçekte var olmayan şeyleri duymak veya görmek) neden olabilir. Eğer böyle etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
- Diğer flaster ve bandajlarla olduğu gibi NEUPRO, kaşıntı, kızarma gibi deri reaksiyonlarına neden olabilir. Bu reaksiyonlar normalde hafif veya orta şiddetlidir ve genellikle sadece flasterin üzerinde olduğu deri bölgesini etkiler. Bu reaksiyonlar, genellikle flasteri çıkardıktan birkaç saat sonra yok olur. Eğer uygulama bölgesindeki deri reaksiyonu bir kaç günden daha uzun sürerse, eğer reaksiyon şiddetlenirse, veya deri reaksiyonları flasterin uygulandığı bölgenin dışına yayılırsa, lütfen doktorunuza danışınız.
- NEUPRO ile oluşan deri reaksiyonlarının görüldüğü bölgeyi güneş ışığından koruyunuz ve solaryuma maruz bırakmayınız. Deri reaksiyonlarından korunmak için size flasteri her gün farklı bir bölgeye uygulamanızı öneriyoruz. 14 gün içinde flasteri aynı bölgeye tekrar uygulamamalısınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **NEUPRO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Rotigotin deri yoluyla kan dolaşımına girdiğinden yiyecek veya içeceklerden etkilenmez. NEUPRO kullanırken alkol almanın sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza danışınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Rotigotin hamilelik ve doğmamış bebek üzerine etkisi bilinmediğinden NEUPRO hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

NEUPRO emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Rotigotin anne sütüne geçerek bebeğinizi etkileyebilir ve ayrıca üretilen süt miktarını azaltabilir.

### **Araç ve makine kullanımı**

NEUPRO uyuşukluk hissetmenize veya aniden uykuya dalmanıza neden olabilir. Eğer bu durum sizi etkilerse, araç kullanmamalısınız veya dikkat eksikliği sonucunda sizin veya çevrenizdeki kişilerin ciddi şekilde yaralanmalarına yol açabilecek aktivitelerden kaçınmalısınız.

Birkaç vakada araç kullanırken kişi ani uykuya dalmış ve kazaya sebep olmuştur.

### **NEUPRO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

NEUPRO sodyum metabisülfid içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

- Antipsikotikler (ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) veya metoklopramid (mide bulantısı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaç) NEUPRO'nun etkisini azaltabilir. NEUPRO'yu kullanırken bu ilaçları almayınız.
- NEUPRO ve levodopa ile aynı anda tedavi ediliyor iseniz, bazı yan etkiler (gerçekte var olmayan şeyleri duymak veya görmek (hallusinasyonlar), Parkinson hastalığına bağlı istemsiz hareketler (diskinezi) ve bacakların ve ayakların şişmesi gibi daha ağırlaşabilir.
- Lütfen doktorunuza NEUPRO kullanırken alkol kullanmanızın veya yatıştırıcı ilaçlar almanızın (benzodiazepin, zihinsel bozuklukların veya depresyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar) sizin için güvenli olup olmadığını sorunuz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. NEUPRO nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

NEUPRO'yu her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar sorunuz.

NEUPRO, genel olarak uzun süreli tedavi için kullanılır. Genellikle tedavinize düşük doz ile başlayacaksınız ve eğer gerekirse, doktorunuzun size söylediği şekilde, sizin için uygun doza

ulařana dek, haftalık artışlarla arttıracaksınız. Daha sonra idame doz olarak adlandırılan doz ile tedavinize doktorunuzun size önereceđi řekilde devam edeceksiniz.

NEUPRO flasterinizi günde bir kez deđiřtirmelisiniz. İhtiyacınız olan dozlara ulařmak için farklı NEUPRO flasterleri bulunmaktadır, her biri, bir günde farklı miktarda etkin madde salmaktadır: 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 6mg ve 8mg.

Yüksek dozlar için çoklu flasterler uygulanmalıdır. Örneđin 10 mg dozuna ulařmak için bir 6 mg flasteri ve 4 mg flasteri birlikte uygulanabilir.

Parkinson hastalığının tedavisi:

**Eđer Parkinson hastalığının erken evresinde iseniz ve levodopa almıyorsanız:**

Tedaviye günde 2 mg NEUPRO ile bařlamalısınız. Bu doz, sizin ihtiyacınız olan uygun doza ulařılana kadar, ikinci haftadan itibaren her hafta, günde 2 mg'lık artışlarla arttırılacaktır. Hastaların birçođu için dođru doz, 3-4 hafta içinde ulařılabilen günde 6 ile 8mg arasında bir dozdur. En yüksek doz günde 8 mg'dır.

**Eđer ileri evre Parkinson hastalığınız varsa ve levodopa kullanıyorsanız:**

Tedaviye günde 4 mg NEUPRO ile bařlamalısınız. Bu doz, sizin ihtiyacınız olan uygun doza ulařılana kadar ikinci haftadan itibaren her hafta, günde 2 mg'lık artışlarla arttırılacaktır. Hastaların birçođu için dođru doz, 3-7 hafta içinde ulařılabilen, günde 8 ile 16 mg arasında bir dozdur. En yüksek doz günde 16 mg'dır.

Eđer ilacı kullanmayı kesmek zorundaysanız, 'NEUPRO ile tedavi sonlandırıldıđındaki oluřabilecek etkiler" bölümüne bakınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

Transdermal yolla (deriye yapıřtırılarak) uygulanır.

NEUPRO'yu kullanırken ařađıdaki talimatlara uyunuz:

Günde bir kez derinizin üzerine yeni bir NEUPRO flasteri yapıřtırmalısınız.

Flasterin derinizin üzerinde 24 saat boyunca kalması gerekir, daha sonra yeni bir tanesi ile değiştirmelisiniz. Yeni bir flasteri yapıştırmadan önce eski flasteri çıkarttığınızdan emin olunuz.


Flasteri her gün yaklaşık aynı saatte değiştirmelisiniz.

NEUPRO'yu keserek bölmeyiniz.

Flasteri yapıştırırken:

Flasterin yapışkan tarafını aşağıdaki bölgelere temiz, kuru ve sağlıklı deri üzerine yapıştırınız:

- omuz
- üst kol
- karın
- uyluk
- kalça
- böğür-yan taraf



(kaburganız ile kalçanız arasındaki yer)

Deri tahrişlerinden kaçınmak için:

- NEUPRO'yu her gün farklı bir bölgeye yapıştırınız (örneğin, bir gün vücudunuzun sağ tarafına, sonraki gün sol tarafınıza, bir gün vücudunuzun üst tarafına diğer gün alt kısmına).
- NEUPRO'yu 14 gün içinde aynı bölgeye tekrar yapıştırmayınız.
- Kızarmış, tahriş olmuş veya hasarlı deri üzerine veya çatlamış deri üzerine flasteri yapıştırmayınız.

Eğer flaster nedeniyle halen derinizle ilgili problemlerinizi varsa “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde yapmanız gerekenlere ayrıntılı olarak bakabilirsiniz.

Flasterin düşmemesi veya kaybolmaması için:

- NEUPRO'yu dar kıyafetler ile sürtünerek çıkmayacağı bir yere yapıştırmalısınız.
- Krem, yağ, losyon, pudra veya diğer deri ürünlerini flasteri yapıştıracağınız bölgeye veya flasteri yapıştırmış olduğunuz bölgenin etrafına sürmeyiniz.

- Eđer tyl bir blgeye flasterin yapıştırılması gerekiyorsa, bu blgeyi flasteri yapıştırmadan en az 3 gn nce tıraş etmelisiniz.

Eđer flaster dşerse, gnn geri kalanı iin yeni bir flaster uygulamalısınız, ardından flasteri deęiřtirmeniz gereken aynı zamanda flasteri yenisiyle deęiřtirmelisiniz.


NOT:

- Banyo, duř alma veya egzersiz NEUPRO'yu etkilememelidir. Bu gibi aktivitelerden sonra flasterin dřmedięini kontrol ediniz.
- Flaster blgesinin dıřardan ısıya (ařırı gneř ıřığı, sauna, sıcak banyo, ısıtma yastıkları veya sıcak termoforlara) maruz kalmasına engel olunuz.
- Eđer flaster deriyi tahriř ederse, deride renk deęiřiklięine neden olabileceęinden bu blgeyi gneřten koruyunuz.


Flaster nasıl kullanılır?

Her bir flaster ilacı ieren tek dozluk paketler halinde ambalajlanmıřtır. NEUPRO tek dozluk paket aıldıktan ve koruyucu bant ıkarıldıktan hemen sonra deri zerine yapıştırılmalıdır. Orijinal paket atılmamalı, flaster deęiřtirilene kadar saklanmalıdır.


1. Tek dozluk paketi açmak için, paketin iki tarafından tutunuz . Folyoyu sıyrarak paketi açınız.



2. Flasteri paketin içinden çıkartınız.




3. Flasterin yapışkan tarafı şeffaf koruyucu bant ile kapatılmıştır. Koruyucu bant size dönük şekilde flasteri iki elinizle tutunuz.



4. Banttaki S-şekilli ayırımın açılmasını sağlayacak şekilde flasteri ikiye bükünüz.



5. Koruyucu bantın bir tarafını sıyrınız. Parmaklarınızla yapışkanlı kısma dokunmayınız.



6. Sert koruyucu bantın diğer yarısını tutunuz ve flasterin yapışkanlı yüzeyini derinizin üzerine yapıştırınız. Flasterin yapışkanlı tarafı üzerine bastırarak iyice yapışmasını sağlayınız.



7. Flasterin diğer yarısını geriye katlayınız ve koruyucu bantın diğer tarafını kaldırınız.



8. Flasterin kenarlarının deri üzerine iyice yapıştığından emin olana kadar 20- 30 saniye boyunca flasterin üzerine avuç içinizle sıkıca bastırınız



Flasteri tuttuktan hemen sonra elinizi su ve sabunla yıkayınız.



Flaster nasıl deęiştirilir?

Yeni flaster yapıştırılmadan önce, kullanılmış flasteri dikkatli ve yavaş bir şekilde sıyrınız. Flasteri çıkardıktan sonra deri üzerinde kalan yapışkanların çıkarılması için bu bölgeyi sıcak su ve yumuşak bir sabun ile yavaşça yıkayınız. Yıkayarak çıkarılamayan yapışkanları çıkarmak için çok az miktarda bebek yağı da kullanabilirsiniz.

Alkol veya aseton gibi dięer çözücülerini kullanmayınız çünkü bunlar derinizi tahriş edebilir. Eęer flaster düşerse, günün geri kalan kısmı için yeni bir flaster uygulanmalıdır. Sonra flaster her zamanki gibi aynı zamanda deęiştirilir.

Kullanılmış ve kullanılmamış flasterler ile ne yapılmalı?

Kullanılmış flasterler hala etkin madde içermektedir. Bu da dięer kişilere zararlı olabilir. Kullanılmış olan flaster yapışkanı iç kısma gelecek şekilde katlanır. Flaster orjinal paketine konur ve çocukların erişemeyeceęi güvenli bir yere atılır.

Kullanılmış ve kullanılmamış flasterleri eczaneye geri veriniz. Flasterleri tuvalete ya da sıvı atık imha sistemlerine atmayınız.

### **Deęişik yaş grupları:**

Cinsiyet, ağırlık veya yaşa baęlı doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

### **Çocuklarda kullanımı:**

NEUPRO çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

### **Özel kullanım durumları:**

Hafiften orta dereceye kadar karacięer yetmezlięi veya hafiften ağır dereceye kadar böbrek yetmezlięi olan ve diyaliz gereken hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Ağır karacięer yetmezlięi olan hastalarda rotigotin klerensi azalabileceęinden dikkatli olunması önerilir. Akut olarak kötüleşen böbrek fonksiyonu vakalarında da rotigotin düzeylerinde beklenmedik birikme meydana gelebilir.

*Eęer NEUPRO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla NEUPRO kullandıysanız:**

*NEUPRO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Doktorunuzun önerdiğinden daha yüksek dozlarda NEUPRO kullanırsanız mide bulantısı, kusma, kan basıncında düşme, halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyleri duymak veya görmek), konfüzyon, aşırı uyku hali, istemsiz hareketler ve konvülsiyonlar görülebilir.

Eğer doktorunuzun önerdiğinden daha fazla sayıda flaster yapıştırdıysanız derhal doktorunuza danışınız ve flasterlerin çıkarılması ile ilgili doktorunuzun tavsiyesine uyunuz.

**NEUPRO flasterini değiştirmeniz gereken zamanda değiştirmeyi unutursanız:**

Eğer her gün değiştirdiğiniz saatlerde flasteri değiştirmeyi unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz eski flasteri çıkartınız ve yeni bir flaster yapıştırınız. Eğer eski flasteri çıkarttıktan sonra, yeni bir flaster yapıştırmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz yeni bir flaster yapıştırınız. Her iki durum için de ertesi gün yine her zamanki gibi, eski flasteri çıkardıktan sonra aynı saatlerde yeni flaster yapıştırınız.

*Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız*

**NEUPRO'ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuz ile konuşmadan, aniden NEUPRO'yu kullanmayı bırakmamalısınız. Aniden bırakma, önemli bir sağlık riski olan nöroleptik malign sendromu olarak adlandırılan bir tıbbi durum geliştirmenize neden olabilir. Akinezi (kas hareket kaybı), ateş, eklemlerde sertlik, kan basıncında düzensizlik, kalp atışlarında artma, konfüzyon, bilinç bozuklukları (örn. koma) gibi belirtiler yaşayabilirsiniz.

Bu belirtilerden kaçınmak için günlük NEUPRO dozunuz kademeli olarak azaltılmalıdır.

- Eğer NEUPRO'yu Parkinson Hastalığı için alıyorsanız dozunuz kademeli olarak gün aşırı 2 mg düşürülerek azaltılmalıdır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NEUPRO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tedavinin başında mide bulantısı ve kusma görülebilir. Bu yan etkiler genellikle hafif veya orta şiddettedir ve tedaviye devam etseniz bile geçicidir. Eğer bu yan etkiler daha uzun sürer de endişelenecek duruma gelerseniz doktorunuza danışınız.

## Deri reaksiyonları

Flasterden dolayı kızarma, kaşıntı gibi deri reaksiyonları gelişebilir. Bu reaksiyonlar genellikle hafif veya orta şiddettedir ve sadece flasterin olduğu bölgeyi etkiler. Bu reaksiyonlar normalde flaster çıkarıldıktan bir kaç saat sonra kaybolur.

Eğer birkaç günden daha uzun süren, şiddetli veya flasterin kapladığı alanın dışına yayılan bir deri reaksiyonunuz varsa doktorunuza bu durumu bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'nde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

## **Eğer NEUPRO'yu Parkinson Hastalığı için alıyorsanız:**

### **Çok yaygın:**

Uykulu hissetme

Sersemlik hissi

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Flasterin altında kızarıklık ve kaşıntı gibi deri reaksiyonları

### **Yaygın:**

Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon)

Uykuya dalmada güçlük yaşama

Uyku bozukluğu

Alışılmadık rüyalar,kabuslar görme

Uyuyamama

Bilinç kaybı

Parkinson hastalığına bağlı istemsiz hareketler (Diskinezi)

Kan basıncındaki düşmeye bağlı olarak ayağa kalkıldığı zaman hissedilen sersemlik hissi

Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik (Letarji)

Anormal hareketlilik hissetme (Baş dönmesi)

Kalp atımını hissetme (palpitasyon)

Oturduktan veya uzandıktan sonra ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi sonucu sersemlik hissi

Kan basıncının yükselmesi

Hıçkırık

Kabızlık

Dispepsi

Ağız kuruluğu

Midede yanma

Kilo azalması

Kızarıklık

Kaşıntı

Terlemede artış

Bacaklarda ve ayaklarda şişme

Güçsüz hissetme (Halsizlik, kuvvetsizlik ve rahatsız hissetme)

Düşme

**Yaygın olmayan:**

Aşırı duyarlılık (Abartılı bağışıklık yanıtı)

Uyku atakları/aniden uykuya dalmalar

Gerçeklik ve davranışlar hakkında anormal düşünceler

Aşırı kumar

A anlamsız hareketlerin tekrarlanması ve cinsel istekte artış gibi bazı aktiviteleri alışılmadık bir şekilde yapma dürtüsü

Zihin karışıklığı (Konfüzyon)

Renk veya ışık görme gibi görme bozuklukları

Bulanık görme

Kalp ritminde anormallik

Kan basıncının düşmesi

Karın ağrısı

Karaciğer fonksiyon test sonuçlarında artış veya anomaliler

Kilo artışı  
Kalp atım hızında artış  
Yaygın kaşıntı  
Kontakt dermatit  
Deri tahrişi  
Erkeklerde iktidarsızlık (Ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi)

**Seyrek:**

Psikotik bozukluk  
İstenmeyen ve kontrol edilemeyen düşünce ve davranışlar  
Aşırı yeme  
Saldırganlık/saldırgan davranış  
İstemsiz kas spazmları (Nöbet, konvülsiyon)  
Kalp atım sayısının artması  
Yaygın döküntü  
Uyartıya aşırı duyarlılık hali (İrritabilite)

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. NEUPRO'nun saklanması**

*NEUPRO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra NEUPRO'yu kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEUPRO'yu kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** UCB Manufacturing Ireland Ltd. lisansı ile  
UCB Pharma A.Ş.,  
Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Cad., Gerçekler Sitesi  
B Blok Kat:6, Kavacık / Beykoz 34805  
İstanbul / TÜRKİYE

**Üretici:** LTS Lohmann Therapie-Systeme AG  
Lohmannstraße 2  
D-56626 Andernach, ALMANYA

*Bu kullanma talimatı .../.../.... tarihinde onaylanmıştır.*