

KULLANMA TALİMATI

NEUVİTAN® 50 mg Draje Ağızdan alınır

- **Etkin madde:** Her bir drajede 50 mg oktotiamin ve 5 mg riboflavin bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz (hidrus), mısır nişastası, sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, saf su. Kaplama: Şellak, kastor oil, polisorbitat 40, akasya, metil paraben, talk, titanyum dioksit, riboflavin sodyum fosfat, şeker (sukroz), karnauba vaks

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **NEUVİTAN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **NEUVİTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **NEUVİTAN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **NEUVİTAN tabletlerin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. NEUVİTAN nedir ve ne için kullanılır?

NEUVİTAN sarı renkli drajedir ve 30 drajelik blister ambalajlarda bulunur.

NEUVİTAN aşağıdaki durumlarda doktorunuz tarafından size reçete edilecektir:

- B1 vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde
- Besinlerle alınmasının azaldığı ve ihtiyacının arttığı durumlarda (kilo kaybına yol açan hastalıklar, hipertiroidi (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi), gebelik ve emzirme dönemleri, ağır fizik egzersiz gibi)
- Wernicke ensefalopatisi (tiyamin eksikliğine bağlı bir beyin hastalığı)
- Beriberi hastalığı (beriberi kalbi)
- B1 vitamini eksikliğinin ya da metabolik bozukluğunun yer aldığı düşünülen nevralsi (sinir ağrısı), miyalji/artralsi (kas/eklem ağrısı), periferik nevrit (sinir yangısı)/periferik paralizi (felç), miyokardın (kalp kasının) metabolik hastalıkları, kabızlık gibi mide barsak sistemi hareket bozuklukları durumlarında (bu tür durumlarda, bir ay içinde belirtilerde azalma görülmezse NEUVİTAN tedavisi sürdürülmemelidir).

2. NEUVİTAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEUVİTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Ürünün içerisinde bulunan etkin ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa

NEUVİTAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Riboflavin idrarı boyadığı için bazı laboratuvar testlerini bozabilir. Eğer test yaptırarsanız doktorunuza NEUVİTAN kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEUVİTAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEUVİTAN aç ya da tok karına alınabilir.

Hamilelik

Hamileyseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı size bildirecektir.

Emzirme

Emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı size bildirecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NEUVİTAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Preparatın bileşiminde bulunan riboflavin, idrarın daha sarı bir renk almasına neden olur.

Bu ürün 98.571 mg laktoz ve 93.690 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Levodopa etkin maddesi içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında etkin maddenin etkisini zayıflatıp Parkinson belirtilerini arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NEUVİTAN nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Erişkinlerde genellikle günde 50-100 mg (1-2 draje) kullanılır. Doktorunuz yaşınıza ve belirtilere göre sizin için en uygun NEUVİTAN dozuna karar verecektir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

NEUVİTAN ağızdan alınan bir ilaçtır. Her draje bir miktar sıvı ile birlikte, bölünmeden, ezilmeden, çiğnenmeden ve suya konulmadan, bütün olarak yutulmalıdır.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda doz ayarlaması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa bunları doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer NEUVİTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEUVİTAN kullandıysanız:

Doktorunuzun size verdiği dozu aşmayınız.

NEUVİTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEUVİTAN'ı kullanmayı unutursanız,

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEUVİTAN'ı ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, NEUVİTAN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Karın bölgesinde dolgunluk hissi
- Bulantı
- İshal

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. NEUVİTAN'ın saklanması

NEUVİTAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ilacı kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEUVİTAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Astellas Pharma Inc./Japonya adına
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394, İstanbul

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı 06/02/2012 tarihinde onaylanmıştır.