

KULLANMA TALİMATI

®OFTALMOTRİM Steril Göz Damlası, 5mL

Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin maddeler:** 1 mL’de 10,000 I.U. Polimiksin B sülfat ve 1 mg Trimetoprim
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum metil hidroksibenzoat, sodyum propil hidroksibenzoat, kristalize sodyum klorür, %25 sülfürik asit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***OFTALMOTRİM nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***OFTALMOTRİM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***OFTALMOTRİM nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***OFTALMOTRİM’in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. OFTALMOTRİM nedir ve ne için kullanılır?

Oftalmolojik, antibiyotik, antibiyotik kombinasyonu

OFTALMOTRİM kornea, konjunktiva gibi göz dışı dokuların ve göz çevresi infeksiyonlarının tedavisi ve korunmasında kullanılır. Ayrıca yabancı cisim çıkarmada ve göz ameliyatlarından önce ve sonra koruyucu olarak uygulanır.

OFTALMOTRİM berrak, renksiz bir çözeltidir.

5mL’lik kendinden damlalıklı vidalı kapaklı (DROP-TAINER) şişede sunulmaktadır.

2. OFTALMOTRİM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OFTALMOTRİM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

OFTALMOTRİM'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eđer bařka bir göz ilacı kullanacaksanız, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklemelisiniz.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız

OFTALMOTRİM'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

OFTALMOTRİM göze damlatılarak kullanılır. Ürünü bařka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiđi řekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve ieceklerle bir iliřkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

OFTALMOTRİM kullandıktan sonra görüřünüzde bulanıklařma olursa bulanıklık geinceye kadar ara ya da makine kullanmayınız.

OFTALMOTRİM'in ieriđinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

OFTALMOTRİM iindeki bazı maddelerden dolayı (sodyum metil hidroksibenzoat, sodyum propil hidroksibenzoat) alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OFTALMOTRİM nasıl kullanılır?

▪ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:

OFTALMOTRİM'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediđi gibi kullanınız. Emin deđilseniz doktorunuza ve eczacınıza danıřınız.

Yetiřkinlerde normal doz, göze veya gözlere, günde dört kez, birer damladır. Gözün, görünüřte normale döndükten 48 sonrasında dek tedavisine devam edilmesi gerekir.

Sadece doktorunuz önerdiđi zaman OFTALMOTRİM'i yalnızca gözlerinize kullanınız.

Doktorunuzun önerdiđi sürece tedaviye devam ediniz.


Damla gözünüze gelmediđinde tekrar deneyiniz.

Başka göz damlası kullanıyorsanız OFTALMOTRİM'i kullanmadan en az 5 dakika bekleyiniz.


▪ **Uygulama yolu ve metodu:**



1



2



3

- OFTALMOTRİM'in şişesini ve bir ayna alınız.
- Ellerinizi yıkayınız.
- Şişenin kapağını açınız.
- Şişeyi, başparmak ve diğer parmaklarınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz.
- Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 1).
- Şişenin ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımcı olacaksa aynayı kullanınız.
- Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere deđdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.
- Her seferinde bir damla OFTALMOTRİM damlatmak için şişenin dibine hafifçe basınız.
- Şişeyi çok sıkmayınız: şişe dibine hafifçe bastırarak yetecek şekilde tasarlanmıştır (Şekil 2).
- OFTALMOTRİM'i kullandıktan sonra, bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız (Şekil 3). Bu şekilde, OFTALMOTRİM'in vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellersiniz.
- Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayı tekrarlayınız.
- Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
- Şişeyi açtıktan 1 ay sonra imha ediniz.

▪ **Deđişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı: Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle 2 ayın altındaki bebeklerde OFTALMOTRİM'in kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

▪ **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Eđer OFTALMOTRİM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OFTALMOTRİM kullandıysanız:

Eđer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak OFTALMOTRİM'i uzaklaştırabilirsiniz.

OFTALMOTRİM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OFTALMOTRİM'i kullanmayı unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutilan dozu almayı düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutilan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OFTALMOTRİM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan OFTALMOTRİM kullanımını kesmeyiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Özellikle mantar gibi duyarlı olmayan organizmaların üremesi

Bunlar OFTALMOTRİM'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. OFTALMOTRİM'in saklanması

OFTALMOTRİM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OFTALMOTRİM'i kullanmayınız. Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.

Açıldığı tarih:

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz.

Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Merkezi, No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805
Beykoz / İSTANBUL

Üretici: Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Camil Fabra, 58 08320 El Masnou Barselona / İSPANYA

Bu kullanma talimatı 01/02/2011 tarihinde onaylanmıştır.