

KULLANMA TALİMATI

ONBREZ BREEZHALER 150 mcg İnhaler Kapsül

Yutulmaz. Kutudan çıkan cihaz (ONBREZ BREEZHALER) aracılığıyla ağızdan solunarak kullanılır.

Etkin madde: Her kapsül 150 mikrogram indakaterole eşdeğer miktarda 194 mikrogram indakaterol maleat içerir. Her inhalasyonda ağızlıktan 120 mikrogram indakaterol dağılır.

Yardımcı maddeler: Kapsül dolumu: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), **Boş kapsül kabuğu:** Jelatin (sığır kaynaklı), siyah baskı mürekkebi, **Baskı mürekkebi:** Şellak (E904), siyah demir oksit (E172), n-bütül alkol, saf su, propilen glikol (E1520), susuz etanol, izopropil alkol, güçlü amonyak çözeltisi.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı doktorunuza kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ONBREZ BREEZHALER nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ONBREZ BREEZHALER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ONBREZ BREEZHALER nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ONBREZ BREEZHALER'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ONBREZ BREEZHALER nedir ve ne için kullanılır?

ONBREZ BREEZHALER, solunum yollarını genişletici (bronkodilatör) ilaç grubundandır. Etkin madde olarak indakaterol içermektedir. Bu maddeyi içinize çektiğinizde akciğerlerinizdeki küçük hava yollarının duvarlarındaki kasları gevşetir. Böylece solunum yollarınız açılır ve havanın girip çıkması kolaylaşır.

ONBREZ BREEZHALER, kronik tıkalı akciğer hastalığı (KOA) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığı nedeniyle solunum güçlüğü yaşayan yetişkinlerde kullanılmaktadır. İlaç daha kolay nefes almanızı sağlar ve KOA'nın etkilerini en aza indirir.

ONBREZ BREEZHALER 150 mikrogram kapsüller, şeffaf ve renksizdir. Kapsül gövdesindeki siyah çizginin üst kısmına siyah renkte ürün kodu "IDL 150", alt kısmına ise yine siyah renkte firma logosu (b) basılmıştır.

ONBREZ BREEZHALER, 30 ya da 60'ar kapsüllük blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Her kutunun içinde, ilacı iinize ekmenizi saėlayan cihaz (Onbrez Breezhaler) ile blisterler iinde bu cihaza yerleřtirerek kullanacaėımız, ilacı toz olarak ieren kapsüller bulunmaktadır.

Bu ilacı, sadece bu ambalajda bulunan ONBREZ BREEZHALER isimli cihaz (inhaler) ile kullanınız.

2. ONBREZ BREEZHALER’ı kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

ONBREZ BREEZHALER’ı ařaėıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eėer:

- Daha nce indakaterol, laktoz ya da bu ilacın ieriėindeki herhangi bir yardımcı maddeye karřı ya da jelatine karřı olaėan dıřı ya da alerjik bir reaksiyon verdiyseniz

Eėer bunlardan herhangi birisi sizin iin geerliyse, ONBREZ BREEZHALER kullanmadan nce doktorunuza haber veriniz.

Eėer alerjik olabileceėinizi dřünüyorsanız, doktorunuza danıřınız.

ONBREZ BREEZHALER’ı ařaėıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eėer:

- İlacı kullandıktan hemen sonra gėüste sıkıřma, ksürük, hırıltılı solunum veya nefes alma gçlüėü hissederseniz, (bronkospazm belirtileri),
- Nefes alma ya da yutkunma gçlüėü, dil, dudaklar ve yüzde řiřme, ürtiker (deri dküntüsü, kařıntı ve kurdeřen) (alerjik reaksiyon iřaretleri) yařarsanız,
- Kalple ilgili sorunuz (arpıntı, yüksek tansiyon, damar tıkanıklıėı) varsa,
- Epilepsiniz (sara) varsa,
- Tiroid bezi probleminiz varsa (tirotoksikozis),
- Kan potasyum düzeyiniz dřük ise,
- Diyabetiniz (řeker hastalıėı) varsa,
- Akciėer hastalıėınız iin benzer ilalar kullanıyorsanız (bkz. Bölüm ‘Diėer ilalar ile birlikte kullanılması’),
- Astım hastası iseniz (bu durumda ONBREZ BREEZHALER kullanmamalısınız).

Uzun etkili beta agonist preparatlarına baėlı olarak nadiren, ciddi ve bazen lmcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

ONBREZ BREEZHALER astım hastalıėının tedavisi iin nerilmez.

İnhale kortikosteroidlere ek olarak uzun etkili beta agonist kullanan pediyatrik ve adlesan hastalarda, her iki ilaca uyumu garanti altına almak iin, hem inhale kortikosteroid hem de uzun etkili beta agonist ieren bir kombinasyon preparatı kullanılması nerilir.

KOAH semptomlarınız (nefes darlıėı, hırıltı, ksürük) dzelmezse veya ktüleřirse **derhal doktorunuza bildiriniz.**

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

ONBREZ BREEZHALER’ın yiyecek ve iecek ile kullanılması:

ONBREZ BREEZHALER’ı yiyecek ya da iecek tkretiminden nce veya sonra inhalasyon yoluyla kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ONBREZ BREEZHALER kullanmayınız. Hamile olma olasılıđınız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz nemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız. Doktorunuz ONBREZ BREEZHALER’ı kullanıp kullanamayacađınız konusunu sizinle konuřacaktır. Emzirme sırasında ONBREZ BREEZHALER tedavisi tavsiye edilmemektedir.

Ara ve makine kullanımı

ONBREZ’in ara ve makine kullanımı zerine hibir etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir bir etkisi vardır.

ONBREZ BREEZHALER’ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

ONBREZ laktoz (st řekeri) iermektedir. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı duyarlılıđınız olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Ařađıdaki ilalardan birini alıyorsanız, dozu deđiřtirmeniz ve/veya bařka nlemler almanız gerekebilir:

- ONBREZ BREEZHALER’a benzeyen, solunum problemleri iin kullanılan ilalar (yan etkilerin meydana gelme olasılıđı artabilir) (rn. salmeterol ve formoterol).
- Yksek kan basıncı ya da diđer kalp problemlerinin (rn., propranolol) ya da glokom (gz tansiyonu) olarak adlandırılan gz probleminin tedavisinde kullanılan ve beta blokrler olarak adlandırılan ilalar (rn. timolol ieren gz damlaları),
- Depresyon tedavisi iin ila kullanıyorsanız (rn. trisiklik antidepressanlar, monoamin oksidaz inhibitrleri)
- Akciđer hastalıđınız iin kullanılan ONBREZ BREEZHALER ile aynı sınıftan ilalar (bunların kullanılması olası yan etkilerin riskini artırabilir).
- Kanda potasyum dzeyini dřren ilalar. Bunlar ařađıdakileri kapsamaktadır:
 - steroidler (yaygın olarak bilinen adıyla kortizonlar rn. prednizolon)
 - yksek kan basıncının tedavisinde kullanılan hidroklorotiyazid gibi diretikler (‘idrar sktrcler’ olarak da bilinir),
 - teofilin gibi solunum problemlerinde kullanılan ilalar

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ONBREZ BREEZHALER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan doz her gün bir kapsül içeriğinin inhale edilmesidir (1 kapsül = 1 inhalasyon). Doktorunuz, durumunuza ve ilaca nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak tedaviniz için 150 mikrogram ya da 300 mikrogram kapsülü kullanacağınızı söyleyecektir. Doktorunuzun söylediğinden daha fazla ilaç kullanmayınız.

İnhalasyon cihazınızın etkisi 24 saat süreceğinden her gün aynı saatte kullanın. Bu uygulama, vücudunuzda gündüz ve gece boyunca daha kolay nefes almanıza yardımcı olacak yeterli miktarda ilacın mevcut olmasını sağlayacaktır. Ayrıca ilacı kullanmayı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Bu kutuda bir inhalasyon cihazı ve inhalasyon tozu formunda ilaç içeren kapsüller (blisterler içinde) bulacaksınız. İnhalasyon cihazı Onbrez Breezhaler, kapsül içinde bulunan ilacı inhale etmenizi (içinize çekmenizi) sağlamaktadır.

Kapsülleri sadece bu kutu içinde bulunan inhalasyon cihazı ile birlikte kullanın (Onbrez Breezhaler). Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazını başka bir kapsül ilacı almak için kullanmayın. Kapsüllerin kullanılacağı zamana kadar blisterin içinde kalması gerekmektedir.

Yeni bir kutuya başladığınızda, kutu içinde bulunan yeni inhalasyon cihazı Onbrez Breezhaler'ı kullanın. Her yeni kutu içinde bir inhalasyon cihazı yer aldığından kutu içindeki kapsüller bittiğinde o kutunun içinden çıkan cihazı atınız. ONBREZ BREEZHALER kapsüllerini yutmayınız.

ONBREZ BREEZHALER'ı her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanma talimatının 'ONBREZ BREEZHALER İnhaler Kapsüllerinin Kullanımına İlişkin Talimatlar' bölümü, ONBREZ BREEZHALER'ı nasıl kullanacağınızı ve inhalelerin bakımını açıklamaktadır. Lütfen dikkatli okuyunuz ve bu talimata uyunuz.

Sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde ONBREZ BREEZHALER kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği :

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda ve böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ONBREZ BREEZHALER kullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ONBREZ BREEZHALER ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız. KOAH uzun vadeli bir hastalıktır ve ONBREZ BREEZHALER'ı yalnızca solunum problemlerinizi olduğunda ya da KOAH'ın diğer semptomları ortaya çıktığında değil, her gün kullanmanız gerekmektedir.

Eğer ONBREZ BREEZHALER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemiş varsanız ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ONBREZ BREEZHALER kullandıysanız:

ONBREZ BREEZHALER'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir başkası sizin ilacınızı kullanmışsa, hemen doktorunuza bildirin ve/veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. ONBREZ BREEZHALER paketini gösteriniz. Tıbbi müdahale gerekebilir. Kalbinizin normalden daha hızlı attığını fark edebilirsiniz veya baş ağrınız olabilir, uykulu hissedebilirsiniz, mide bulantısı hissedebilirsiniz veya kusmanız gerekebilir.

ONBREZ BREEZHALER'ı kullanmayı unutursanız:

ONBREZ BREEZHALER'ı her gün aynı saatte inhale etmeniz, gündüz ve gece boyunca hastalık belirtilerinin en aza inmesine yardımcı olacaktır. İlacı kullanmayı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır. Eğer ONBREZ BREEZHALER'ı almayı unutursanız bu dozu, bir sonraki olağan saatte alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ONBREZ BREEZHALER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ONBREZ BREEZHALER ile tedavinizi durdurmak hastalığınızın kötüleşmesine neden olabilir. Doktorunuz size söylemedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ONBREZ BREEZHALER'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen	:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ONBREZ BREEZHALER'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin ve/veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Ezici göğüs ağrınız varsa (yaygın).
- Kanınızda şeker düzeyi yükselirse (diyabet). Yorgun, çok susamış ve aç (kilo almadan) hissederseniz ve normalden daha fazla idrar yaparsınız (yaygın olmayan).
- Düzensiz kalp atışınız varsa (yaygın olmayan).
- Döküntü, kaşıntı, kurdeşen, nefes alma veya yutma güçlüğü, baş dönmesi gibi alerjik reaksiyon belirtileri yaşarsanız (yaygın olmayan).
- Hırıltı veya öksürüğün eşlik ettiği nefes alma güçlüğü çekerseniz (yaygın olmayan).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Yaygın:

- Üst solunum yolu enfeksiyonları boğaz ağrısına yol açabilecek gırtlak tahrişi
- Ateş ile birlikte veya ateş olmadan baş ağrısı,
- Baş dönmesi,
- Yanaklarda ya da alında basınç ya da ağrı hissi (sinüslerde iltihap),
- Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma,
- Öksürük,
- Boğaz ağrısı,
- Kas spazmı,
- Eller, ayak bilekleri ya da ayaklarda şişme (ödem),
- Göğüste rahatsızlık hissi (kalple bağlantılı olmayan),
- Çarpıntı.

Yaygın olmayan:

- Nefes alma ya da yutkunma güçlüğü, dil, dudaklar ve yüzde şişme, ürtiker, deri döküntüsü gibi aşırı duyarlılık reaksiyonu işaretleri,
- Hırıltı ve öksürük ile birlikte nefes alma güçlüğü gibi paradoksal bronkospazm belirtileri,
- Düzensiz kalp atışı,
- Baskı tarzında göğüs ağrısı (kalp problemleri),
- Kaslarda, kemiklerde ya da eklemlerde ağrı (kas-iskelet ağrısı),
- Kaslarda ağrı (miyalji),
- Kaşıntı/döküntü,
- Karıncalanma ya da uyuşma-,
- Bronşitte olduğu gibi solunum güçlüğü,
- Aşırı susama, normalden daha fazla idrara çıkma, kilo kaybı ile seyreden iştah artışı, yorgunluk, yüksek kan şekeri düzeyi (bunlar diyabet isimli hastalığın belirtileridir).

Bazı hastalarda nadiren ilacı inhale ettikten kısa bir süre sonra öksürük gözlenir. Öksürük KOAH'ta gözlenen yaygın bir şikayettir. Eğer ilaç inhalasyonundan kısa süre sonra öksürürseniz endişelenmeyin. Kapsülün boş olup olmadığını ve tam doz alıp almadığınızı görmek için inhalasyon cihazını kontrol edin. Eğer kapsül boşsa endişelenmenize gerek yoktur, tam dozu almış bulunmaktasınız. Eğer kapsül boş değilse, talimatlara uygun olarak yeniden inhalasyon yapın.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

5. ONBREZ BREEZHALER'in saklanması

ONBREZ BREEZHALER'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ONBREZ BREEZHALER, 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Nemden korumak için orijinal ambalajı içinde saklayın ve yalnızca kullanımdan hemen önce çıkarın.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanım tarihinden sonra ONBREZ BREEZHALER'i kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ONBREZ BREEZHALER'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kavacık/Beykoz/İstanbul

Üretim yeri: Novartis Pharma Stein AG,
Schauffhauserstrasse 4332, Stein, İsviçre

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

ONBREZ BREEZHALER İNHALER KAPSÜLLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN TALİMATLAR

Kullanma talimatının bu bölümünde, ONBREZ BREEZHALER’ı nasıl kullanacağınız ve cihaz bakımı konusunda bilgi verilmektedir. Lütfen dikkatlice okuyunuz ve talimatları takip ediniz.


- **Yalnızca bu kutu içinde bulunan Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazını kullanın.** ONBREZ BREEZHALER kapsüllerini başka bir inhalasyon cihazı ile birlikte kullanmayın ya da Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazını başka bir kapsül ilacı almak için kullanmayın.
- Yeni bir kutuya başladığınızda, paket içinde bulunan yeni Onbrez Breezhaler’ı kullanın.
- Her yeni kutu içinde bir inhalasyon cihazı yer aldığından kutu içindeki kapsüller bittiğinde o kutunun içinden çıkan cihazı atınız.
- **Kapsülleri yutmayın.** Kapsüllerin içinde bulunan toz, inhalasyon yoluyla almanız içindir.

ONBREZ BREEZHALER paketi:

Her bir ONBREZ BREEZHALER paketi şunları içermektedir:


- bir Breezhaler inhalasyon cihazı
- inhalasyon cihazında kullanılacak ONBREZ BREEZHALER kapsülleri içeren bir ya da daha fazla blister şerit

Breezhaler inhalasyon cihazı, ONBREZ BREEZHALER kapsüllerinin içerisinde yer alan ilacı inhalasyon yoluyla almanızı sağlamaktadır.



ONBREZ BREEZHALER inhalasyon cihazınızı nasıl kullanacaksınız?


Onbrez Breezhaler'ı kullanmadan önce lütfen Kullanma Talimatlarının tamamını okuyun.




Takın



Delin ve bırakın



Derin nefes alın




Kapsülün boş olup olmadığını kontrol edin

1


2

3

Kontrol
edin




Adım 1a:
Kapağı çekerek çıkarın




Adım 2a:
Kapsülü bir kez delin
İnhaleleri dik tutun.
Her iki yan düğmeye aynı anda sıkıca basarak kapsülü delin.




Adım 3a:
Tamamen nefes verin
İnhalelerin içine doğru üflemeymeyin.



Kapsülün boş olup olmadığını kontrol edin
Kapsülde toz kalıp kalmadığını görmek için inhaleleri açın.




Adım 1b:
İnhaleleri açın




Adım 1c:
Kapsülü çıkarın
Blisterden bir kapsül çıkarın.
Kapsülü yutmayın.

Kapsül delindiğinde bir ses duymanız gerekir.
Kapsülü yalnızca bir kez delin.



Adım 2b:
Yan düğmeleri serbest bırakın



Adım 3b:
İlacı derin bir nefesle içinize çekin

İnhaleleri resimde gösterildiği gibi tutun.


Ağızlığı ağızınıza yerleştirin ve dudaklarınızı etrafına sıkıca kapatın.

Yan düğmelere basmayın.

Olabildiğince hızlı ve derin nefes alın.

Nefesinizi çektiğiniz sırada bir vızıltı sesi duyacaksınız.

Nefes alırken ilacın tadını alabilirsiniz.



Adım 3c:
Nefesinizi tutun


Nefesinizi 5 saniyeye kadar tutun.

Kapsülde toz kalmışsa:


- İnhaleleri kapatın.
- 3a ila 3c arasındaki adımları tekrarlayın.



Toz kalmış



Boş



Boş kapsülü çıkarın

Boş kapsülü evsel atıklarınıza koyun.

İnhaleleri kapatın ve kapağı takın.



Adım 1d:
Kapsül yerleştirin
Asla doğrudan
ağızlığa bir kapsül
yerleştirmeyin.




Adım 1e:
İnhaleleri kapatın

Önemli bilgiler

- Onbrez Breezhale kapsülleri her zaman blister kartta saklanmalı ve yalnızca kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.
- Kapsülü yutmayın.
- Onbrez Breezhale kapsüllerini başka herhangi bir inhaler ile kullanmayın.
- Onbrez Breezhale inhaleri başka bir kapsül ilacı almak için kullanmayın.
- Kapsülü asla ağızınıza veya inhalerin ağızlığına yerleştirmeyin.
- Yan düğmelere birden fazla basmayın.
- Ağızlığın içine üflemeyin.
- Ağızlıktan nefes alırken yan düğmelere basmayın.
- Kapsülleri ıslak ellerle tutmayın.
- İnhalelerinizi asla suyla yıkamayın.

Onbrez Breezhale İnhale paketiniz şunları içerir:

- Bir adet Onbrez Breezhale inhaler
- Her biri inhalatörde kullanılacak 6 veya 10 Onbrez Breezhale kapsülü içeren bir veya daha fazla blister kart



Sıkça Sorulan Sorular

Teneffüs ettiğimde solunum cihazı neden ses çıkarmadı?

İnhalelerin temizlenmesi

Toz kalıntılarını gidermek için ağızlığın içini ve dışını temiz, kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin. İnhaleleri kuru tutun. Solunum cihazınızı asla suyla yıkamayın.

	<p>Kapsül, kapsül haznesine sıkışmış olabilir. Böyle bir durumda, inhalerin tabanına hafifçe vurarak kapsülü dikkatlice gevşetin. 3a ile 3c arasındaki adımları tekrarlayarak ilacı tekrar soluyun.</p> <p>Kapsülün içinde toz kalırsa ne yapmalıyım? İlacınızdan yeterince almadınız. İnhaleri kapatın ve 3a ile 3c arasındaki adımları tekrarlayın.</p> <p>Teneffüs ettikten sonra öksürdüm - bu önemli mi? Bu olabilir. Kapsül boş olduğu sürece ilacınızdan yeterince aldınız.</p> <p>Kapsülün küçük parçalarını dilimde hissettim - bu önemli mi? Bu olabilir. Zararlı değildir. Kapsül birden fazla delinirse kapsülün küçük parçalara ayrılma şansı artacaktır.</p>	<p>İnhalerin kullanımdan sonra atılması Her inhaler, tüm kapsüller kullanıldıktan sonra atılmalıdır. Eczacınıza artık gerekli olmayan ilaçları ve inhalerleri nasıl atacağımızı sorun.</p>
--	---	---

UNUTMAYIN:

- **ONBREZ BREEZHALER kapsüllerini yutmayın.**
- **Kapsülleri yalnızca bu kutu içinde bulunan Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazı ile kullanın.**
- ONBREZ BREEZHALER kapsülleri blister içinde saklanmalı ve yalnızca kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.
- Bir ONBREZ BREEZHALER kapsülünü kesinlikle doğrudan Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazının ağızlığına yerleştirmeyin.

- **Yandaki düğmelere birden fazla defa basmayın.**
- Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazının ağızlığının içine üflemeysin.
- İnhalasyondan önce yandaki düğmeleri serbest bırakın. İlacı içinize çektiğiniz sırada düğmeler basılı olmamalıdır.
- Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazını su ile yıkamayın. Cihazı kuru tutun. Bkz. “İnhalasyon cihazı nasıl temizlenir?”.
- ONBREZ Breezhaler inhalasyon cihazını parçalara ayırmayın.
- Her yeni ONBREZ BREEZHALER ilaç kutusundan çıkan yeni Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazını kullanın. Her kutu içeriği bittiğinde o kutudan çıkan cihazı atın.
- Kapsülleri Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazı içinde saklamayın.
- Onbrez Breezhaler inhalasyon cihazını ve ONBREZ BREEZHALER kapsüllerini kuru bir yerde saklayın.

İlave bilgiler:

Nadiren kapsülün küçük parçacıkları eleği geçerek ağızınıza gelebilir. Bu durumda parçacıkları dilinizin üzerinde hissedebilirsiniz. Bu parçacıkların yutulması ya da solunması zararlı değildir. Eğer kapsül birden çok kez delinirse (bkz. 6. Adım) kapsülün parçalanma şansı artacaktır.

İnhalasyon cihazı nasıl temizlenir?

İnhalasyon cihazını haftada bir kere temizleyin.

- Geriye kalan tozları uzaklaştırmak için ağızlığın içini ve dışını, temiz, kuru ve havsız bir bezle silin.
- İnhalasyon cihazını su ile yıkamayın. Kuru tutun.
- İnhalasyon cihazını parçalara ayırmayın.