

## KULLANMA TALİMATI

### ORELOX® 200 mg film tablet Ağızdan alınır

- **Etkin madde:** 1 film tablet içinde 260.90 mg sefpodoksim proksetil bulunur (200 mg sefpodoksime eşdeğerdir).
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum stearat, karboksimetil selüloz kalsiyum, hidroksiopropilmetilselüloz, sodyum lauril sülfat, laktöz monohidrat, titanyum dioksit, talk.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. ORELOX nedir ve ne için kullanılır?**
  - 2. ORELOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  - 3. ORELOX nasıl kullanılır?**
  - 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
  - 5. ORELOX'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ORELOX nedir ve ne için kullanılır?**

ORELOX sefpodoksim proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

ORELOX film tablet formundadır ve ağızdan alınır. 1 kutusu içinde 10 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

Çocuklarda kullanılmak üzere, ORELOX pediatrik 40mg/5 ml oral süspansiyon için granül formu da piyasada bulunmaktadır.

ORELOX, etkin maddeye duyarlı mikropların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Üst solunum yolu enfeksiyonları:
  - Tonsillit, farenjit (bademcik ve yutak iltihapları)
  - Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)
  - Akut otitis media (sadece çocuklarda) (orta kulak iltihabı)

- Alt solunum yolu enfeksiyonları:
  - Akut bronşit
  - Pnömoni (bir akciğer hastalığı = zatüre)
  - Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOA) alevlenmesi
- Komplike olmayan alt ve üst idrar yolları enfeksiyonları
- Komplike olmayan gonokokal üretrit (cinsel yolla geçen gonore enfeksiyonları)
- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

## **2. ORELOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **ORELOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer, sefpodoksime ya da sefalosporinlere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, ORELOX'u kullanmayınız.

### **ORELOX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
- Daha önce etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde karın ağrısıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
- Ciddi böbrek hastalığınız varsa,

ORELOX'u dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir durumda dahi olsa sizin için geçerli ise, lütfen doktorunuza danışınız.

### **ORELOX'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

ORELOX'un barsaklardan emilimini artırmak için, besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında ORELOX kullanımı tavsiye edilmemektedir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ORELOX içinde bulunan etkin madde anne sütüne geçer. Emzirme sırasında ORELOX kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

ORELOX sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmayınız.

### **ORELOX'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Özellikle aşağıdaki ilaçları birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.

- Antiasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaraların tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
- İdrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)
- Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
- Probenesid (Böbrek hasarı tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında)
- Warfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullanılır)
- Kontraseptif olarak kullanılan östrojenler

Bu ilaçlar, ORELOX tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.

ORELOX kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ORELOX nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Erişkinler için genellikle önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Bademcik iltihabı (Tonsillit): Günlük doz: 200 mg (1 filmlenme), 12 saatte bir ½ filmlenme olarak alınır.

Yutak iltihabı (Farenjit): Günlük doz 200 mg (1 filmlenme), 12 saatte bir ½ filmlenme alınır.

Akut sinüzit: Günlük doz 400 mg (2 filmlenme), 12 saatte bir 1 filmlenme alınır.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Akut bronşit: Günlük doz: 200 mg (1 filmlenme), 12 saatte bir ½ filmlenme olarak alınır.

Enfeksiyonun şiddetine göre gerekirse doz 12 saatte bir 1 filmlenme çıkarılabilir.

Bakteriyel pnömoni (zatürece = akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg (2 filmlenme), 12 saatte bir 1 filmlenme alınır.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri:

Günlük doz 400 mg (2 filmlenme), 12 saatte bir 1 filmlenme alınır.

İdrar yolları enfeksiyonları

Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonu:

Günlük doz: 200 mg (1 filmlenme), 12 saatte bir ½ filmlenme olarak alınır.

Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:

Günlük doz: 400 mg (2 filmlenme), 12 saatte bir 1 filmlenme alınır.

Komplike olmayan gonokokal üretrit:

Günlük doz: 200 mg (1 filmlenme), tek doz şeklinde alınır.

Cilt ve yumuřak doku enfeksiyonları:

Günlük doz: 400 mg (2 filmltablet), 12 saatte bir 1 filmltablet alınır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

- ORELOX ağızdan alınır.
- Filmltablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
- En iyi şekilde emilebilmesi için, filmltabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

**Deęişik yař grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda ORELOX pediatrik oral solüsyon için granül formu kullanılır. Önerilen ortalama doz ikiye bölünmüş halde 8 mg/kg/gündür. 200 mg/gün'ün üstündeki dozlarda granül formu kullanılmalıdır.

**Yařlılarda kullanımı:**

Yařlılarda böbrek yetmezlięi sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezlięi:**

Böbrek yetmezlięiniz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüőünüz.

ORELOX böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezlięi durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

**Karacięer yetmezlięi:**

Karacięer yetmezlięi durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eęer ORELOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzu veya eczacınızı ile konuőunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ORELOX kullandıysanız:**

*ORELOX' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuőunuz.*

**ORELOX'u kullanmayı unutursanız**

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**ORELOX ile tedavi sonlandırıldıęındaki oluşabilecek etkiler**

ORELOX tedavisini doktorunuza danıőmadan sonlandırmayınız. Eęer tedaviyi erken sonlandırırırsanız, enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ORELOX' un içerięinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ORELOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması
- Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması
- Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması
- Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir)
- Ateş, titreme, kas ağrısı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklar oluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermal nekroliz denir)
- Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritema multiforme denir)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ORELOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Şiddetli ve inatçı ishal
- Aşırı halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık)
- Özellikle uzun süreli kullanımda aşırı halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Bulantı, kusma,
  - Karın ağrısı,
  - Baş ağrısı,
  - Sersemlik hissi
  - Baş dönmesi,
  - Kulak çınlaması,
  - Bitkinlik,
  - Uyuşma, karıncalanma hissi
  - Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamaları
  - Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış
- Bunlar ORELOX'un hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. ORELOX'un saklanması**

*ORELOX' u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORELOX' u kullanmayınız.*

***Ruhsat Sahibi:*** Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.

No:193 Levent -İSTANBUL

Tel: (0212) 339 10 00

Faks: (0212) 357 03 46

***Üretim yeri:*** Sanofi Winthrop Industrie  
60205 Compiègne-Fransa

*Bu kullanma talimatı 24/05/2011 tarihinde onaylanmıştır.*