

## KULLANMA TALİMATI

### PARLODEL SRO 5 mg yavaş salımlı kapsül

#### Ağız yoluyla alınır

- **Etkin madde:** Her bir tablet 5 mg bromokriptine eşdeğer 5.735 mg bromokriptin mesilat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum stearat, maleik asit, koloidal silika anhidr, setil palmitat, kurutulmuş mısır nişastası, metilhidroksi propilselüloz.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PARLODEL SRO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PARLODEL SRO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PARLODEL SRO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PARLODEL SRO'nun saklanması**

#### **1. PARLODEL SRO nedir ve ne için kullanılır?**

PARLODEL SRO, 28 kapsül içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.

PARLODEL SRO, etkin madde olarak bromokriptin içerir.

Bromokriptin, beyinde sinirler arasında aracılık yapan bir madde olan dopaminin dokularda bağlandığı alıcılarından birine bağlanarak dopamine benzer aktivite gösteren bir ajandır. Aynı zamanda beyin tabanında küçük bir bez olan hipofizin ön lobundan memelerden süt salınmasını sağlayan bir hormon olan prolaktinin salgılanmasını engeller.

PARLODEL SRO aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Parkinson hastalığı (Beyinde dopamin azlığı sonucu ortaya çıkabilen ve temel belirtileri uzuvlarda titreme, kaslarda sertlik ve hareketlerin yavaşlaması olan bir sinir

sistemi hastalığı. Dopamin beyinde hareketlerin koordinasyonunda önemli rol oynayan bir maddedir.)

- Prolaktinoma (Beyinde hipofiz bezinde prolaktin hormonu (süt hormonu) salgılayan iyi huylu tümör.)
- Akromegali (Kanda büyüme hormonunun fazla olduğu bir durumdur. Çocukluk çağında iskelet kemiklerinde fazla büyüme artışına bağlı devliğe (jigantizm) ve erişkin dönemde alt çene kemiğinde büyüme, el ve ayakların boyutlarında artma ve yüz özelliklerinde genel bir kabalık ve iriliğe yol açar. PARLODEL SRO kandaki büyüme hormonunun miktarını azaltır.)
- Erkeklerde prolaktin hormonunun aşırı salgılanması [sperm sayısında azalma, cinsel istek azalması ve iktidarsızlık (impotans) ile seyrederek.]
- Adet (menstrüel siklus) bozuklukları, kadınlarda kısırlık [Hiç adet görememe (amenore), çok az adet görme (oligomenore) ve bunlara eşlik edebilen göğüslerden süt gelmesi (galaktore) durumları.]
  - Kanda prolaktin hormonu fazla veya normal olabilir.
  - Bazı ilaçlara bağlı olarak da gelişebilir.
- Kadınlarda prolaktine bağlı olmayan kısırlık
  - Yumurtalıklarda oluşan birden fazla kistlere bağlı gelişen bir durum (polikistik over sendromu)
  - Yumurtlamanın olmadığı (anovülasyon) adet dönemleri (bu durumda anti-östrojen sınıfı kadınlık hormonuna zıt etki yapan ilaçlara ek olarak)
- Gebelik sonrası göğüslerden süt gelmesinin (laktasyon) tıbbi nedenlerle durdurulması gerektiği durumlar
  - Düşük sonrası laktasyonun önlenmesi
  - Başlangıç aşamasındaki lohusalık dönemi meme iltihabı (puerperal mastit)

## 2. PARLODEL SRO'yu Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

### PARLODEL SRO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Bromokriptine veya PARLODEL SRO'nun içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı ya da migren türü baş ağrılarında kullanılan ergot alkaloidlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
- Kontrol altına alınamayan yüksek kan basıncı (hipertansiyon), gebelikte esnasında ortaya çıkan yüksek kan basıncı (eklampsi, pre-eklampsi veya gebeliğe bağlı hipertansiyon), doğum sonrası ve lohusalık dönemi içerisinde yüksek kan basıncı şikayetiniz var ise.
- Kalbi besleyen damarlarınızda (koroner damarlar) bir rahatsızlığınız veya başka kalp ve kan damarı sistemine ait ciddi bir hastalığınız var ise.

- Gemiřte ciddi psikiyatrik rahatsızlıđınız veya benzeri belirtileriniz var ise.
- Kalp kapaklarınızda herhangi bir sorununuz olduđu söylenmiřse.
- Kalbinizi etkileyen bađ dokusu artışı (fibrozis) tanınız varsa
- Mide ülseriniz veya mide kanamanız varsa
- Hamileyseniz
- Emziriyorsanız

### **PARLODEL SRO'yu ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Gemiřte mide ülseri ve kanama hikayeniz varsa veya sürekli mide ađrısı řeklinde řikayetleriniz oluyorsa.
- Özellikle Parkinson hastası iseniz ve sık sık aniden uykuya dalma gibi řikayetleriniz var ise veya günlük aktiviteleriniz yaparken dikkat eksilmeleriniz oluyorsa PARLODEL SRO dozunun azaltılması veya tedavinizin durdurulması gerekebilir.
- Özellikle uzun süre ve yüksek doz PARLODEL SRO kullandıysanız ve nefes darlıđı, genel yorgunluk ve güçsüzlük, iřtah ve kilo kaybı ile birlikte öksürük gibi řikayetleriniz varsa, bu gibi durumlar akciđerlerinizi veya kalbinizi saran zarlara ait bir bozukluđun belirtileri olabilir. Bu tür durumlar PARLODEL SRO tedavisi esnasında seyrek olarak bildirilmiřtir. Bu tür řikayetleriniz oluřtuđunda doktorunuz tedaviyi durdurmanızı söyleyebilir.
- Sırt ađrısı, bacak ve ayaklarda şiřlik, böbrek iřlevlerinde bozulmalar gibi řikayetleriniz varsa veya tedavi esnasında geliřirse dikkatle arařtırılmanız gerekir. Bu řikayetler karın zarı arkasındaki dokulardaki bir bozukluđun belirtileri olabilir. Bu tür řikayetleriniz oluřtuđunda doktorunuz tedaviyi durdurmanızı söyleyebilir.
- Eđer ařırı kumar oynama isteđiniz oluřursa, ařırı cinsel dürtü hissederseniz, zorlayıcı alışveriř yapma arzusu, ařırı yemek yeme veya engellenemeyen yemek yeme arzusu geliřirse doktorunuz ilacınızın dozunu azaltabilir veya tedaviyi durdurmanızı söyleyebilir.
- Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
- PARLODEL SRO tedavisi ile üreme yeteneđi yeniden kazanılabilir. Hamile kalmak istenmediđinde güvenilir bir dođum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
- Karaciđer rahatsızlıđınız var ise.
- PARLODEL SRO tedaviniz sırasında doktorunuz bazı tetkikleri isteyebilir:
  - Özellikle tedavinin ilk günlerinde düzenli kan basıncı kontrolü
  - Rahim ađzında "smear test" incelemesi
  - Hipofiz tümörü için kullanıyorsanız, görme sinirine olası baskı nedeniyle görme alanı testi.

- Tümör nedeniyle kullanıyorsanız, tümör boyutu ve şeklinin izlenmesi
- Akciğerlerinizi veya kalbinizi saran zarlara ait bir bozukluktan ve karın zarı arkasındaki dokulardaki bozukluklardan emin olmak için göğüs röntgeni, bazı kan tahlilleri (alyuvar çökme hızı, kanda kreatinin düzeyi vb.)
- Geçmişte akciğerinizi, böbreğinizi, sırtınızı etkileyen fibrozis (bağ dokusu artışı) tanınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

### **PARLODEL SRO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması**

PARLODEL SRO'yu daima yiyeceklerle birlikte ve bir mikrar su ile alınız.

Alkollü içeceklerle alınması PARLODEL SRO'nun yan etkilerini artırabilir. Bu nedenle tedavi esnasında alkollü içecekler kullanmayınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Doktorunuz tarafından hamileliğinize rağmen kullanmanızı gerektirecek tıbbi bir durumunuz olduğu söylenmemişse, gebelik saptanınca PARLODEL SRO tedavisini kesiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğumuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

PARLODEL SRO süt salgılanmasını engellediğinden, emziriyorsanız PARLODEL SRO kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

Özellikle tedavinizin ilk günlerinde bazen kan basıncınızda düşmeye bağlı baş dönmesi ve sonucunda dikkatiniz azalabileceğinden araç veya makine kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız.

Ayrıca PARLODEL SRO uyku hali ve aniden uykuya dalma ataklarına neden olabilir. Eğer PARLODEL SRO ile tedaviniz sırasında aşırı sersemleme, uyku hali veya aniden uykuya dalma ataklarınız oluyorsa araç veya makine kullanmamalısınız.

### **PARLODEL SRO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PARLODEL SRO içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Bunlardan birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

- Kan basıncınızı değiştirebilecek herhangi bir ilaç (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan idrar söktürücüler (diüretikler), beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve ADE inhibitörleri)
- HIV/AIDS tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri
- Ergotamin tartarat gibi migren tedavisinde kullanılan herhangi bir ergot alkaloidi tipindeki ilaçlar
- Azol grubu antifungal ilaçlar, mantar tedavisi için kullanılırlar.
- Eritromisin veya diğer makrolid antibiyotikler, enfeksiyon tedavisinde kullanılırlar.
- Fenotiyazin, butirofenonlar, tioksantenler gibi antipsikotik ilaçlar, şizofreni ve benzeri durumların tedavisinde kullanılırlar.
- Metoklopramid, domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Oktreotid (büyüme-gelişme bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PARLODEL SRO Nasıl Kullanılır?**

Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmedikçe bu talimatları takip ediniz.

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz tedaviye PARLODEL SRO 2.5 mg kapsül veya PARLODEL 2.5 mg tabletler ile başlamanızı söyleyebilir. Eğer PARLODEL SRO 5 mg kapsül ile başlamanız söylenmişse aşağıdaki talimatları takip ediniz.

Parkinson hastalığı için tedavi oluyorsanız

Tedavinize uyum sağlamanız açısından ilk hafta tercihen akşamları PARLODEL 1/2 tablet alınız. Doktorunuz tedaviye verdiği cevaba göre PARLODEL dozunu yavaş yavaş artırabilir. Tedaviye yeterli cevaba 6-8 hafta içerisinde ulaşabilirsiniz.

Hastalığınızın tedavisinde PARLODEL SRO tek başına veya başka ilaçlarla birlikte verilebilir. Günlük maksimum PARLODEL SRO dozu 2 ila 6 kapsül arasındadır.

Tedavinizde bir diğer Parkinson ilacı olan levodopa içeren bir ürün kullanıyorsanız, tedavinize PARLODEL SRO eklendiğinde doktorunuz levodopa dozunu azaltmanızı önerebilir.

Prolaktinoma için tedavi oluyorsanız

Tedaviye günde 1 defa 1 kapsül ile başlayınız. Doktorunuz kandaki prolaktin hormon düzeyinize göre PARLODEL SRO dozunu kademeli olarak artırmanızı söyleyecektir. Günlük maksimum doz 6 kapsüldür.

**Akromegali için tedavi oluyorsanız**

Tedaviye günde 1 defa 1 kapsül ile başlayınız. Doktorunuz tedaviye verdiğiniz cevaba ve olası yan etkilere göre PARLODEL SRO tedavi dozunuzu kademeli olarak 2 ila 4 kapsüle kadar artırmanızı söyleyebilir.

**Erkeklerde hiperprolaktinemi için tedavi oluyorsanız**

Tedaviye günde 1 defa 1 kapsül ile başlayınız. Doktorunuz tedaviye verdiğiniz cevaba ve olası yan etkilere göre PARLODEL SRO tedavi dozunuzu kademeli olarak 2 kapsüle kadar artırmanızı söyleyebilir.

**Adet (menstrüel siklus) bozuklukları, kadınlarda kısırlık için tedavi oluyorsanız**

Tedaviye günde 1 defa 1 kapsül ile başlayınız. Yeterli etki elde edilmezse doktorunuz PARLODEL SRO tedavi dozunuzu kademeli olarak artırmanızı söyleyebilir. Tedaviye adet bozukluklarınız düzelineye ve yumurtlama (ovülasyon) sağlanıncaya kadar devam ediniz. Gerekliğinde doktorunuz belirtilerin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için düzeldikten sonra birkaç adet dönemi daha tedaviye devam etmenizi isteyebilir.

**Laktasyonun tıbbi nedenlerle engellenmesi için tedavi oluyorsanız**

Tıbbi bir neden olmaksızın PARLODEL SRO kullanmayınız.

PARLODEL SRO 5 mg kapsül ile başlamanız söylenmişse akşam yiyeceklerle birlikte alınmak üzere 1 kapsül ile başlayınız. Daha sonra 14 gün (2 hafta) boyunca günde 1 kapsül almaya devam ediniz. Bazen tedavinizin kesilmesinden 2-3 gün sonra göğüslerinizden hafif bir süt salgısı gelebilir. Bu durumda tedavinizi aynı dozla bir hafta daha uzatmanız bunun kaybolmasını sağlayabilir.

**Başlangıç aşamasındaki lohusalık dönemi meme iltihabı (puerperal mastit) için tedavi oluyorsanız**

PARLODEL SRO 5 mg kapsül ile başlamanız söylenmişse akşam yiyeceklerle birlikte alınmak üzere 1 kapsül ile başlayınız. Daha sonra 14 gün (2 hafta) boyunca günde 1 kapsül almaya devam ediniz. Gerekliğinde doktorunuz tedavinize bir antibiyotik ekleyebilir.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

PARLODEL SRO ağız yolundan kullanım içindir. Tercihen, akşam yemeğinden sonra alınmalı ve bir miktar suyla birlikte bütün olarak yutulmalıdır.

### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuk hastalarda PARLODEL SRO'nun güvenliliği ve etkinliği sadece 7 yaş ve üzerinde çocuk ve ergenlerdeki prolaktinoma ve akromegalisi olan hastalarda belirlenmiştir. Diğer kullanım alanlarında (*Parkinson, erkeklerde hiperprolaktinemi, adet bozuklukları ve kısırlık, laktasyonun engellenmesi*) PARLODEL SRO'yu kullanmayınız.

### **Prolaktinoma:**

7 yaşından büyük çocuklarda tedaviye günde 1 defa 1 kapsül ile başlayınız. 7 ila 12 yaş çocuklarda önerilen günlük maksimum doz 1 kapsüldür. Ergenlerde (13-17 yaş) önerilen maksimum günlük doz 4 kapsüldür.

#### Akromegali:

7 yaşından büyük çocuklarda tedaviye günde 1 defa 1 kapsül tablet ile başlayınız. 7 ila 12 yaş çocuklarda önerilen günlük maksimum doz 2 kapsüldür. Ergenlerde (13-17 yaş) önerilen maksimum günlük doz 4 kapsüldür.

#### **Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:**

PARLODEL SRO dozu ve kullanımı genelde erişkinlerdeki gibidir. Ancak doktorunuz birlikte kullandığınız ilaçlar var ise veya eşlik eden başka bir hastalığınız var ise tedavinize düşük dozlarla başlamanızı söyleyecektir.

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer işlevlerinde bir bozukluğunuz var ise doktorunuz daha düşük dozlarla tedavinizi düzenleyebilir.

*Eğer PARLODEL SRO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla PARLODEL SRO kullandıysanız:**

*PARLODEL SRO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla PARLODEL SRO kullandıysanız ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir. Gözlenen belirtiler, bulantı, kusma, baş dönmesi, kan basıncında düşme, kalp atışlarının hızlanması, sersemlik, uyku hali, aşırı halsizlik ve varsanırlardır.

Doz aşımında, size ağız yolundan aktif kömür verilebilir ve eğer çok yakın zamanda almışsanız mideniz yıkanabilir.

Akut zehirlenmenin tedavisi belirtilerimize yönelik olacaktır. Kusma ve varsanırlarınız için metoklopramid içeren bir ilaç kullanmanız gerekebilir.

#### **PARLODEL SRO'yu kullanmayı unutursanız:**

Eğer PARLODEL SRO almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Unuttuğunuzu farkettiğinizde, sonraki doz saatine yaklaşırsanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **PARLODEL SRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Kullanımına birdenbire son verildiğinde, Nöroleptik Malign Sendrom denen bir tabloyu taklit eden durum oluşabilir. Genellikle antipsikotik adı verilen ilaçları alan hastalarda gözlenen çok nadir bir durumdur. Tipik belirtileri kaslarda sertlik veya katılık, zihinsel durumda değişme ve vücut ısısının aşırı yükselmesidir (hipertermi). Eğer bu belirtileri hissederseniz PARLODEL SRO kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

#### 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PARLODEL SRO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. En yaygın yan etkisi bulantıdır.

**Aşağıdakilerden biri olursa, PARLODEL SRO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Geçmeyen veya şiddetli baş ağrınız varsa
- Doğumdan sonra görmenizde herhangi bir sorunuz varsa
- Bayılma hissi, baş dönmesi veya görme bulanıklığınız varsa
- Dışkıınızda kan varsa. Bu durumda dışkıınız siyah ve katran gibi görünebilir.
- Kan veya kahve granülleri gibi görünebilen koyu partiküller kusarsanız
- Midenizde şiddetli ağrınız varsa
- Nefes almada zorluk, nefes darlığı, bacaklarda şişkinlik, göğüs veya sırt ağrınız varsa
- Eğer yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak derecede şişme bununla birlikte şiddetli kaşıntı ve kızarıklık varsa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

#### **Yaygın (10 kişide 1 den azını etkiler)**

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Sersemlik
- Kendinizi hasta hissetmek
- Bulantı
- Kabızlık
- Burun tıkanıklığı

#### **Yaygın olmayan (100 kişide 1 den azını etkiler)**

- Huzursuzluk
- Psikomotor heyecan
- Kafa karışıklığı veya varsanılar (halüsinasyon)
- İstemsiz tekrarlayan vücut hareketleri
- Ağız kuruluğu



- Kusma
- Düşmenize neden olabilecek ayaktayken baş dönmesi veya bayılma hissi (kan basıncınız düşük olabilir)
- Bacak krampları
- Kaşıntılı, kızarık veya şişmiş cilt
- Saç kaybı
- Yorgunluk

**Seyrek (1000 kişide 1 den azını etkiler)**

- Aşırı sersemlik
- Uyku bozukluğu
- Karıncalanma
- Akıl sağlığı sorunları
- İshal
- Karın ağrısı
- İdrar yapamama ve sırt ağrısı
- Kalbin anormal şekilde yavaş veya hızlı atmasını içeren düzensiz kalp atışı
- Nefes alma zorluğu, nefes darlığı, nefes alırken ağrı veya geçmeyen öksürüğe neden olabilen akciğer sorunları
- Ayak bileğinde şişme
- Görme bozukluğu, bulanık görme
- Burundan sulu akıntı
- Kulaklarda çınlama

**Çok seyrek (10,000 kişide 1 den azını etkiler)**

- Kalp kapağı bozuklukları - nefes almada zorluğa, göğüs ağrısına, güçsüzlük ve bacak ve ayak bileklerinde şişkinliğe neden olabilir.
- Gün içerisinde aşırı sersemleme veya beklenmedik şekilde uykuya dalma
- Soğuk havayla oluşan el ve ayak parmaklarında solukluk

**Diğer yan etkiler:**

Kendinize veya diğerlerine zarar verebilecek hareket uyarısı, dürtüsü veya teşebbüsüne karşı koyamama aşağıdakileri içermektedir:

- Ciddi kişisel veya ailesel sonuçlarına rağmen aşırı derecede kumar oynamak için güçlü uyarım
- Kendisine veya diğerleri yönelik değişmiş veya artmış cinsel ilgi ve davranış, örneğin artmış cinsel dürtü
- Kontrol edilemeyen alışveriş yapma ve para harcama hissi

- Aşırı yemek yeme (kısa bir zaman içerisinde büyük miktarda yiyecek yemek) veya kompulsif yemek yeme (normalden daha fazla ve açlığını giderecek miktardan daha fazla yemek yeme)

Bu davranışlardan herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz; belirtilerle başa çıkma veya azaltmanın yollarını size söyleyecektir.

Yeni doğum yaptıysanız belli bazı durumlar için daha fazla riskte olabilirsiniz. Bunlar çok seyrek fakat yüksek kan basıncı, kalp krizi, nöbet geçirme, inme veya akıl sağlığı problemlerini içerebilir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacımızı bilgilendiriniz.*

## 5. PARLODEL SRO'nun Saklanması

*PARLODEL SRO'yu çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PARLODEL SRO'yu kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:** Büyükdere Caddesi No: 237, Noramin İş Merkezi Kat: 4, 34398  
Maslak/İSTANBUL adresindeki MEDA Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti

**Üretim Yeri:** Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı...../...../.....tarihinde onaylanmıştır.