

## KULLANMA TALİMATI

**PİMAFUCİN®** deri pomadı  
Haricen uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g pomad, 20 mg pimarisin (natamisin) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Balık nefsi, decyl oleate, metil paraben (E218), propil paraben (E216), stearyl alkol, sodyum lauril sülfat, sodyum stearyl sülfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve distile su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PİMAFUCİN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PİMAFUCİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PİMAFUCİN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PİMAFUCİN®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. PİMAFUCİN® nedir ve ne için kullanılır?**

- PİMAFUCİN®, mantarların yol açtığı enfeksiyonlarda kullanılan bir antibiyotiktir.
- PİMAFUCİN®, 15 g'lık alüminyum tüplerde sunulur. Beyaz-çok açık krem renğinde, homojen pomad görünümündedir.
- PİMAFUCİN®, cilt ve tırnaklarda başta *Candida Albicans* (özellikle nemli cilt bölgelerinde enfeksiyona sebep olan bir mantar türü) olmak üzere muhtelif mantarların sebep olduğu akut ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılır.
- *Candida* ve/veya *Trichomonas vaginalis*in sebep olduğu vajina yangılarının tedavisinde tekrar enfeksiyonu önlemek için (kasık bölgesi ve perineal bölge derisine uygulanır).

### **2. PİMAFUCİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**PİMAFUCİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- PİMAFUCİN®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

### **PİMAFUCİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- PİMAFUCİN®'in antibakteriyel etkisi yoktur. Bu sebeple doktorunuz aynı zamanda mikrobik bulaşma olduğunu saptamış veya düşünüyorsa size PİMAFUCİN®'in yanısıra antibakteriyel etkili bir ilaç önerebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

**PİMAFUCİN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**  
Uygulanabilir değildir.

#### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

#### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

#### **Araç ve makine kullanımı**

PİMAFUCİN®'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

#### **PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan stearyl alkol, bölgesel deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

PİMAFUCİN® ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

#### **3. PİMAFUCİN® nasıl kullanılır?**

• **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:** PİMAFUCİN®, günde 3-4 defa hasta cilt bölgesine ince bir tabaka halinde sürülür.

Tedavi süresi, vakaya göre 1-2 hafta ile 1 ay arasında değişir. Doktorunuz PİMAFUCİN® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• **Uygulama yolu ve metodu:** Hasta cilt bölgesine ince bir tabaka halinde sürülür.

#### • **Değişik yaş grupları**

**Çocuklarda kullanımı:** Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

#### • **Özel kullanım durumları**

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

*Eğer PİMAFUCİN®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PİMAFUCİN® kullandıysanız**

*PİMAFUCİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PİMAFUCİN®'i kullanmayı unutursanız**  
*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**PİMAFUCİN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**  
Bilinmemektedir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PİMAFUCİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa PİMAFUCİN®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz**

- Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PİMAFUCİN®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz**

**Seyrek (10000 hastada 1'den fazla ve 1000 hastada 1'den az):**

- Yanma hissi,
- Tahriş.

Bunlar PİMAFUCİN®'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

#### **5. PİMAFUCİN®'in saklanması**

*PİMAFUCİN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra PİMAFUCİN®'i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Astellas Pharma Europe B.V. Hollanda lisansı ile, Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

**Üretim Yeri:** Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*