

KULLANMA TALİMATI

PİRATİL 400/240 mg efervesan tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin maddeler:** Her bir efervesan tablet 400 mg asetilsalisilik asit, 240 mg askorbik asit içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Monosodyum sitrat, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), asesülfam potasyum (E 950), aspartam (E 951), limon aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. PİRATİL nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. PİRATİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. PİRATİL nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. PİRATİL'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PİRATİL nedir ve ne için kullanılır?

Her bir PİRATİL efervesan tablet 400 mg asetilsalisilik asit, 240 mg askorbik asit içermektedir.

PİRATİL ağrı kesici (analjezik), ateş düşürücü (antipiretik) ve iltihap giderici (antiinflamatuvar) özelliklere sahiptir.

PİRATİL 10, 20 ve 30 efervesan tablet PE/Alüminyum/PET (Strip) ve karton kutu ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

16 yaş üstü ergenlerde ve yetişkinlerde hafif ve orta dereceli ani başlangıçlı (akut) ağrılarda ve ateşli durumlarda endikedir.

2. PİRATİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PİRATİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- İlacın etkin veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığı (alerjiniz) varsa,
- Salisilatlarla ve diğer steroid olmayan antiinflamatuvar karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
- Hemofili hastasıysanız veya kan pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa,
- Gebeliğin son üç ayındaysanız,
- Ciddi böbrek problemleriniz varsa,
- Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
- Kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç (antikoagülan, örneğin heparin, kumarin türevi vb.) kullanıyorsanız,
- Mide ülseriniz varsa veya geçmişte olduysa,
- Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz (kırmızı kan hücre sayısının az olmasına yol açan kalıtsal bir hastalık) varsa,
- İdranınızdaki oksalik asit seviyesi yüksekse (hiperoksalüri).

PİRATİL’i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Karaciğer problemleriniz varsa,
- Böbrek probleminiz varsa,
- Hipertansiyonunuz varsa,
- Astımı, alerjik hastalıklarınız, varsa,
- Su kaybınız varsa,

- B brek tařınız varsa,
- Hemodiyaliz hastasıysanız ve y ksek dozda askorbik asit kullanmanız gerekiyorsa,

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l tfen doktorunuza danıřınız.

PİRATİL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

PİRATİL, yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Gebeliėin son   ayında PİRATİL kullanılmamalıdır.

Gebeliėin ilk altı ayında eėer PİRATİL kullanılması gerekiyorsa, doktorunuz d řuk doz ve kısa s re ile PİRATİL tedavisi uygulayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emziriyorsanız, PİRATİL kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

Bilinen etkisi yoktur.

PİRATİL'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında  nemli bilgiler

Sodyum uyarısı

Bu tıbbi  r n her dozunda 16,66 mmol (383,23 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontroll  sodyum diyetinde olan hastalar iin g z  n nde bulundurulmalıdır.

Potasyum uyarısı

Bu tıbbi  r n her dozunda 1 mmol (39 mg)'den daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında "potasyum iermez".

Sorbitol uyarısı

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aspartam uyarısı

Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan kişiler için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PİRATİL ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

- Steroid yapıda olmayan antiromatizmal ilaçlar
- Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
- Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar örn. heparin, varfarin)
- Steroidler
- Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar)
- Ürikozürük ilaçlar (idrarla ürik asit atılımını arttıran ilaçlar)
- Şeker hastalarında kullanımında, insülin veya ağızdan kullanılan kan şekerini düşüren ilaçlarının dozunun ayarlanması gerekebilir.
- Alüminyum, magnezyum içeren antasitler (hazımsızlık için)
- Askorbik asit ile bazik ilaçların (örneğin; amfetamin), trisiklik antidepresanların birlikte kullanılması tedavi amaçlı etkiyi azaltır.
- Estrojenlerle (kadınların adet döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroid hormon)
- Vitamin B₁₂
- Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan)
- Askorbik asit etanolün vücuttan atılışını artırır.
- Varfarin (kanın pıhtı oluşturma işlevini azaltan ilaçlar)
- Vitamin C demir absorpsiyonunu artırdığından, yüksek dozda demir yüklenmesine neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PİRATİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- PİRATİL'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, Yetişkinlerde günde 4 defa 1-2 efervesan tablet yemeklerden sonra alınmalıdır.

- Önerilen doz aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

PİRATİL efervesan tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

PİRATİL, bir bardak suda eritilip bekletilmeden içilmelidir.

PİRATİL, yemeklerden sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için önerilen doz kullanılır.

Çocuklarda kullanımı:

PİRATİL, 16 yaşın altındaki çocuklarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek/karaciğer fonksiyon yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer PİRATİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PİRATİL kullandıysanız:

PİRATİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız ve kendinizi iyi hissetseniz dahi derhal tıbbi destek alınız, çünkü karaciğeriniz için ciddi zarar riski taşımaktadır.

PİRATİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.