

## KULLANMA TALİMATI

### PRENACİD % 0,25 Göz Damlası, Çözelti

Göze uygulanır.

- **Etkin madde:**

Desonid disodyum fosfat

10 ml çözelti 25 mg Desonid disodyum fosfat içerir.

- **Yardımcı Maddeler:**

Disodyum fosfat dodekahidrat, Monobazik sodyum fosfat.H<sub>2</sub>O, Sodyum sitrat, Benzalkonyum klorür ve saf su'dur.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PRENACİD nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PRENACİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PRENACİD nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PRENACİD'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. PRENACİD nedir ve ne için kullanılır?**

- PRENACİD, 10 ml'lik şişe ambalajında kullanıma hazır steril göz damlasıdır.

- Alerjik veya alerjik olmayan gözün dış inflamasyonlarının lokal tedavisinde,
- Ameliyat ve travmadan sonra oluşabilen iltihabi durumlarda kullanılır.

## **2. PRENACİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **PRENACİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea) yaralanma varsa,
- Göz içi basıncınız yüksek ise (glokom),
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea), herpes simplex isimli virüse bağlı enfeksiyonunuz varsa,
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea ve konjunktiva) virüse bağlı hastalıklar varsa,
- Gözünüzde mantar ve tüberküloz enfeksiyonları varsa,
- İlk evresi dahil (fluorescein testi +) ülserli keratit ile görülen konjunktivit (göz akının iltihabi yaralara sebep olan bir hastalığı),
- Kortikosteroidler (kortizon içeren ilaçlar) ile maskelenebilen herpetik (bir çeşit virus) ve pürulan blefarit (iltihaplı göz kapağı), akut pürulan oftalmia (ani başlayan göz iltihabı) ve pürulan konjunktivit (göz akının iltihabi hastalığı),
- Hordeolum (arpacık)
- Herpetik keratit (bir çeşit virusa bağlı kornea iltihabı)

### **PRENACİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Göz içi basıncının arttığı durumlar (glokom) varsa 15 günden fazla kullanımlarda göziçi basıncı düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Eğimli hastalarda uzun süreli kortikosteroid kullanımı göz içi basıncını artırabilir, görme bozukluklarına yol açabilir.
- Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı: 1) Katarakt oluşmasına 2) yara iyileşmesinde gecikme 3) mantar veya virüse bağlı enfeksiyon riskinde artışa yol açabilir. Gözün iltihaplı enfeksiyonlarında kortikosteroidler enfeksiyonu maskeleyebilirler.
- Bazı göz hastalıklarında uzamış kortikosteroid kullanımı gözün ön kısmında (kornea ve sklera) incelmeye yol açabilir.
- Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmadığı yada tahriş veya hassasiyet oluştuğunda PRENACİD'in kullanılmasına son verilmelidir.
- Canlı aşılarda aşılamaya yapılacaksa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **PRENACİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .*

Hamilelik sürecinde PRENACİD, ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

PRENACİD emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

PRENACİD araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir.

### **PRENACİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PRENACİD 10 ml 2 mg Benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. PRENACİD ve yumuşak kontakt lensin eş zamanlı olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve ilacı uyguladıktan sonra lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz.

PRENACİD'in, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

## Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

PRENACİD'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## 3. PRENACİD nasıl kullanılır?

### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PRENACİD'i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, her bir göze günde 3 defa 1-2 damla göze (altgözkapağı içine) damlatılması önerilir.

### Uygulama yolu ve metodu:

PRENACİD,



- Yalnız oftalmik kullanım içindir.
- Göze uygulanır.
- Şişe kapağının ortasındaki disk önce yukarıya sonra yana ve aşağıya doğru çekilerek açılır. Damlalık kapağa yerleştirilir.
- Kullanmak için emniyet kapakçığı açılır, şişe baş aşağı tutularak , damlalığın iki kenarından bastırılır.
- İlacı uygularken ambalaj ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabıncu ile dokunmayınız.
- Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.
- Şişe açıldıktan sonra 30 gün içinde kullanılmalıdır.

### Değişik yaş grupları:

#### Çocuklarda Kullanımı:

Pediyatrik yaş grubunda, PRENACİD gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek / Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

*Eğer PRENACİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PRENACİD kullandıysanız:**

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

*PRENACİD'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PRENACİD'i kullanmayı unutursanız**

Eğer PRENACİD'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**PRENACİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuz reçete ettiği sürece PRENACİD kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PRENACİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :**

- Gözde yanma
- Gözde batma

Bunlar PRENACİD'in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. PRENACİD'in Saklanması**

*PRENACİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Şişe açıldıktan sonra 30 gün içinde kullanılmalıdır.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRENACİD'i kullanmayınız.*

Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRENACİD'i kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi:***

SIFI İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Cad.  
Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8C, İç Kapı No:79  
Ümraniye, İstanbul  
Tel: 0216 540 43 59  
Faks: 0216 771 20 95

***Üretim Yeri:***

SIFI S.P.A.  
Via Ercole Patti 36, 95025  
Aci S.Antonio  
Katanya-İTALYA  
Tel: 0039 095 792 21 11

*Bu kullanma talimatı 03.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.*