

KULLANMA TALİMATI

PROVIRON® 25 mg tablet
Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 25 mg mesterolon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz, mısır nişastası, povidon (PVP 25000), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PROVIRON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROVIRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROVIRON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROVIRON'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PROVIRON nedir ve ne için kullanılır?

- Her tablet etkin madde olarak, 25 mg mesterolon içerir. Mesterolon, erkeklik hormonu olan androjenler grubuna aittir.
- PROVIRON ambalajında 20 tablet bulunur. Tabletler beyaz renkte olup, tek tarafı çentiklidir.
- PROVIRON, orta ve ileri yaşta görülen erkeklik hormonu eksikliğine bağlı şikayetlerde, cinsel güç bozukluklarında, erkeklik hormonu azlığında, sperm sayısı azlığında kullanılır.

2. PROVIRON 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROVIRON 'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Prostat kanserinizi varsa,
- Mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörünüz varsa,
- İlacın içindeki etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

PROVIRON'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

PROVIRON sađlıklı kiřilerde kas yapımını veya bedensel iřgücünü arttırmak amacıyla uygulanmamalıdır.

PROVIRON uygulanması esnasında düzenli prostat muayeneleri önerilir.

PROVIRON'un ierdiđine benzer hormonal maddelerin kullanımını sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi karın ii kanamalara sebep olabilecek karaciđer tümörleri gözlemlenmiřtir. řiddetli üst karın ađrısı, karaciđer büyüklüđu veya karın ii kanama belirtileri (karında renk deđiřikliđi, řiřlik) söz konusu olduđunda hemen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

PROVIRON sadece erkekler iindir. Kadınlarda kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımını üzerine etkisi yoktur.

PROVIRON'un ieriđinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her tablet 60,5 mg laktoz ierir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Diđer ilalar ile birlikte kullanım

PROVIRON'un diđer ilalar ile birlikte kullanım üzerine etkisi yoktur.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PROVIRON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka:

- Orta ve ileri yařtaki erkeklik hormonu eksikliđine bađlı řikayetler ve cinsel gü bozukluklarında bařlangıta günde 3 defa 1 tablet kullanılır. Tedaviye günde 1-2 defa 1 tablet ile devam edilebilir.
- Erkeklik hormonu azlıđında sürekli tedavi gerekir. Günde 3 defa 1-2 tablet birkaç ay boyunca kullanılır. Daha sonra tedaviye günde 2-3 defa 1 tablet ile devam edilir.
- Sperm sayısını ve kalitesini arttırmak iin 90 gün boyunca günde 2-3 defa 1 tablet kullanılır. Eđer gerekirse birkaç hafta aradan sonra tekrarlanabilir.
- Postpubertal leyding hücre yetmezliđinde birkaç ay boyunca günde 2 defa 1 tablet PROVIRON uygulanır.

Doktorunuz PROVIRON ile tedavinizin ne kadar süreceđini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler iđnenmeden ve bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

Eđer PROVIRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROVIRON kullandıysanız:

Tedavisi için gereken dozun, uygunsuz olarak birçok defa alınmasını takiben bile herhangi bir zehirlenme riski beklenmemektedir.

PROVIRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PROVIRON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROVIRON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Sık ve uzun süreli sertleşme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PROVIRON'un saklanması

PROVIRON 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra PROVIRON'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz PROVIRON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad . No:53
34770 Ümraniye – İSTANBUL
Tel : 0216 528 36 00
Faks : 0216 645 39 50

Üretim yeri: Bayer Weimar GmbH und. Co. KG, Weimar/Almanya

Bu kullanma talimatı 28.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.