

## KULLANMA TALİMATI

**REFRESH TEARS** lubrikant göz damlası  
Göze damlatılır.

**Etkin Madde:** Sodyum karboksimetilselüloz.

**Yardımcı Maddeler:** Oksikloro kompleks (Purite®), borik asit, sodyum borat dekahidrat, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum klorür heksahidrat, sodyum hidroksit ve saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında :**

1. **REFRESH TEARS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **REFRESH TEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **REFRESH TEARS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **REFRESH TEARS'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. REFRESH TEARS nedir ve ne için kullanılır?**

REFRESH TEARS, 15 ml'lik LDPE (düşük dansiteli polietilen) şişelerde kullanıma sunulan bir göz damlasıdır, etkin madde olarak sodyum karboksimetilselüloz içermektedir.

REFRESH TEARS'ın etki mekanizması tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır.

REFRESH TEARS, kuru göz sendromu (keratokonjunktivitis sicca) ve göz yaşı azlığının bulunduğu durumlarda kullanılır.

### **2. REFRESH TEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**REFRESH TEARS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise ve bebeklerle 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

## **REFRESH TEARS'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Gözde ağrı, görmede deđişiklik, kızarıklığın ve tahriřin devam etmesi durumunda ya da durum kötüleşirse veya 72 saatten uzun sürerse, ilacın kullanımı kesip doktorunuza başvurunuz. Solüsyonun rengi deđişir ya da bulanıklaşırsa kullanılmayınız.

Bir başka oküler ilacın birlikte kullanılması durumunda, söz konusu ilaç REFRESH TEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır.

Harici kullanım içindir. Bulařmayı önlemek için damlalığın ucunu herhangi bir yüzeye deđdirilmeyiniz. Kullandıktan sonra řiřenin kapađını kapatınız.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **REFRESH TEARS'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

REFRESH TEARS'ın yiyecek ve iecekler ile etkileřmesi beklenmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı deđerlendirilerek karar verilmelidir.

*Tedavi sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı deđerlendirilerek karar verilmelidir.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makine kullanımı**

Diđer göze uygulanan ilaçlarda olduđu gibi, REFRESH TEARS damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

### **REFRESH TEARS'ın içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

REFRESH TEARS'ın bileřiminde dozu veya uygulama yolu nedeniyle özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

### **Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bir başka oküler ilacın birlikte kullanılması durumunda, söz konusu ilaç REFRESH TEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır


*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. REFRESH TEARS nasıl kullanılır ?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, etkilenen göze gerektiğinde veya günde 4 kez 1 ya da 2 damla uygulanır. Her tip kontakt lens ile birlikte kullanılabilir. Şişe açıldıktan sonra, 4 hafta içinde kullanılmalıdır. Her kullanımdan sonra kapağı kapatılmalıdır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**



1. İlacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.
3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.  
Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Bebeklerde ve 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

##### **Özel kullanım durumları :**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği :**

Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

*Eğer REFRESH TEARS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorumuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla REFRESH TEARS kullandıysanız**

*REFRESH TEARS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **REFRESH TEARS'ı kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **REFRESH TEARS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

REFRESH TEARS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır

### **4. Olası yan etkiler nelerdir ?**

Tüm ilaçlar gibi REFRESH TEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir
Yaygın:	100 hastanın 1'i ile 10'u arasındaki kişide görülebilir
Yaygın olmayan:	1.000 hastanın 1'i ile 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Seyrek:	10.000 hastanın 1'i ile 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir
Sıklığı bilinmeyen:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

#### **Yaygın yan etkiler:**

- Gözde tahriş
- Yanma ve rahatsızlık
- Görme bozukluğu

#### **Yaygın olmayan yan etkiler:**

- Gözde kızarıklık
- Göz bölgesinde şişme
- Gözde ağrı
- Yabancı cisim varmış hissi
- Bulanık görme
- Gözde akıntı
- Gözde kaşıntı
- Göz kapağında kızarıklık

#### **Pazarlama sonrası deneyimler**

**Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:** Gözde kızarıklık, gözde şişme belirtileri ile birlikte göz alerjisi dahil aşırı duyarlılık, göz kapağında ödem veya göz kapağında kızarıklık

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorumuzu veya eczacımızı bilgilendiriniz.*

## **5. REFRESH TEARS'ın saklanması**

*REFRESH TEARS'ı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.  
Şişe açıldıktan sonra, 4 hafta içinde kullanılmalıdır.  
Her kullanımdan sonra kapađı kapatılmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REFRESH TEARS'ı kullanmayınız.*

### ***Ruhsat sahibi:***

Allergan İlaçları Ticaret A.Ş.  
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Kat: 12  
Maslak-Şişli, 34398 İSTANBUL  
0212 365 50 00  
0212 290 72 11

### ***Üretim yeri:***

Allergan Sales LLC  
Waco, Texas/ABD

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*