

## KULLANMA TALİMATI

### **ROBİSİD 500 mg film tablet**

**Ağızdan alınır.**

**Etkin madde:** Bir film kaplı tablet 500 mg Sodyum fusidat içerir.

**Yardımcı maddeler:** DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, krospovidon, talk, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksi propilmetilselüloz E5, titanyum dioksit, talk.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***ROBİSİD nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***ROBİSİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***ROBİSİD nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***ROBİSİD'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ROBİSİD nedir ve ne için kullanılır?**

ROBİSİD, 15, 21 veya 30 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulan bir antibiyotiktir.

ROBİSİD, etkin madde olarak sodyum fusidat içerir. Sodyum fusidat, bakterilerin çoğalmasını önleyici veya öldürücü etki gösterir.

ROBİSİD, ateş ve titremeye neden enfeksiyonların, akciğer iltihabı, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, antibiyotik kullanımına bağlı ishal gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

## **2. ROBİSİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **ROBİSİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer etkin maddeye yada yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

### **ROBİSİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa
- Sarılık iseniz dikkatli kullanınız.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

### **ROBİSİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

ROBİSİD’in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ROBİSİD, hamilelik döneminde, bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ROBİSİD, emzirme döneminde anne sütüne çok az miktarda geçtiğinden zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

ROBİSİD’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

### **ROBİSİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 10 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Fusidik asitin:

- Kaslarda güçsüzlük, ağrıya ve nadiren iskelet kası hastalığına (rabdomyoliz) yol açabileceğinden kan kolesterolünü düşüren statin grubu ilaçlar ile,
- Linkomisin, rifampisin gibi antibiyotikler ile,
- AIDS tedavisinde ve korunmasında kullanılan çeşitli ilaçlar ile,
- Kanı sulandıran ilaçlar ile,
- Bağışıklık sistemine etki eden siklosporin adlı ilaç ile

birlikte kullanımı önerilmez.

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ROBİSİD nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkinlerde normal doz, günde üç kez bir tablettir. 8 saatte bir kullanılır.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yutulmalıdır.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek kullanılmalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

#### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

*Eğer ROBİSİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

## **Kullanmanız gerekenden daha fazla ROBİSİD kullandıysanız**

*ROBİSİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **ROBİSİD'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **ROBİSİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Uzun süreli ROBİSİD kullanımında sarılık görülebilir, tedavi sonlandırıldığında düzelir.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ROBİSİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Cildinizde veya gözünüzün akında sarılık
- Vücudunuzda çürük veya sebepsiz kanamalar
- Yutma güçlüğü, ciddi döküntü ve yüz-boyun şişmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Hafif mide-bağırsak şikayetleri, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, hazımsızlık.
- Tekrarlayan ağız aftları, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyonlar
- Hafif alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık,
- Baş ağrısı, baş dönmesi
- Bulanık görme

Bunlar ROBİSİD'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. ROBİSİD'in Saklanması**

*ROBİSİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ROBİSİD'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ROBİSİD'i kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi :***

Abdica İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Kore Şehitleri Cad. No:19  
Zincirlikuyu/İstanbul

***Üretim yeri :***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sanayi Mah.Tunç Cad. No : 3  
Esenyurt / İstanbul

*Bu kullanma talimatı " tarihinde onaylanmıştır.*