

KULLANMA TALİMATI

SAFLUTAN 15 mikrogram/ml tek dozluk göz damlası

Göze uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her ml'si 15 mikrogram tafluprost içerir. Tek dozluk damlalık (0.3ml) 4.5 mikrogram tafluprost içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserol, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum edetat, polisorbata 80, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. **SAFLUTAN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SAFLUTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SAFLUTAN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SAFLUTAN'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SAFLUTAN nedir ve ne için kullanılır?

SAFLUTAN göz damlası prostaglandin analogları olarak bilinen bir ilaç sınıfına üye olan tafluprost adlı bir madde içerir. SAFLUTAN göz içi basıncını düşürmek için kullanılır. Göz içi basıncı çok yüksek olduğunda kullanılır. SAFLUTAN açık açılı glokom (gözün ön bölümündeki sıvı akımının çok yavaşlamasına bağlı olarak göz tansiyonunun yükselmesi) adı verilen bir glokom tipini ve aynı zamanda göz hipertansiyonu olarak bilinen bir bozukluğu tedavi etmek için 18 yaş ve üzerindeki yetişkin hastalarda kullanılır. Her iki bozukluk göz içi basıncınızda artışla ilişkilidir ve sonunda görme fonksiyonunuzu etkileyebilirler.

SAFLUTAN, tek dozluk (0.3 ml) plastik ambalajlarda bulunan, berrak, renksiz bir çözeltilidir. Bir folyoda 10 tek dozluk damlalık bulunur. SAFLUTAN 30 veya 90 adet tek dozluk damlalık içeren ambalajlarda sunulur. Tüm ambalaj büyüklükleri pazara sunulmayabilir.

2. SAFLUTAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SAFLUTAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Tafluprosta veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

SAFLUTAN'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ,

SAFLUTAN'ın ařađıdaki etkilere yol aabildiđini ve bunlardan bazılarının kalıcı olabileceđini **lütfen unutmayınız:**

- SAFLUTAN kirpiklerinizin uzamasına, kalınlaşmasına, renginin deđişmesine ve/veya sayısının artmasına neden olabilir ve göz kapaklarınızda sıra dıřı tüylenmeye yol aabilir.
- SAFLUTAN gözlerinizin etrafındaki derinin renginde koyulařmaya neden olabilir. Çözeltinin fazlasını derinizden silerek uzaklařtırınız. Böylelikle deride kararma riskini azaltabilirsiniz.
- SAFLUTAN iris (gözünüz renkli kısmı) renginizi deđiřtirebilir. Eđer SAFLUTAN sadece bir göze uygulanırsa, tedavi edilen gözün rengi diđer gözden kalıcı olarak farklı hale gelebilir.
- SAFLUTAN cilt yüzeyi ile defalarca temas ettiđi bölgelerdeki tüylerde uzama, kalınlaşma ve sayılarında artma potansiyeli vardır.
- Böbrek sorunlarınız var ise,
- Karaciđer sorunlarınız var ise,
- Astımınız var ise,
- Bařka göz hastalıklarınız var ise.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerli ise lütfen doktorunuza danıřın.

SAFLUTAN'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

Kullanım yolu göze uygulama olduđundan yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Gebe kalma olasılıđınız varsa, SAFLUTAN tedavisi sırasında etkili bir dođum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir. Gebe iseniz SAFLUTAN'ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emziriyorsanız SAFLUTAN kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

SAFLUTAN ara ve makine kullanma becerisi üzerinde hiçbir etki göstermez. SAFLUTAN'ı gözünüze damlattıktan hemen sonra bir süre için etrafı bulanık gördüğünüzü fark edebilirsiniz. Görmeniz netleşinceye kadar herhangi bir ara veya makine kullanmayınız.

SAFLUTAN'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SAFLUTAN'ın ieriđinde bulunan yardımcı maddelerden hibiri için uygulama yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Bařka göz damlaları kullanıyorsanız, SAFLUTAN ve diđer göz damlaları, aralarında en az 5 dakikalık bir süre olacak řekilde uygulayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.SAFLUTAN nasıl kullanılır?

SAFLUTAN'ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.
Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz etkilenen göze/gözlere günde bir kez, akşamları 1 damla SAFLUTAN'dır. Doktorunuzun size söylediği miktarda damladan daha fazlasını gözünüze damlatmayınız veya ilacı söylenenden daha sık kullanmayınız. Bu tip uygulama SAFLUTAN'ın daha az etkili olmasına yol açabilir.

SAFLUTAN'ı her iki gözünüze sadece doktorunuz size böyle yapmanızı söylediye damlatınız.

Sadece göz damlası olarak kullanım içindir. İlacı ağızdan almayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Göze uygulanır.

Yeni bir folyoyu açmadan önce:


Folyo zarar görmüşse tek dozluk damlalıkları kullanmayınız. Folyoyu kesikli çizgi hizasından açınız. Folyoyu açtığınız tarihi folyonun üzerinde tarih yazmak için boş bırakılan yere yazınız.

SAFLUTAN'ı her kullandığımızda:

1. Ellerinizi yıkayınız.
2. Folyodan damlalık demetini çıkarınız.
3. Demetten bir tane tek dozluk damlalığı ayırınız.
4. Geri kalan demeti tekrar folyoya koyunuz ve folyoyu kapatmak için kenarından katlayınız.
5. Çözeltilinin tek dozluk damlalığının alt kısmında bulunduğundan emin olunuz.



6. Damlalığı açmak için uç kısmını bükerek koparınız.



7. Başınızı arkaya eğiniz.
8. Damlalığın ucunu gözünüze yaklaştırınız.



9. Alt göz kapağınızı aşağı çekip yukarı bakınız.
10. Damlalığı hafifçe sıkıp bir damlanın alt göz kapağınız ile gözünüz arasında düşmesini sağlayınız.



11. Bir an için gözünüzü kapatınız ve gözünüzün iç tarafına parmağınızla yaklaşık bir dakika bastırınız. Bu, göz damlasının gözyaşı kanalından dışarı akmasını önleyecektir.
12. Gözünüzün etrafındaki fazla çözeltiyi silerek uzaklaştırınız.



Damlayı gözünüze isabet ettiremezseniz, tekrar deneyiniz.

Doktorunuz size ilacı her iki gözünüze damlatmanızı söylediye, 7'den 12'ye kadarki basamakları diğer gözünüzde tekrarlayınız.

Tek dozluk damlalıktaki ilaç miktarı her iki gözünüz için yeterlidir. Açılmış damlalığın içinde kalan artık çözeltiyi kullanımdan hemen sonra atınız.

Gözünüze başka ilaçlar uyguluyorsanız, SAFLUTAN ile diğer ilacı uygulama zamanları arasında en az 5 dakika olmasına dikkat ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Güvenlilik ve etkililik verileri bulunmadığından, 18 yaşından küçük çocuklarda ve ergenlerde SAFLUTAN kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Geçmişte veya mevcut durumda böbrek ve karaciğer problemlerinizi varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer SAFLUTAN'ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SAFLUTAN kullandıysanız:

SAFLUTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Size herhangi bir zarar vermeyecektir. Sonraki dozu almanız gereken normal zamanda damlatınız.

İlaç yanlışlıkla yutulursa, lütfen tavsiye için bir hekime başvurunuz.

SAFLUTAN'ı kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız mümkün olan en kısa sürede damlatınız ve düzenli dozaj takviminize geri dönün.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

SAFLUTAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan SAFLUTAN kullanmayı bırakmayınız. SAFLUTAN'ı kullanmayı bırakırsanız, göz içi basıncınız tekrar yükselecektir. Bu, gözünüzde kalıcı hasara yol açabilir. Eğer ilaç ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SAFLUTAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :	10,000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

- Baş ağrısı
- Gözde kaşıntı
- Göz tahrişi
- Göz ağrısı
- Göz kızarıklığı
- Kirpik uzunluğunda, kalınlığında ve sayısında değişiklikler
- Göz kuruluğu
- Gözde yabancı madde hissi
- Kirpiklerde renk değişikliği
- Göz kapaklarında kızarıklık
- Göz yüzeyinde küçük leke tarzında iltihaplanma bölgeleri
- Işığa karşı hassasiyet
- Göz yaşarmasında artış
- Bulanık görme
- Gözün detayları görme becerisinde azalma

- İris (gözün renkli kısmı) renginde deęişiklik (kalıcı olabilir)

Yaygın olmayan

- Gözlerin etrafındaki derinin renginde deęişiklik
- Göz kapaklarında şişlik
- Gözlerde yorgunluk
- Göz yüzeyindeki zarlarda şişme
- Gözde akıntı
- Göz kapaklarında iltihaplanma
- Göz içinde iltihaplanma belirtileri
- Gözde rahatsızlık hissi
- Göz yüzeyinde zarlarda pigmentasyon (renk deęişikliği)
- Göz yüzeyinde zarlarda foliküller (kabarcıklar)
- Alerjik enflamasyon (iltihaplanma)
- Gözde anormal his
- Ön kamarada flare (görme bozukluęuna yol açan yüzen cisimler)
- Göz kapaklarında sıra dıőı tüylenme

Çok seyrek

- Kornea üzerinde bulanık parçalar (gözlerinin saydam tabakasında (kornea) ileri derece hasar olan hastalarda tedavi sırasında kalsiyum oluşması sebebi ile)

Bilinmiyor

- İris/üveit (gözün orta tabakası) iltihaplanması
- Gözlerde çöküklük
- Makula ödemi (görme azalmasına neden olacak şekilde gözün retina tabakasında şişme)
- Astımın kötüleşmesi
- Nefes darlığı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eęer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.SAFLUTAN'ın saklanması

SAFLUTAN'ı çocukların göremeyeceęi, erişemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılmamış folyo ambalajları 2°C – 8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız.

Açılmış bir folyonun içerisindeki kullanılmamış damlalıkların folyo ilk kez açıldıktan 28 gün sonra atılması gerektiğinden, göz damlalarını kullanmaya başlayıncaya kadar folyoyu açmayınız.

Renk deęişiklięi olması veya içinde yabancı maddeler bulunması durumunda ürünü kullanmayınız.

Folyo ambalaj açtıktan sonra:

- Tek dozluk damlalıkları orijinal folyo ambalajda saklayınız.
- 25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
- Kullanılmamış tek dozluk damlalıkları folyoyu ilk açtığınız tarihten 28 gün sonra atınız.
- Açılan tek dozluk damlalığı kullandıktan hemen sonra içinde kalmış çözeltiyle birlikte atınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SAFLUTAN'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SAFLUTAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Ashfield Sağlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Sahrayıcedit Mah. Halk Sokak Pakpen Plaza

No: 40-44 Kat 1

Kadıköy /İstanbul

Tel: +90 216 251 7676

Faks: +90 212 280 7042

Üretim Yeri: Laboratoires Unither Coutances,
Fransa

Bu kullanma talimatı en son tarihinde onaylanmıştır.