

KULLANMA TALİMATI

STERİL NOVUXOL® Pomad

Deriye sürülerek uygulanır.

- Etkin madde: 1 g pomadda en az 1.2 ünite klostridiopeptidaz A bulunan Kollajenaz (steril, filtre edilmiş) ve eşlik eden proteazlar (en az 0.24 ünite)
- Yardımcı maddeler: Sıvı parafin ve beyaz yumuşak parafin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **STERİL NOVUXOL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **STERİL NOVUXOL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **STERİL NOVUXOL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **STERİL NOVUXOL®'un saklanması başlıkları yer almaktadır.**

1. **STERİL NOVUXOL® nedir ve ne için kullanılır?**

STERİL NOVUXOL® renksizden kahverengimsi bir tona kadar, ince kahverengi parçacıklar içeren hafif karakteristik kokulu pomattır ve topikal dermatolojik enzimler olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

STERİL NOVUXOL® 30 g steril pomad içeren tüplerdedir.

STERİL NOVUXOL® Pomad, bacak yaraları ve yatmaya bağlı oluşan yaralar dahil, yaradaki ölü dokunun giderilmesi böylece yara iyileşme sürecinin hızlandırılması için yaraların temizlenmesinde kullanılır.

2. STERİL NOVUXOL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STERİL NOVUXOL®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer etkin madde veya ürünün bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa ürünü kullanmayınız.
- Vücut yüzeyinizin %10'undan fazlasını kapsayan yanıklarda, yanık uzmanından görüş almadan ürünü kullanmayınız.

STERİL NOVUXOL®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Gözler ve mukozaya temas ettirmekten kaçınılmalıdır.
- Şeker hastalarında, nemli doku kangrenine dönüşmesinden kaçınmak için kurumuş ölü doku dikkatle nemlendirilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Özellikle hamileliğin ilk üç ayında ve gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçmez.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Birlikte uygulandığında, antiseptikler, ağır metaller, deterjanlar, heksaklorofen, ve sabunlar veya asit çözeltileri etkin maddenin etkisini baskılayabilir. Bu nedenle Steril Novuxol® ile birlikte uygulanmamalıdır.

Tirotrisin, gramisidin ve tetrasiklinler, Steril Novuxol® Pomad ile birlikte deriye sürülerek uygulanmamalıdır.

Kloramfenikol, neomisin, basitrasin, gentamisin, polimiksin B ve makrolidler (örneğin eritromisin) Steril Novuxol Pomad ile kullanılabilir.

Steril Novuxol® Pomad, nemli ortamda uzun süre dayanıklı değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. STERİL NOVUXOL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz STERİL NOVUXOL® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. STERİL NOVUXOL®'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer STERİL NOVUXOL®'u nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hekim tarafından başka türlü önerilmemişse aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

Günde bir kez yaklaşık 2 mm kalınlığında bir tabaka pomad, tedavi edilecek bölge hafif nemlendirildikten sonra (serum fizyolojikle veya diğer çözeltilerle), direkt olarak uygulanır. Gereken durumlarda, uygulama günde 2 kereye çıkarılabilir. Genel olarak, ilaçlı bez günde bir kez değiştirilirse yeterlidir. Tahrişten kaçınmak için yara kenarları ve sağlıklı cilt korunmalıdır.

Eğer 14 gün içinde yara tedavisinde bir gelişme görülmezse, tedavi sonlandırılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Yara, serum fizyolojik ile nemlendirilir.

Steril Novuxol® ince bir tabaka halinde uygulanır.

Yara steril gazlı bezle kapatılır.

Eğer STERİL NOVUXOL®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STERİL NOVUXOL® kullandıysanız:

STERİL NOVUXOL®'un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı riski mevcut değildir.

STERİL NOVUXOL®'u kullanmayı unutursanız:

İlacı almayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

STERİL NOVUXOL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi STERİL NOVUXOL®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Bölgesel ağrı
- Yanma
- Lokal deri reaksiyonları (kontakt dermatit dahil) – Kaşıntı, kızarıklık veya deri üzerinde şişlikler

Şiddetli vakalarda tedavinin sonlandırılması düşünülmelidir.

Bunlar STERİL NOVUXOL®'un hafif ve geçici yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. STERİL NOVUXOL®'un saklanması

STERİL NOVUXOL®'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemli yerlerde uzun süre saklamayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra STERİL NOVUXOL®'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz STERİL NOVUXOL®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Abbott Laboratuvarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,
Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,
Kelif Plaza, Kat: 12-20, 34768 Ümraniye –İstanbul

Üretim Yeri: Nordmark Arzneimittel GmbH,
Uetersen/ALMANYA

Bu kullanma talimatı en son gg/aa/yyyy tarihinde onaylanmıştır.