

KULLANMA TALİMATI

STREPTOMAGMA® tablet

Ağız yolu ile alınır.

- ☐ **Etkin maddeler:** Her bir tablet, 500 mg aktive edilmiş attapuljit ve 45 mg pektin içerir.
- ☐ **Yardımcı maddeler:** Sakarin sodyum, Sakarin, Mikrokristalin selüloz, Magnezyum stearat, Doğal nane aroması, Polakrilin potasyum, FD&C kırmızı No.3, FD&C sarı No.5 (tartrazin E102), FD&C sarı No.6, Kolloidal silikon dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- ☐ *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- ☐ *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- ☐ *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- ☐ *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- ☐ *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **STREPTOMAGMA® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **STREPTOMAGMA®'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **STREPTOMAGMA® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **STREPTOMAGMA®'nın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. STREPTOMAGMA® nedir ve ne için kullanılır?

- ☐ STREPTOMAGMA® 20 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Tabletler açık kahverengi, yuvarlak, düz olup, bir yüzü çentikli, diğer yüzü ise çentiksizdir.

- ☐ STREPTOMAGMA[®], etkin madde olarak her bir tablette 500 mg aktive edilmiş attapuljit ve 45 mg pektin içerir.
- ☐ Akut ishalin (diyare) semptomatik tedavisinde kullanılır. İshalde, bağırsak hareketlerini azaltır, sulu dışkının kıvamını artırır ve kramplardan rahatlama sağlar.

İshal tedavisinde önemli noktalar:

1. İçme suları mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. Açıkta satılan içme sularını kullanmadan önce temiz bir kap içerisinde 10 dakika kaynatınız.
2. Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayınız ve beslenmede kullanılan her türlü malzemeyi iyice temizleyiniz.
3. İshal tedavisinde su ve sulu besinler kullanınız ve genellikle yağlı besinlerden, meyve, sebze, kafein, alkollü içeceklerden kaçınınız. Uygun içecekler limonata, orta şekerli çay, tuzlu ayran ile gazı çıkarılmış gazoz ve koladır.

2. STREPTOMAGMA[®]'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

STREPTOMAGMA[®]'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- ☐ Attapuljite, pektine ya da tablet bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
- ☐ İshalle birlikte kanlı dışkı ve ateşiniz varsa,
- ☐ Uzun süreli belirtiler varsa,
- ☐ Sinir sistemi ile ilgili veya diğer ciddi bulgular varsa, vücudunuzdan çok miktarda sıvı kaybetmiş iseniz (dehidratasyon).

STREPTOMAGMA[®]'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- ☐ STREPTOMAGMA[®] ile tedavinin başlamasından 24-48 saat sonra şikayetlerinizde belirgin bir iyileşme olmazsa,
- ☐ İdrar miktarınızda azalma olursa,

- ☐ Bař dönmesi, ağız kuruluđu, susuzluk hissi gibi vücudunuzdan aşırı miktarda sıvı kaybetmiş olabileceğinizi düşündüren belirtiler olursa,
- ☐ Apandisit veya bağırsak iltihabı belirtileriniz (örneğin; mide veya karın ağrısı, mide krampı, bulantı, kusma) varsa,
- ☐ Alzheimer hastalığınız varsa,
- ☐ Astım ve benzeri alerjik belirtiler olursa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

STREPTOMAGMA®'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

STREPTOMAGMA® ile birlikte alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- ☐ Hamile iseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa STREPTOMAGMA®'yı yalnızca doktorunuzun tavsiyesi üzerine ve gerekli durumlarda kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- ☐ Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınlar gerekli durumlarda STREPTOMAGMA® kullanabilirler.

Araç ve makine kullanımı

STREPTOMAGMA®'nın bileşiminde bulunan maddelerin araç ve makine kullanımını olumsuz olarak etkileyecek bir yan etki yapması beklenmez. Bu nedenle araç ve makine kullanmanızda bir sakınca yoktur.

STREPTOMAGMA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir STREPTOMAGMA® Tablette 1.65 mg tartrazin bulunmaktadır. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

STREPTOMAGMA® her bir tablette, 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (5 mg sakarin sodyum) içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

STREPTOMAGMA® bir antibiyotik olan tetrasiklin ve linkomisin, bir kalp ilacı olan digoksin, bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan promazin, alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan pseudoefedrin, kemik kaybını (osteoporoz) önleyen bifosfonatlar, tiroid hormonu yetersizliğinde kullanılan tiroid hormonları, romatoid artrit tedavisinde kullanılan penisilamin, bazı kalsiyum takviyelerinde, antiasitlerde ve müshillerde bulunan sitrat tuzları gibi birçok ilacın emilim hızı ve miktarını azaltabilir veya arttırabilir. Bu nedenle diğer ilaçlarınızı STREPTOMAGMA® aldıktan 2-3 saat sonra alınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. STREPTOMAGMA® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- ☐ İshalin esas tedavisi bol sıvı almaktır.
- ☐ STREPTOMAGMA® için önerilen günlük doz yetişkinler için ilk belirtiler ve her sulu dışkılamadan sonra 2 tablettir.
- ☐ Ne sıklıkta ve kaç tablet STREPTOMAGMA® kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
- ☐ 24 saat içinde toplam 7 dozu aşmayınız. STREPTOMAGMA® 7 günden uzun süre uygulanmamalıdır.
- ☐ Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- ☐ STREPTOMAGMA® sadece ağızdan kullanım içindir.
- ☐ Tabletleri bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

- ☐ 6-12 yaş arası çocuklar için önerilen günlük doz; ilk belirtiler ve her sulu dışkılamadan sonra 1 tablettir.
- ☐ 6 yaşından küçük çocuklarda doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

- ☐ Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir ancak ishallerli yaşlı hastalarda sıvı ve elektrolit kaybı riski bakımından dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği**

Özel kullanım durumları için ek talimatlar yoktur.

Eğer STREPTOMAGMA®'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STREPTOMAGMA® kullandıysanız:

STREPTOMAGMA®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

STREPTOMAGMA®'yı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

STREPTOMAGMA® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi durdurmayınız. Çünkü STREPTOMAGMA® tedavisini durdurmak hastalığınızın daha da kötüye gitmesine neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, STREPTOMAGMA®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

STREPTOMAGMA®'nın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, STREPTOMAGMA®'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- ☐ Aniden gelişen zor ve sesli soluk alıp verme,
- ☐ Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişme (anjioödem),
- ☐ Ciltte döküntülü kızarıklık,
- ☐ Kaşıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STREPTOMAGMA®'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- ☐ Kabızlık
- ☐ Dışkı sertleşmesi

Bunlar STREPTOMAGMA®'nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. STREPTOMAGMA®'nın saklanması

STREPTOMAGMA®'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STREPTOMAGMA®'yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STREPTOMAGMA®'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Turgut İlaçları A.Ş.
Feriköy Fırın Sokak No.: 61
34381 Bomonti-Şişli/İstanbul

Üretici: Fako İlaçları A.Ş.
Büyükdere cad. No: 205
34394 Levent – İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.