

KULLANMA TALİMATI

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)

1400 mg Pediatrik Supozitivar

Rektal (makat içine) uygulanır.

- **Etkin madde:** Her supozitivar 1400 mg gliserin ihtiva eder.
- **Yardımcı maddeler:** Stearik asit
Sodyum karbonat

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) 'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) 'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) nedir ve ne için kullanılır?

- SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için), 10 adet supozitivar (fitil) içeren karton kutuda takdim edilmektedir.
- Açık sarı renkli homojen görünüşlüdür.
- Gliserin suyu absorbe edicidir (emicidir). Supozitivar (fitil) şeklinde rektuma (makat içine) uygulanması sonucu, kısmen kaydırıcı (lubrikan) ve kısmen de lokal uyarma (stimulasyon) sonucu dışkılamayı (defekasyon) kolaylaştırır.
- Basit kabızlıkların (konstipasyonların) giderilmesinde laksatif (dışkılatıcı, dışkı yumuşatıcı) olarak kullanılır.

2. SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) yalnızca rektal yoldan (makat içine) uygulanır. YUTULMAMALIDIR. Kazara yutulması halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer karın ağrısı , bulantı, kusma, inakat çevresinde yarık, yırtık, yara halini almış basur (hemoroid) varsa,
- Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süre ve sık kullanılması dışkılama alışkanlığını bozabilir.

Bu yüzden kısa (bir haftadan az) süreli ve mutlaka gerekli oldukça kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Rektal yol ile uygulandığından kan dolaşımına geçmesi beklenmez, bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşim göstermesi beklenmez.

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)'nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, özellikle diğer laksatifleri şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- 2 yaş altı çocuklarda doktor tarafından tavsiye edildiği şekilde kullanılmalıdır. Küçük bebeklerde supozitivar (fitil) ikiye bölünerek kullanılabilir.
- 2 – 6 yaş arası çocuklarda; SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) için önerilen günlük doz bir supozitivardır (fitil).
- 6 - 12 yaş arası çocuklarda; SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) için önerilen günlük doz bir veya iki supozitivardır (fitil).

- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- Supozituar (fitil) eller iyice yıkandıktan sonra baş ve işaret parmakları ile tutularak makat içine itilerek tatbik edilir.
Fitil çok yumuşamışsa, paket önce buzdolabında 15 dakika bekletildikten sonra uygulanabilir.
- Fitil bir miktar temiz soğuk su ile ıslatıldıktan sonra uygulanmalıdır.
- Süt çocuklarında fitil konulduktan sonra 1-2 dakika kadar tutularak fitilin dışarı atılması önlenirse tesir etmesine zaman bırakılmış olur.
- Laksatif (dışkılatıcı, dışkı yumuşatıcı) hareket için supozituarın erimesine gerek yoktur. Dışkı ile birlikte dışarı atılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar kısmında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) önerilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) kullandıysanız:

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için) ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Makattan kan gelmesi ve ciddi alerjik belirtiler (ciltte döküntü, kabarıklık, nefes almada zorluk, göğüs sıkışması, ağzıda, yüzde, dudaklarda ve dilde şişme).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Makattan kan gelmesi.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Karın ağrısı, makat çevresinde deri tahrişi veya yanma hissi.

Bunlar SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' in saklanması

SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' i kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SUP – GLİSERİN KANSUK K (Küçükler için)' i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: KANSUK LABORATUARI San.ve Tic. A.Ş.
Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-İSTANBUL

Üretici: KANSUK LABORATUARI San. Ve Tic. A.Ş
Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.