

KULLANMA TALİMATI

SUPRAVİT® PEDIATRİK Şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** 2500 IU A vitamini, 0.9 mg B₁ vitamini, 1 mg B₂ vitamini, 1.3 mg B₆ vitamini, 45 mg C vitamini, 400 IU D vitamini, 8.94 mg E vitamini, 85 mcg D-biotin, 3.5 mg dekspantenol, 11 mg nikotinamid
- **Yardımcı maddeler:** Ksilitol, gliserol, propilen glikol, kremofor RH40, DL-Lakton %100, sodyum benzoat, sodyum hidroksit, etanol %96, limon aroması, sodyum hidroksit veya susuz sitrik asit, demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SUPRAVİT® PEDIATRİK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SUPRAVİT® PEDIATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SUPRAVİT® PEDIATRİK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SUPRAVİT® PEDIATRİK'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SUPRAVİT® PEDIATRİK nedir ve ne için kullanılır?

- SUPRAVİT® PEDIATRİK, dengeli oranlarda bir araya getirilmiş bir vitamin şurubudur. İçeriğindeki vitamin miktarları 2-12 yaş arasındaki çocukların günlük gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanmıştır.
- 100 mililitrelik şişelerde bulunur.
- İçeriğindeki vitaminlerin eksikliğinin görüldüğü veya gereksiniminin arttığı durumlarda eksikliğin giderilmesinde kullanılır. Şu durumlarda takviye gerekebilir:
 - Ani kilo kaybı, dengesiz ve yetersiz beslenme, günlük vitamin ihtiyacını karşılamayan beslenme, (örn; süt alımının olmadığı vejetaryen diyetler)

- Yanıklar, ateş, kronik ateş, kronik hemodiyaliz, karaciğer-safra kanalı hastalıkları, hipertiroidizm (tiroid bezinin fazla çalışması, belirtileri; metabolizmada hızlanma, kilo kaybı, terleme, güçsüzlük), uzamış hastalıklar/enfeksiyonlar, bağırsak hastalıkları, pankreas yetmezliğine bağlı olarak besinlerin yetersiz emilimi, protein eksikliği, yağ emiliminin bozulduğu durumlar
- Ağız- boğaz hasarları, sarılık

2. SUPRAVİT® PEDIATRİK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUPRAVİT® PEDIATRİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer çocuğunuzun;

- İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerjisi varsa
- Hipervitaminoz A ve D'si (vücuttaki vitamin fazlalığı) varsa
- Hiperkalsemisi (Kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden fazla bulunması) varsa
- Retinoid tedavisi (Epitel hücrelerin çoğalmasını engelleyen A vitamini sentetik türevi bir ilaç ile yapılan tedavi) devam ediyorsa

SUPRAVİT® PEDIATRİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsa,

- D vitamini içeren ilaçlar
- A vitamini içeren ilaçlar
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar
- Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUPRAVİT® PEDIATRİK'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ölçüğünde 100 mg'dan az etanol (alkol) içerir.

Bu tıbbi ürün her 5 ml'sinde 3,9 mg sodyum ihtiva eder. Yani esasında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında SUPRAVİT® PEDIATRİK'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Antikonvülsanlar (Özellikle çizgili kasların şiddetli bir şekilde ve istem dışı kasılmasını engelleyen ilaç grubu)
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar

- Ganglionik bloker (Sinir hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bölgelerde sinir iletimine engel olarak kan basıncını düşüren ilaçlar)
- Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayini gerektiğinde (etkileşimden dolayı bu yöntem ile yapılan tayin yanlış sonuç verebilir)

Eğer çocuğumuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacımıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SUPRAVİT® PEDIATRİK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara ½ (yarım) ölçek 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1 ölçek veriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

SUPRAVİT® PEDIATRİK'i 6 yaşından küçük çocuklara su, meyve suyu veya mamaya karıştırarak, 6 yaşından büyük çocuklara kahvaltı ile birlikte verebilirsiniz.

Doktorunuz SUPRAVİT® PEDIATRİK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer SUPRAVİT® PEDIATRİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUPRAVİT® PEDIATRİK kullandıysanız:

Çocuğunuz, SUPRAVİT® PEDIATRİK'ten kullanması gerekenden fazlasını kullanırsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUPRAVİT® PEDIATRİK'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çocuğunuza çift doz SUPRAVİT® PEDIATRİK vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SUPRAVİT® PEDIATRİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SUPRAVİT® PEDIATRİK kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (duyarlı bireylerde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin SUPRAVİT® PEDIATRİK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- A ve D vitamini fazlalığı (A vitamininin fazla alınmasına bağılı olarak kafa ii basıncı artar, kusma ve iřtahsızlık geliřir. Yksek dozda alınan D vitamini sonucu kemiklerden depo olarak bulunan belirgin derecede kalsiyumun serbest hale gemesine bağılı olarak ařırı hiperkalsemi hali meydana gelir. Hiperkalsemi uzun srurse zellikle bebeklerde zihinsel ve fiziksel geliřmede gerilemeye neden olur.)

Bunlar SUPRAVİT® PEDİATRİK'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SUPRAVİT® PEDİATRİK'in saklanması

SUPRAVİT® PEDİATRİK'i ocukların gremeyeceėi, eriřemeyeceėi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15°C'nin altında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUPRAVİT® PEDİATRİK'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer Consumer Care AG, İsvire lisansı ile
Bayer Trk Kimya San. Ltd. řti.
akmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770
mraniye – İSTANBUL
Tel: 0 216 528 36 00
Faks: 0 216 645 39 50

retim Yeri: PharmaVision San. ve Tic. A.ř., Topkapı - İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıřtır.