

## KULLANMA TALİMATI

### TANFLEX jel % 5

Ağızdan alınır.

**Etkin Madde:** 50 g jel içinde 2,5 g benzidamin HCl içerir

**Yardımcı Maddeler:** İzopropil alkol, gliserin, hidroksi etil selüloz, adonia esansı ve saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında :**

1. *TANFLEX nedir ve ne için kullanılır?*
2. *TANFLEX' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *TANFLEX nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *TANFLEX 'in saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1.TANFLEX nedir ve ne için kullanılır?**

• TANFLEX, yangı önleyici ve yangı önleyici etkisine bağlı olarak ağrı kesici özelliklere sahip bir non-steroid antiinflatuvar ilaçtır (NSAİİ; steroid yapıda olmayan yangıyı önleyen ilaç)

• TANFLEX, 50 g'lık alüminyum tüp ambalajlarda sunulur. Renksiz, jelatinimsi kütledir. Kolay yayılır ve adonia esanslıdır.

• TANFLEX, Muhtelif sebeplerle (cerrahi, travmatik, fizik vs.) meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerine bağlı lokal ödem (vücutta sıvı birikimi) , yangı ve buna bağlı aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır.

- Bursit ( eklem keselerinin yangısı)
- Tendinit (kasları kemiğe bağlayan yapılar olan tendonların yangısı)
- Kas ağrısı
- Sırt ve bel ağrısı
- Burkulma
- Ezik
- Kas gerilmesi vs.

## **2. TANFLEX' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **TANFLEX' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer TANFLEX' in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

### **TANFLEX' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- TANFLEX' i cilt bütünlüğünün bozulmuş olduğu açık yaralara sürmeyiniz,
- Diğer haricen uygulanan ilaçlarda olduğu gibi uzun süreli kullanılmasının hassaslaşmaya sebep olabileceğini göz önünde bulundurunuz,
- Gözler ve mukozal yüzeylerle (ağız içi ve burun içi mukozası gibi) temasından kaçınınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **TANFLEX' in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

TANFLEX' in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Yeterli klinik deneyim bulunmadığından TANFLEX' i hamilelik sırasında kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziren kadınlarda yeterli sayıda çalışma olmadığından emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

TANFLEX' in topikal kullanımı araç veya makine kullanma becerinizi etkilemez.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

TANFLEX ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. TANFLEX nasıl kullanılır?**

**Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:** bölgeye ve/veya civarına hafif ovalayarak günde 2-3 defa sürülür. Tüpten dışarı sıkılacak jel miktarı yarım ya da bir parmak uzunluğunda olmalıdır. Tedavi süresi cerrahi travmalarda 3-5 gün, diğer travmatik durumlarda 5-7 gündür.

Doktorunuz TANFLEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

### **• Uygulama yolu ve metodu:**

Hasta bölgeye ve/veya civarına hafif ovalayarak uygulanır.

• **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

**Özel kullanım durumları:** Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

*Eğer TANFLEX' in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla TANFLEX kullandıysanız:**

*TANFLEX' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**TANFLEX' i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**TANFLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bilinmemektedir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi TANFLEX' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek (10.000 hastada 1'den fazla ve 1.000 hastada 1'den az) olarak görülen yan etkiler:

- Cilt tahrişine bağlı kasıntı
- Kızarıklık
- Deride içi sıvı dolu kabarcıklar
- Işığa karşı duyarlılık reaksiyonları

Yukarıda belirtilen yan etkilerin ilaç kesilince kaybolduğu bildirilmiştir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. TANFLEX' in saklanması**

*TANFLEX' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TANFLEX 'i kullanmayınız.*

***Ruhsat Sahibi:***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Reşitpaşa mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4  
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

***Üretim Yeri:***

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3  
Esenyurt / İstanbul

*Bu kullanma talimatı .././... tarihinde onaylanmıştır.*