

KULLANMA TALİMATI

TELEBRIX 30 Flakon Damar içine uygulanır.

- **Etkin madde:** 100 mL enjeksiyonluk solüsyon meglumin ioksitalamat formunda 66.03 g ioksitalamik asit içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Meglumin, sodyum kalsiyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **TELEBRIX 30 nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TELEBRIX 30'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TELEBRIX 30 nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TELEBRIX 30'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TELEBRIX 30 nedir ve ne için kullanılır?

TELEBRIX 30, radyolojik tetkikler için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır.

TELEBRIX 30, radyolojik tetkikler sırasında görüntü kalitesini artırmak için kullanılır. Görüntü kalitesini artırmak, belli organların daha net ve açıkça görüntülenmesini sağlar.

TELEBRIX 30, yalnızca teşhis amaçlı kullanılır.

2. TELEBRIX 30'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bu bölümdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

TELEBRIX 30'u kullanmadan önce doktorunuzla birlikte buradaki bilgileri göz önüne almalısınız.

TELEBRIX 30'u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eęer TELEBRIX 30'un ierdięi etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karřı allerjiniz varsa,
- Eęer daha nce ioksitalamik asit enjeksiyonunu takiben ani veya gecikmiř cilt reaksiyonu geirdiyseniz (bakınız Blm 4 Olası Yan Etkileri nelerdir?),
- Eęer tiroid hormonlarınız ařırı derecede yksekse (tirotoksikozis),
- Eęer kalp fonksiyonlarınızda ciddi dzeyde yetersizlik varsa (dekonpanze kalp yetmezlięi),
- TELEBRIX 30, ciddi ve hayati tehdit edici dzeyde sinir hcrelerine zarar verici reaksiyonlara yol aabileceęinden, doęrudan omurilik/beyin yoluyla uygulanmamalıdır.

TELEBRIX 30'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Tm iyotlu kontrast maddeler ile ve uygulama yolu ve dozundan baęımsız olarak yan etkiler oluřabilir, bu yan etkiler ok azdır ancak hayati tehlike oluřturabilir. Bu reaksiyonlar, uygulama sonrası bir saat ierisinde ya da ok nadiren uygulamadan 7 gn sonra olabilir. Bu yan etkiler nceden bilinemez ancak eęer iyotlu kontrast maddenin nceki uygulamasından sonra byle bir deneyim edinilmiř ise risk artar (bakınız 4. Olası yan etkiler nelerdir?). Sonu olarak enjeksiyonu gerekleřtiren radyolog, dięer radyolojik inceleme sırasında bir iyotlu kontrast maddenin herhangi bir nceki reaksiyonunu bildirmelidir.

Eęer durumunuz ařağıdakilerden birine uyuyorsa doktorunuzu bilgilendirin:

- Daha nceki bir tetkik sırasında kontrast ilaca karřı alerjik reaksiyon gsterdiyseniz,
- Yakın zamanda guatr (tiroid) tetkiki ya da tedavisi amacıyla radyoaktif iodin kullanılacaksa,
- Bbrek problemleriniz varsa,
- Aynı zamanda bbrek ve karacięer yetmezlięiniz (bbreklerin ve karacięerin fonksiyon yetersizlięi) varsa,
- Őeker hastalıęınız varsa (yksek kan řekeriyle seyreden metabolik bir hastalık),
- Kalp yetmezlięiniz (kalp fonksiyonlarının yetersizlięi) veya dięer bir bařka kalp ya da damar hastalıęınız varsa,
- Kemik ilięi hastalıęınız (monoklonal gammapati, multiple miyelom ya da Waldenstrm hastalıęı) varsa,
- Karacięer hastalıęınız varsa,
- Astım hastalıęınız varsa veya tetkikten 8 gn ncesine kadar bir astım ataęı geirdiyseniz,
- Mevcut ya da geirilmiř bir guatr (tiroid) hastalıęınız varsa,
- İnme (fel) ya da yakın zamanda beyin kanaması geirdiyseniz (kafatası ierisinde kanama),
- Nbetler geirdiyseniz ya da sara hastalıęı (epilepsi) tedavisi aldıysanız,
- Dzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız ya da ila alıyorsanız,
- Miyasteni hastalıęınız (kas hastalıęı) varsa,
- Feokromastoma hastalıęınız (ciddi yksek tansiyona yol aan artmıř hormon salınımı) varsa,
- Anksiyete, sinirlilik ya da aęrınız varsa (olası yan etkiler daha fazla hissedilebilir).

Tüm bu durumlarda doktorunuz ilacın sağlayacağı yararlar ile yaratacağı riski göz önüne alarak TELEBRİX 30 kullanacaktır. Eğer doktorunuz TELEBRİX 30 kullanırsa gerekli önlemleri alacak ve uygulama sırasında sizi yakından takip edecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TELEBRİX 30'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TELEBRİX 30'un yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur. Buna rağmen, çekimden önce bir şey yememek ya da içmemek ile ilgili doktorunuz ya da eczanıza danışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da adetiniz geciktiyse bunu doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TELEBRİX 30 kullanıldıktan sonraki 24 saat içinde bebeğinizi emzirmeyi bırakın. TELEBRİX 30 süütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

TELEBRİX 30 araç ve makine kullanma becerinizi etkilemez. Çekimden sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız araç ya da makine kullanmamalısınız.

TELEBRİX 30'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her 100 mL'de 1 mmol'den az 8,4 mg sodyum (23mg) içermektedir, yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Özellikle;

- Kalp ve yüksek tansiyon tedavisi için beta-blokör, diüretik ya da anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ilaçlar kullanıyorsanız,
- Şeker hastalığı tedavisi için (metformin) kullanıyorsanız,
- Yakın zamanda interlökin-2 veya platinum kaynaklı ilaç tedavisi aldıysanız,
- Aminoamid grubu antibiyotik, anti-inflamatuvar (çoğunlukla romatizmal hastalıklarda kullanılan bir ilaç grubu), virüs ya da mantar enfeksiyonuna yönelik ilaçlar, organ nakil reddini önlemek için kullanılan (immünsüpresif) ilaçlar kullanıyorsanız bunu doktorunuza ya da eczacınıza mutlaka bildirin.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TELEBRIX 30 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

TELEBRIX 30, damar içine enjeksiyon ile uygulanır.

Uygulama sırasında doktor gözetiminde olacaksınız. Herhangi bir acil durumda gerekli ilacı uygulamak üzere damarınıza bir plastik iğne takılacak. Uygulama sırasında herhangi bir alerjiniz olursa TELEBRIX 30 verilmesi durdurulacaktır.

Uygulama hastane ya da görüntüleme merkezinde yapılacaktır. Radyolojik incelemeyi yapanlar uygulama ile ilgili alınması gereken önlemleri bilmektedir ve ortaya çıkabilecek olası rahatsızlıklardan haberdardır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda TELEBRIX 30 kullanımına dair özel bir gereksinim tanımlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda TELEBRIX 30 kullanımına dair özel bir gereksinim tanımlanmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Uygulama sırasında doktor gözetiminde olacaksınız. Herhangi bir acil durumda gerekli ilacı uygulamak üzere damarınıza bir plastik iğne takılacak. Uygulama sırasında herhangi bir alerjiniz olursa TELEBRIX 30 verilmesi durdurulacaktır.

Kullanmanız gerekenden fazla TELEBRIX 30 kullandıysanız

Size kullanmanız gerekenden fazla doz verilmesi ihtimali yoktur. TELEBRIX 30, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. TELEBRIX 30, kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında, hemodiyaliz (kan temizlenmesi) yolu ile vücuttan atılır.

TELEBRIX 30'u kullanmayı unutursanız

TELEBRIX 30, teşhis amaçlı kullanılan bir üründür ve size bir doktor tarafından klinikte uygulanmaktadır. Bu nedenle TELEBRIX 30'u kullanmayı unutma ihtimaliniz bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TELEBRIX 30'n de yan etkileri olabilir.

Tüm ilaçlar gibi TELEBRIX 30 da aşağıdaki yan etkilere neden olabilir ancak bu yan etkiler herkeste meydana gelmez:

Genelde yan etkiler hafif olmakta ve uzun sürmemektedir. Ancak TELEBRIX 30 gibi kontrast madde uygulaması nadiren şiddetli ve yaşamı tehdit eden reaksiyonlara yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa derhal doktorunuza veya radyologa / radyoloji departmanı ekibine bildiriniz:

- deride kaşınma, döküntü, kabarcık
- nefes almada zorluk, öğürme, boğulma hissi
- yüz, boyun veya gövdede şişme
- gözlerde kaşınma veya sulanma, boğaz veya burunda gıcıklanma, ses kısıklığı, öksürük veya hapsirme
- baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık hissi
- özellikle sıcak veya soğuk hissetme, terleme
- deride solukluk veya kızarıklık
- göğüs ağrısı, kramp, titreme
- hasta hissetme

Bunlar alerjik reaksiyonun veya şokun ilk belirtileri olabilir. Doktorunuz araştırmanın sonlandırılmasına ve ileri tedavi almanıza gerek olup olmadığına karar verecektir.

TELEBRIX 30 ile gözlenen yan etkiler şunlardır:

- Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları, genelde kontrast maddenin uygulanmasından sonra 60 dakika içerisinde meydana gelir; bu reaksiyonlar arasında kaşıntı (pruritus), deride kızarıklık (eritem), bölgesel veya yaygın kabarcıklar (ürtiker), yüzde, deride veya mukoz membranlarda şişme (anjiyoödem) yer almaktadır. İzole vakalarda alerjik reaksiyon çok şiddetli (anafilaktik şok) olabilir.
- Uygulamadan sonra yedi güne kadar gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir ve çoğu zaman muhtemelen kabarcık benzeri lezyonlar ile deride döküntü şeklinde görülebilir.
- Tiroid fonksiyonu hastalıkları, aşırı aktif tiroid bezi veya aşırı aktif tiroid bezinde aniden kötüleşme (tirotoksik kriz)
- Zihin karışıklığı, huzursuzluk
- Koma, bilinç kaybı, baygınlık, havale, titreme, baş dönmesi
- İstemli hareketlerde bozulma
- Karıncalanma, yanma, iğne batması veya uyuşukluk hissi
- Baş ağrısı
- Göz kapağı ödemi

- Denge duyusunda bozulmadan kaynaklan anormal hareket algısı
- Hızlı veya düzensiz kalp atımı (taşikardi, aritmi), kalp fonksiyonunun aniden durması (kardiyak arrest), deride mavimsi renk (siyanoz)
- Miyokard enfarktüsü, anjina pektoris
- Şok, kan basıncında azalma veya artma
- Kızarma, solukluk
- Öksürük, hapşırma, boğazda daralma hissi, nefes almada güçlük, laringeal mukozada şişme (laringeal ödem), bronşiyal spazm, laringeal kaslarda kasılma, solunum yetmezliği veya arrest
- Akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem)
- Bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare
- Terlemede artış
- Kas spazmı
- Muhtemelen idrar çıkışında azalma (anüri) ile geçici böbrek yetmezliği
- Ödem, kızgınlık, ağrı, ateş ve üşüme
- Sıcak basması
- Böbrek hastalığını düşündüren anormal laboratuvar değeri (kan kreatinin düzeyinde artış)

TELEBRIX 30'ın intravasküler yoldan uygulanması ile kızarma, yanma, ağrı ve yanlılıkla sızıntı durumunda enjeksiyon yerinde subkutan dokunun ölümü (nekroz) meydana gelebilir.

Yan etkilerden herhangi biri ciddi olduğu takdirde veya bu kullanma talimatında belirtilmeyen bir yan etki gördüğünüzde doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TELEBRIX 30'ın saklanması

TELEBRIX 30'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TELEBRIX 30'u ışıktan uzakta 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Buzdolabında saklamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Şişe ve kutu üzerinde belirtilen son kullanım tarihinden sonra TELEBRIX 30'u kullanmayınız. "Son Kull. Tar." ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanım tarihidir.

Eğer üründe gözle görülür bir bozulma işareti fark ederseniz, TELEBRIX 30'u kullanmayınız.

Kalan TELEBRIX 30'un imha edilmesi sizden istenecek bir durum değildir. Eğer böyle bir şey olursa ne yapmanız gerektiğini eczacınıza sorun. Burada yapılacaklar çevrenin korunmasına yönelik olacaktır.

Ruhsat sahibi:

GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Kısıklı Cad. Haluk Türksöy Sok. Işık Plaza No.7 K.2
Altunizade – Üsküdar – 34662 – İstanbul
Tel. 0216 651 47 44

Üretici:

Guerbet
BP 57400, 95943 Roissy, CdG Cedex,
Fransa

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

AŐAĐIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĐLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Tanı amaçlı olarak radyolojik görüntüleme de kullanılacak olan TELEBRİX 30'u sadece damar içine uygulayınız.

Uygulamadan önce, uygulamayı nasıl yapacağınız konusunda hastanızı bilgilendiriniz. Hastanızın bilgilendirilmesi, uygulama esnasında hastanızın uyumunu ve uygulamanın başarısını artıracaktır.

TELEBRİX 30 uygulamasından önce son kullanma tarihini ve şişenin içerisindeki sıvının berrak ve tortusuz olduğunu kontrol ediniz.

Uygulamadan sonra şişede eđer varsa kalan miktarı yeniden kullanmayınız. TELEBRİX 30'un imhası için özel bir gereksinim yoktur. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliđi" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliđi" ne uygun olarak imha edilmelidir.