

KULLANMA TALİMATI

TINACTIN® Pudra sprey, %1
Haricen kullanılır.

Etken madde: %1 oranında Tolnaftat içermektedir.

Yardımcı Maddeler: İtici gaz A-31, Alkol, Talk, Ucon-50 HB-660, Butil hidroksitoluen

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **TINACTIN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TINACTIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TINACTIN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TINACTIN®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TINACTIN® nedir ve ne için kullanılır?

TINACTIN® tolnaftat içeren, deriye uygulanan antifungal (mantarlara karşı kullanılan ilaçlar) sınıfına dahil, pudra sprey formunda bir ilaçtır.

133 g'lık metal kutuda, karton kutusu ve kullanma talimatı ile beraber kullanıma sunulmaktadır.

TINACTIN® ayaklardaki, kasıklardaki ve vücuttaki mantar hastalıklarının tedavisi için kullanılır.

2. TINACTIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TINACTIN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- ✓ Eğer TINACTIN®'in içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız.
- ✓ Hekim tarafından önerilmedikçe 2 yaşın altındaki çocuklarda.

TINACTIN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- ✓ Tüp içeriği basınç altında olduğundan saklanması bahsedilen uyarılara uyunuz.
- ✓ Yalnızca harici kullanım içindir.
- ✓ Kullanım sırasında kutuyu dik tutunuz, gözlerle ve müköz membranlarla temasından kaçınınız.

- ✓ Sigara içerken bu ürünü spreylemeyiniz, ateş ve ısı kaynaklarının yakınlarında kullanmayınız ve tüpü bu kaynakların yakınlarında bırakmayınız.
- ✓ Tüp içeriği basınç altındadır, delmeyiniz ve ezmeyiniz.
- ✓ Tüp içeriğinin bilerek solunması ve yutulması zararlı ve ölümcül olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TINACTIN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TINACTIN®'in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılmasına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tolnaftat ile hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Deneysel çalışmalarda, haricen uygulanan Tolnaftat'ın bilinen bir yan etkisi saptanmamıştır. Ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi, bu dönemde TINACTIN®'in kullanımı önerilmemektedir. Kullanımı yalnızca potansiyel fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Tolnaftat'ın süte geçişi konusunda mevcut bilgi yoktur. Bu nedenle, emzirme esnasında TINACTIN®'in kullanımı önerilmemektedir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

TINACTIN®'in araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

TINACTIN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:
TINACTIN®'in içeriğinde butil hidroksitoluen bulunduğundan lokal deri reaksiyonlarına sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TINACTIN® nasıl kullanılır:

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Eğer hekim tarafından başka bir şekilde önerilmedi ise sabah ve akşam olmak üzere günde en az 2 kere uygulayın. Tedavinin en az 4 hafta devamı önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Yalnızca harici kullanım içindir. Hekim tarafından başka şekilde önerilmedikçe aşağıdaki kullanım şekli önerilir: İlgili deri bölgesini yıkayıp iyice kurutun. Kullanmadan önce iyice

çalkalayınız. Sprey tüpünü ilgili alanın üzerine ince bir tabaka halinde kaplayacak şekilde spreyleyin.

Ayak mantarlarının tedavisi sırasında, tedavinin başarısı için bazı önlemlerin de birlikte alınması gerekir:

- ✓ Parmakların arasını kuru tutacak şekilde iyi havalandan, uygun ayakkabılar kullanılmalıdır
- ✓ Kullanılan çoraplar en az, günde bir kez değiştirilmelidir.
- ✓ Kullanılan ayakkabılar da her gün değiştirilerek dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Yalnızca harici kullanım içindir. Sigara içerken bu ürünü spreylememeniz ve ateş ile ısı kaynaklarının yakınlarında kullanmayınız ve tüpü bu kaynakların yakınlarında bırakmayınız. Tüp içeriği basınç altındadır. Delmeyiniz ve ezmeyiniz. Tüp içeriğinin bilerek inhalasyonu ve yutulması zararlı ve ölümcül olabilir. Kullanım sırasında kutuyu dik tutunuz ve gözlerle temasından kaçınınız.

Değişik yaş gruplarında kullanım

Çocuklarda kullanımı:

Hekim tarafından önerilmedikçe 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Çocuklarda kullanım sırasında, doğru kullanım için ebeveynlerin gözlemi önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb)

Özel kullanım durumlarına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer TINACTIN®'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla TINACTIN® kullandıysanız:

Bugüne kadar bildirilen bir doz aşımı bilgisi yoktur.

TINACTIN®'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TINACTIN®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TINACTIN® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bilinmemektedir.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TINACTIN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek yan etkiler:

TINACTIN® butil hidroksitoluen içerdiğinden seyrek olarak; hafif tahriş, kızarıklık, kaşıntı ve temas dermatiti (deri yangısı) görülebilir.

Bunlar TINACTIN®'in hafif yan etkileridir.

Tolnaftat'ın haricen uygulanması sonrası sistemik absorpsiyonu mümkün olmadığı için sistemik bir yan etki raporlanmamıştır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. TINACTIN®'in Saklanması

TINACTIN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TINACTIN®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Ümraniye 34773 İstanbul

Üretim Yeri: Schering Plough Healthcare Products adına Access Business Group LLC, ABD

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.