

KULLANMA TALİMATI

URO-VAXOM kapsül
Ağızdan alınır.

Etkin madde: 1 kapsül 6 mg liyofilize E.coli bakteriyel lizati içermektedir.

Yardımcı maddeler: Anhidr propil gallat, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **URO-VAXOM nedir ve ne için kullanılır?**
2. **URO-VAXOM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **URO-VAXOM nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **URO-VAXOM'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. URO-VAXOM nedir ve ne için kullanılır ?

URO-VAXOM, 30 kapsüllük blister ambalajlarda sunulan biyolojik kökenli bir üründür.

Bağışıklık sistemini uyararak vücudun doğal savunma mekanizmalarını artırır.

URO-VAXOM başta sistit mesane iltihabı olmak üzere, üriner idrar yolu sisteminin tekrarlayan enfeksiyonlarının oluşmasını engelleyebilir. Ayrıca, üriner sistem enfeksiyonlarının akut evresinde her zaman kullanılan tedavi edici ilaçlar ile birlikte de kullanılabilir.

URO-VAXOM son 12 ayda klinik olarak ve/veya laboratuvar bulgularıyla dokümanite edilmiş tekrarlayan en az 3 alt idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olanların tedavisinde kullanılır.

2. URO-VAXOM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

URO-VAXOM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer URO-VAXOM'un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjik)

URO-VAXOM'u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

URO-VAXOM'un etkinliğı ve güvenilirliğı 4 yař ve altındaki çocuklarda gösterilmemiřtir.

Eğer bařka bir hastalıđınız varsa, bünyeniz alerjikse ve bařka herhangi bir ila alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

‘‘Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.’’

URO-VAXOM'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

URO-VAXOM yemeklerden nce a karnına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamilelik döneminde URO-VAXOM kullanılıp kullanılamayacağı konusunda doktorunuza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme döneminde URO-VAXOM kullanılıp kullanılamayacağı konusunda doktorunuza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

URO-VAXOM'un güvenli bir ila olduđu dřünlmektedir, sedatif bir etkiye neden olması olası değıldir. Dikkat gerektiren durumlarda etkisi bilinmemektedir.

URO-VAXOM'un ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İerikte bulunan yardımcı maddenin kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilalar ile birlikte kullanımı

Bugne kadar herhangi bir ilala etkileřim bildirilmemiřtir.

Eğer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. URO-VAXOM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önleyici tedavi ve/veya destekleyici tedavi: 3 ay süreyle her gün bir kapsül alınır. URO-VAXOM için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

URO-VAXOM ağızdan, aç karnına, bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

4 yaş ve altı çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Eğer URO-VAXOM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla URO-VAXOM kullandıysanız:

URO-VAXOM'u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

URO-VAXOM'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

URO-VAXOM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

URO-VAXOM tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, URO-VAXOM'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, URO-VAXOM'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
- Baygınlık
- Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin URO-VAXOM'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Karın ağrısı
- Bulantı
- İshal
- Deride hafif kızarıklık
- Hafif ateş

Bunlar URO-VAXOM'un hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. URO-VAXOM'un saklanması

URO-VAXOM'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25⁰C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URO-VAXOM'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz URO-VAXOM'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretici:

OM PHARMA
Cenevre / İsviçre

Bu kullanma talimatı 22.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.