

## KULLANMA TALİMATI

### VESICARE 10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Solifenasin süksinat 10 mg.
- **Yardımcı madde(ler):** Mısır nişastası, laktoz, hipromelloz (E464), magnezyum stearat, makrogol, talk, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*


### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **VESICARE nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **VESICARE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VESICARE nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VESICARE’in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. VESICARE nedir ve ne için kullanılır?**

VESICARE idrar yollarındaki spazmı giderici (üriner antispazmotik) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

Bir yüzünde  logo ve “151” oyma basılı, açık pembe renkli, yuvarlak tablettir. VESICARE 30 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup, her kutuda 10’ar tabletlik 3 adet blister bulunur.

VESICARE tablet aşırı çalışan idrar torbası belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkmak ihtiyacı, sıkışarak tuvalete gitme ihtiyacı, zamanında tuvalete yetişememenizden kaynaklanan idrar kaçırma bulunmaktadır. VESICARE alındığı zaman etkin madde olan solifenasin vücudunuza salınarak idrar torbanızın faaliyetini azaltır ve idrar torbanızı kontrol altına alabilmenizi sağlar.

## 2. VESICARE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### VESICARE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- QT uzaması/Torsades de Pointes denilen kalp ritim bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar ile tedavi görüyorsanız
- VESICARE, solifenasin veya VESICARE’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (örneğin döküntü, kaşıntı veya nefes darlığı)
- Böbrek diyalizine giriyorsanız
- VESICARE’in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla (örneğin ketakanazol) tedavi ediliyorsanız ve ciddi böbrek hastalığı veya orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa
- Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylendiyse
- Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa
- İdrara çıkamıyor veya idrar kesenizi tamamen boşaltamıyorsanız (üriner retensiyon)
- Ciddi bir mide veya barsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit ile ilişkili bir komplikasyon olan toksik megakolon dahil)
- Belli kaslarda aşırı zayıflığa neden olabilen miyastenia gravis adı verilen bir kas hastalığınız varsa
- Gözlerde, kısmi görme kaybının eşlik ettiği, yüksek basınç (glokom) varsa

### VESICARE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- İdrar torbanızda (mesanenizde) idrara çıkmanızı güçleştiren bir tıkanma varsa
- Sindirim sisteminizde bir tıkanma varsa
- Sindirim sisteminizin yavaşlaması riski altındaysanız
- Reflü hastalığınız (yanma dahil) veya hiatus hernia denilen bir çeşit fıtık hastalığınız varsa
- Aspirin, ibuprofen veya steroid yapıda olmayan, iltihabı önleyen ilaçlar ve ayrıca kemiklerinizin incilmesi nedeniyle doktorunuz tarafından reçete edilen bifosfonatlar türü ilaçlar gibi yemek borusu iltihabında kötüleşmeye yol açabilen ilaçlar alıyorsanız
- Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda VESICARE’i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız
- Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda VESICARE’i günde 5 mg’dan daha fazla almamalısınız
- VESICARE’in vücuttan atılmasını azaltabilen ilaçlarla tedavi görüyorsanız. Doktorunuz veya eczacınız size bu konuda bilgi vermelidir.
- Bazı iç organları uyaran sinirlerde harabiyet nedeniyle oluşan (otonom nöropati adı verilen) bir grup belirti gösteriyorsanız

Ayrıca

Doktorunuz VESICARE tedavisine başlamadan önce kalp veya böbrek sorunları ya da bir boşaltım sistemi enfeksiyonu gibi sık idrara çıkma ihtiyacı yönünden diğer nedenlerin var olup olmadığını değerlendirecektir.

*Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.*

## **VESICARE'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

VESICARE a veya tok karnına alınabilir. Film tablet bütn olarak yeterli miktarda su ile yutulurak alınır.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

- VESICARE'in hamilelik sırasında kullanımına iliřkin bir bilgi bulunmadığı iin hamilelik esnasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

- Emzirme dneminde VESICARE kullanmayınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

VESICARE bazen bulanık grmeye ve daha nadir olarak sersemliėe ve yorgunluėa neden olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birini yařıyorsanız, ara ve makine kullanmayınız.

## **VESICARE'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Her bir tablet 102.5 mg laktoz ierir. Eėer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduėu sylenmiřse, bu ilacı almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

## **Diėer ilalar ile birlikte kullanımı**

VESICARE kullanırken bařka ilalar alıyorsanız, bu durum ilaların iřlevini olumsuz etkileyebilir ve yan etki olasılıėı doėurabilir. Ařaėıdaki ilalardan herhangi birisini alıyorsanız VESICARE kullanmaya bařlamadan nce doktorunuza veya eczacınıza bařvurun:

- Aynı trden bařka ilalar (antikolinergik ilalar), zira her iki ilacın etkisi ve yan etkileri artabilir. VESICARE tedavisi kesildikten sonra bu trden bařka bir ila kullanmaya bařlamadan nce bir hafta ara verilmelidir.
- Kolinerjik reseptr agonistleri trnden ilalar kullanıyorsanız (en yaygınlarından birisi olan pilokarpin glokom (gz tansiyonu) hastalıėı tedavisinde kullanılmaktadır), VESICARE'in etkisi azalabilir
- Sindirim sistemi daha hızlı alıřtıran ilalar (rneėin metoklopramid), kullanıyorsanız VESICARE'in etkisi azalabilir.

VESICARE'in vcuttan atılmasını azaltan ilalar da (rneėin ketakonazol) kullanıyorsanız gnde sadece 5 mg VESICARE almalısınız. Aynı zamanda ciddi bbrek hastalıėınız veya orta dereceli karaciėer hastalıėınız varsa hi VESICARE kullanmayınız.

*Eėer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. VESICARE nasıl kullanılır ?

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
- Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
- Günde bir kez 5 veya 10 mg'lık bir tablet alınız.
- Doktorunuz hangisinin sizin için en uygun doz olduğunu size anlatacaktır.
- VESICARE'i her gün aynı saatte alınız.

#### Uygulama yolu ve metodu:

VESICARE ağızdan alınır ve bir içeceklerle bütün halde yutulmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Tabletleri kırmayınız.

#### Değişik yaş grupları:

##### Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda VESICARE'in güvenliliği ve etkinliği henüz tam olarak belirlenmemiştir ve bu nedenle VESICARE'i çocuklarda kullanmayınız

##### Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

#### Özel kullanım durumları:

##### Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg'dan daha fazla VESICARE almayınız.

##### Karaciğer yetmezliği:

Orta dereceli karaciğer hastalığınız varsa, ki bu durumda günde 5 mg'dan daha fazla VESICARE almayınız.

*Eğer VESICARE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

#### Kullanmanız gerekenden daha fazla VESICARE kullandıysanız:

VESICARE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya hastanenin acil bölümüne başvurunuz ve onlara kaç adet tablet aldığınızı söyleyiniz.

Çocukların kazara VESICARE alması durumunda derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

Doz aşımı aşağıdaki etkilere yol açabilir:

Baş ağrısı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, sersemlik ve bulanık görme.

Ciddi doz aşımı durumunda, halüsinasyonlar, aşırı uyarılabilirlik, nöbetler, solunum sorunları (solunum yetersizliği), artan nabız (taşikardi), idrar yapamama (üriner retensiyon), göz bebeklerinde büyüme ( dilatasyon) görülebilir.

QT uzaması adı verilen ritm bozukluğu dahil, kalp ritmi bozukluğu, kalp yetmezliği veya kalbe yetersiz kan akımı gibi belli risk türleriyle karşı karşıya olan hastalar için özel dikkat gösterilmesi gerekir.

#### **VESICARE’i kullanmayı unutursanız**

Bir sonraki dozu alma zamanı gelmediği takdirde, hatırlar hatırlamaz alınız. Günde birden fazla doz almayınız. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **VESICARE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Tedaviyi kesmeye karar verirseniz her zaman doktorunuza başvurunuz.

VESICARE kullanmayı keserseniz idrar kesenizde aşırı aktivite belirtileri yeniden görülebilir veya kötüye gidebilir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir ?**

Tüm ilaçlar gibi VESICARE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- İdrar kesenizde idrar birikmesi (üriner retensiyon)
- Barsak tıkanması
- Bacaklarda şişme
- Halüsinasyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- Ağız kuruluğu
- Kabızlık, bulantı, hazımsızlık, karın ağrısı
- Kusma
- Baş dönmesi
- Baş ağrısı
- Bulanık görme
- Reflü hastalığı (yanma dahil)
- Boşaltım sistemi enfeksiyonları, idrar kesesi iltihabı (sistit), idrara çıkma zorluğu
- Tat alma duyusunda anormalleşme veya bozulma
- Deri kuruluğu, göz kuruluğu, boğaz veya burun pasajı kuruluğu

- Kaşıntı
- Döküntü
- Allerjik döküntü
- Yorgunluk, uyku hali

Bunlar VESICARE'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. VESICARE'in saklanması**

*VESICARE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

- 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VESICARE'i kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:** Astellas Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:16 No:60 34235, Esenler, İstanbul  
Tel: (0212) 440 08 00  
Faks: (0212) 438 36 71

**Üretici:** Astellas Pharma Europe B.V., Leiderdorp, Hollanda

*Bu kullanma talimatı 15/04/2010 tarihinde onaylanmıştır.*