

KULLANMA TALİMATI

VISCOTEARS steril oftalmik jel
Göze uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 gram jel 2 mg karbomer içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VISCOTEARS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VISCOTEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VISCOTEARS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VISCOTEARS'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VISCOTEARS nedir ve ne için kullanılır?

VISCOTEARS steril yarı saydam, renksiz, sıvı jeldir. Etkin madde olarak her bir gramında 2 mg karbomer içerir ve 10 g jel içeren tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

VISCOTEARS yapay gözyaşları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

VISCOTEARS, yeterli gözyaşı üretilememesine bağlı olarak gelişen göz kuruluğu (gözde ağrı, yanma, iritasyon, kuruluk) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. VISCOTEARS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VISCOTEARS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Karbomere veya VISCOTEARS'ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

VISCOTEARS'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer:

- Kontakt lens kullanıyorsanız. Uygulamadan önce lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 30 dakika bekleyiniz.

3 gün içerisinde herhangi bir düzelme gözlemezsensiz doktorunuza danıřınız.

Bu uyarılar geđmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geđerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

VISCOTEARS'ın yiyecek ve iđecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve iđeceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

VISCOTEARS'ı doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

VISCOTEARS'ı doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

VISCOTEARS geđici bir süre için bulanık görmenize neden olabilir. Görüřünüz düzelene kadar araç ve makine kullanmayınız.

VISCOTEARS'ın iđerisinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VISCOTEARS'ın iđerisinde bulunan maddelerden birine aşırı duyarlılıđınız olmadıđı sürece, bu maddelerin kullanımından dođacak bir problem beklenmez.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eđer:

- VISCOTEARS ile birlikte başka göz ilaçları kullanıyorsanız iki ilaç uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz ve VISCOTEARS'ı daima en son uygulayınız.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VISCOTEARS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:

Yetiřkinlerde:

Göz içine günde 3-4 kez veya doktorunuzun tavsiyesi dođrultusunda hastalıđın řiddetine bađlı olarak gerekli sıklıkta bir damla uygulanır.


Uygulama yolu ve metodu:

VISCOTEARS, orjinal kapak açılana kadar steril kalan bir jel içermektedir. Tüpün ucu, jelin kirlenmesini engellemek için, herhangi bir yüzeye veya gözle temas etmemelidir.

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

Aşağıda belirtildiği şekilde gözünüze uygulayınız:

1. Başınızı arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz.
2. Diğer elinizle tüpü baş aşağı, gözünüzün üstünde dik olarak tutunuz. Yavaşça sıkarak bir damla damlatınız. Tüpün ucunu eliniz veya gözünüze değdirmemeye dikkat ediniz.
3. Damlattıktan sonra gözünüzün iç ucuna parmak ucunuz ile 1-2 dakika bastırınız. Bu, ilacın gözyaşı kanallarından buruna akmasını önler.

**Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanım: VISCOTEARS'ın çocuklarda etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: VISCOTEARS'ın böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer VISCOTEARS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VISCOTEARS kullandıysanız:

VISCOTEARS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VISCOTEARS'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

VISCOTEARS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan VISCOTEARS kullanmayı kesmeyiniz, istenilen sonucu alamazsınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VISCOTEARS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VISCOTEARS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık, göz kanlanması, gözde şişme, göz kapağında şişme, gözde kaşıntı ve göz ağrısı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VISCOTEARS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Geçici yanma hissi, gözkapaklarında yapışma, jelin uygulanmasından sonra görmede bulanıklık

Bunlar VISCOTEARS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VISCOTEARS'ın saklanması

VISCOTEARS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15-25°C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.

Tüp açıldıktan sonra 6 hafta içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmı saklamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VISCOTEARS'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VISCOTEARS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOVARTIS Ürünleri

34912 Kurtköy - İstanbul

Üretici:

Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre için

Dr. Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik

Berlin, Almanya

Bu kullanma talimatı 30.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.