

## KULLANMA TALİMATI

**XENICAL 120 mg kapsül**  
**Ağızdan (yutularak) alınır.**

- **Etkin madde:** Bir kapsül 120 mg orlistat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon K30, sodyum lauril sülfat, indigo karmin, titanyum dioksit içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***XENICAL nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***XENICAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***XENICAL nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***XENICAL'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. XENICAL nedir ve ne için kullanılır?**

- XENICAL obezite tedavisinde kullanılmakta olan bir ilaçtır. Sindirim sisteminiz üzerine etki ederek, besinlerle almış olduğunuz yağların yaklaşık üçte birinin sindirilmesini engeller.
- XENICAL sindirim sisteminizdeki enzimlere (lipazlara) bağlanarak, bu enzimlerin öğününüz süresince almış olduğunuz yağları sindirmesini engeller. Sindirilmeyen yağ emilemez ve vücudunuz tarafından dışarı atılır.
- XENICAL, düşük kalorili bir diyet eşliğinde, obezite tedavisinde kullanılmaktadır.

## 2. XENICAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### XENICAL’i ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eęer;

- Orlistat veya XENICAL’in ięerięindeki herhangi bir maddeye karřı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
- Kronik malabsorbsiyon sendromunuz (alınan besinlerin sindirim kanalından yeterli derecede emilememesi) varsa
- Kolestazınız (karacięer bozukluęu) varsa
- Emziriyorsanız

XENICAL’i kullanmayınız.

### XENICAL’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Kilo kaybı, dięer rahatsızlıklarınız için (örneęin yüksek kolesterol veya diyabet) kullanmakta olduęunuz ilaęların dozunu etkileyebilir. Almakta olduęunuz veya gelecekte alabileceęiniz ilaęlar hakkında doktorunuzla konuřunuz. Kilo kaybı nedeniyle bu ilaęların dozlarında yeni düzenlemelere ihtiyacınız olabilir.
- XENICAL’dan maksimum fayda saęlayabilmeniz için, doktorunuzun size söylemiř olduęu beslenme programına uymalısınız. Herhangi bir kilo kontrolü programında olabileceęi gibi, yüksek oranda yaę ve kalori tüketimi XENICAL’in kilo kaybettirme etkisini azaltmaktadır.
- XENICAL, barsak alışkanlıklarınızda, sindirilmemiř olan yaęın dıřkıyla atılmasından ötürü yaęlı dıřkılama gibi zararsız deęişikliklere sebep olabilir. Eęer XENICAL yüksek oranda yaę ięeren bir diyetle birlikte alınır, yaęlı dıřkılama ihtimali artar. XENICAL yüksek oranda yaę ięeren bir diyetle alındıęında sindirim sisteminiz üzerindeki (gastrointestinal sistem) etkileri artabileceęinden, günlük yaę alımınız üç ana öğüne daęıtılmalıdır.
- řiddetli diyare durumunda oral kontrasepsiyon (hamile kalmayı önlemek için ağızdan yutularak ilaę alınması) yetersiz kalabileceęi için, ek bir korunma yöntemi düşünölmelidir.
- XENICAL kullanımı kronik böbrek bozukluęu olan hastalarda böbrek taşına yol açabilir. Böbrekleriniz ile ilgili rahatsızlıęınızın olup olmadıęı konusunda doktorunuza bilgilendiriniz.

**Çocuklarda kullanım:** XENICAL çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geęmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geęerli ise lütfen doktorunuza danıřınız.

## **XENICAL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

XENICAL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması ile ilgili detaylı bilgi iin bkz. blm "3. XENICAL nasıl kullanılır".

### **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Eėer hamile iseniz XENICAL'i kullanmayınız.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- XENICAL'in anne stne geip gemediėi bilinmemektedir. Bu nedenle XENICAL ile tedaviniz sırasında bebeėinizi emzirmeyiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

- XENICAL'in ara veya makine kullanma yeteneėi zerinde bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

## **XENICAL'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Geerli deėildir.

### **Diėer ilalar ile birlikte kullanımı**

*Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

XENICAL ařaėıdaki ilaların etkisini deėiřtirebilir:

- Antikoagulan ilalar (kanın pıhtılařmasını nleyen ilalar, rneėin varfarin)
- Siklosporin. Siklosporin ile birlikte kullanımı nerilmemektedir. Doktorunuz kanınızdaki siklosporin dzeylerini normalden daha sık izlemeye ihtiya duyabilir.
- İyot tuzları ve/veya levotiroksin. Hipotiroidi(kanda tiroid hormonlarının azalması) ve/veya hipotiroidinin kontrolnde azalma meydana gelebilir.
- Amiodaron (kalp ritmini dzenleyici ila), tavsiye iin doktorunuza danıřınız.

zellikle beta-karoten ve E vitamini olmak zere, XENICAL bazı yaėda znen vitaminlerin emilimini azaltır. Bu nedenle sebze ve meyvelerce zengin bir diyet alma konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uymalısınız. Doktorunuz size multivitamin desteėi almanızı nerebilir.

XENICAL, sara tedavisinde etkili ilaçların (antiepileptik ilaçlar) etkisini, bu ilaçların emilimini azaltarak değiştirebilir ve böylece havaleye (tutarık) sebep olabilir. XENICAL ile eş zamanlı olarak sara tedavisinde etkili ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) kullanımınız sırasında, havalelerin (tutarık) sıklığının ve/veya şiddetinin değiştiğini düşünüyorsanız doktorunuz ile temasa geçiniz.

### 3. XENICAL nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

XENICAL'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

- Kullanılması gereken XENICAL dozu günde üç ana öğünün her birinde alınan 120 mg'lık 1 adet kapsüldür. XENICAL, öğüne başlamadan hemen önce, öğün sırasında veya öğünden bir saat sonrasına kadar alınabilir. Kapsüller su ile yutulmalıdır.
  - XENICAL sebze ve meyve yönünden zengin, iyi dengelenmiş, kalori kontrollü ve kalorinin ortalama %30'unu yağlardan alan bir diyet ile birlikte alınmalıdır. Günlük yağ, karbonhidrat ve protein alımınız üç ana öğüne dağıtılmalıdır. Buna göre kahvaltıda bir kapsül, öğle yemeğinde bir kapsül ve akşam yemeğinde bir kapsül alacaksınız. XENICAL'den maksimum fayda sağlayabilmeniz için öğün aralarında bisküvi, çikolata veya iştah açıcı atıştırmalıklar gibi yüksek oranda yağ içeren yiyecekler yemekten kaçınınız.
  - XENICAL sadece diyetteki yağlar ile birlikte alınırsa etki göstermektedir. Bu nedenle ana öğünü geçirirseniz veya hiç yağ içermeyen bir öğün alırsanız XENICAL almanıza gerek yoktur.
  - Herhangi bir nedenden ötürü XENICAL'i size söylendiği şekilde almazsanız doktorunuza söyleyiniz. Aksi takdirde doktorunuz XENICAL'in etkili olmadığını veya iyi tolere edildiğini düşünebilir ve gerekmediği halde tedavinizi değiştirebilir.
  - 12 hafta sonunda XENICAL ile tedavinizin başlangıcında ölçülmüş olan vücut ağırlığınızın en az % 5'ini kaybetmiş olmazsanız, doktorunuz tedavinizi kesebilir.
  - XENICAL ile 4 yıllık sürelerde, uzun dönem klinik çalışmalar yapılmıştır.
- **Uygulama yolu ve metodu:**
    - Ağızdan alınmalıdır.
    - Kapsülleri çiğnmeden yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin, bir bardak su ile).

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:** XENICAL'in etkisi 12 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır.  
**Yaşlılarda kullanım:** Geçerli değildir.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:** Geçerli değildir.  
**Karaciğer yetmezliği:** Geçerli değildir.

*Eğer XENICAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla XENICAL kullandıysanız**

Kullanmanız gerekenden daha fazla XENICAL kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

### **XENICAL'i kullanmayı unutursanız**

- Eğer XENICAL'i almayı unutursanız son öğününüzden sonra bir saat içinde olmak koşulu ile hatırlar hatırlamaz alınız, sonra normal zamanında almaya devam ediniz. Eğer birden fazla dozu almayı unutursanız, lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz ve size verilen tavsiyeye uyunuz. Doktorunuz söylemeden dozunuzu değiştirmeyiniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

*Bu ilacın kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.*

### **XENICAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

XENICAL tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi XENICAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

XENICAL kullandığınız sırada kendinizi iyi hissetmezseniz, mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

XENICAL kullanımına bağlı olarak gelişen yan etkilerin büyük çoğunluğu, XENICAL'in sindirim sisteminizdeki bölgesel etkisinden ileri gelmektedir. Bu belirtiler genellikle hafif şiddette olup, tedavinin başlangıcında ve özellikle yüksek oranda yağ içeren öğünlerden sonra meydana gelirler. Tedaviye devam ederseniz ve size söylenmiş olan diyeteye uyarsanız bu belirtiler genellikle kaybolur.

#### **Çok yaygın yan etkiler (10 hastadan 1'den fazla hastada görülen)**

- Baş ağrısı
- Karında ağrı veya rahatsızlık hissi
- Acil veya artan dışkılama ihtiyacı
- Gaz ile birlikte sızıntı
- Yağlı sızıntı
- Yağlı dışkı

- Sıvı dışkı
- Düşük kan şekeri (tip 2 şeker hastalığı olan bazı hastalarda görülmüştür)

### **Yaygın yan etkiler (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)**

- Rektumda (kalın barsağın son bölümü) ağrı veya rahatsızlık hissi
- Yumuşak dışkı
- Dışkı kaçırma
- Karında şişkinlik (tip 2 şeker hastalığı olan bazı hastalarda görülmüştür)
- Diş ve dişeti rahatsızlıkları
- Adette (menstrüel döngüde) düzensizlik
- Yorgunluk

Aşağıdaki yan etkiler de rapor edilmiştir fakat sıklıkları mevcut verilerden tahmin edilememektedir:

- Alerjik reaksiyon

Alerjik reaksiyonun temel belirtileri şunlardır: Kaşıntı, döküntü, deride kabartılar (etrafındaki deriden daha soluk veya daha kırmızı renkte olan kaşıntılı kabartılar), nefes almada şiddetli güçlük, bulantı, kusma ve kendini hasta ve kötü hissetme.

- Rektumda kanama (makattan kan gelmesi)
- Bazı karaciğer enzim düzeylerinde artış (kan testi ile belirlenir)
- Divertikülit(barsak duvarının dışarıya doğru kesecik halde çıkıntı yapması ve bu yapının iltihaplanması)
- Safrakesesi taşı
- Karaciğer iltihabı (hepatit)
- Pankreas iltihabı (pankreatit)
- Deride su toplanarak kabarcık oluşması (kabarcıklar patlayabilir)
- Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlarla (antikoagulan ilaçlar) pıhtılaşma üzerine etki

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. XENICAL'in saklanması**

*XENICAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Nemden koruyunuz, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra XENICAL'i kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi** : Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi  
Eski Büyükdere Caddesi No: 13  
34398 Maslak-İstanbul

**Üretici** : Roche S.p.A., Segrate (MI), İtalya

*Bu kullanma talimatı ../../ tarihinde onaylanmıştır.*